

ԳԼՈՒԽ 8



ՍԵՐԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ

**ՍԵՐԱԿԱՆ ԾԱՆԱՊԱՐՀՈՎ
ՓԻԽԱՆԱԳՎՈՂ ՎԱՐԱԿԻՀ
ԻԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՅդ
թվում՝ ՄԻԱՎ-ի
կանխարգելումը**

Սերական առողջությունը ֆիզիկական և հոգեկան բարեկեցության բաղկացուցիչ մասն է, որը բույլ է տալիս վայելել և արտահայտել մեր սերական գգացողությունները: Կարող ենք պահպանել սերական առողջությունը՝ տեղեկանալով մեր մարմնի և այն մասին, թե ինչն է մեզ հաճույք պատճառում՝ կանխելով անցանկալի հղությունն ու սերական ծանապարհով փոխանցվող վարակիչ իիվանդությունները:

Որոշ համայնքներում, կանանց մասին սխալ կարծիքների պատճառով, դժվարանում է առողջ սերական հարաբերություն ունենալու հնարավորությունը: Քանի որ կանայք իրենց սերական կյանքին վերաբերող հարցերում քիչ վերահսկողություն ունեն, ուստի հաճախ չեն կարողանում մերժել սերահարաբերությունը, և ողջ աշխարհում միլիոնավոր կանայք վարակվում են ՄԻԱՎ-ով և սերական ծանապարհով փոխանցվող այլ իիվանդություններով:

Մարդիկ հաճախ կարծում են, թե հաշմանդամություն ունեցող կանայք չեն վարակվում որևէ իիվանդությամբ: Իրականում այդպես չէ: Նրանց ևս կարող են փոխանցվել նույն վարակները, ինչպես բոլոր կանանց:

Իրականում հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների ՄԻԱՎ-ով վարակվելու վտանգն ավելի մեծ է, քան մյուսների: Դրա պատճառը ոչ միայն սերական դաստիարակության պակասն է, այլև այն, որ հաճախ չեն կարող վերահսկել, թե ինչ եղանակով և ում հետ են ունենում սերական հարաբերություններ: Սա նրանց ավելի խոցելի է դարձնում սերական բռնության նկատմամբ, և սերական ծանապարհով փոխանցվող իիվանդություններով, այդ թվում՝ ՄԻԱՎ-ով, վարակվելու հավանականությունն ավելի է մեծանում: Նրանց նկատմամբ սերական բռնության մասին մանրամասները՝ գլուխ 14-ում:

Այս գլուխում տեղեկություններ են ներկայացված ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի, սերական ծանապարհով փոխանցվող այլ իիվանդությունների և դրանց կանխարգելման մասին: Լավ տեղեկատվության միջոցով կանայք կարող են քայլեր ծեռնարկել՝ ինքնապաշտպանվելու և առողջ սերական հարաբերությունից հաճույք ստանալու համար:

Ի՞նչ է սերական ծանապարհով փոխանցվող վարակը

Սա իիվանդություն է, որը փոխանցվում է սերական տարատեսակ հարաբերությունների միջոցով:

8

Չրուժված հիվանդությունները վարանգալոր են

Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակիչ հիվանդություններից մի քանի-սը ենթակա են դեղորայքային բուժման: Դրանք ժամանակին չըուժելու դեպքում կարող են պատճառ դառնալ տղամարդկանց և կանանց անպտղության, վաղ ծննդաբերության, փոքր քաշով կամ կույր երեխաների ծնվելու, փողի մեջ զարգացող հիվության: Առաջացնում են տևական ցավ որովայնի խոռոչում, արգանդի վզկի քաղցկեղ, իսկ սուր բորբոքման դեպքում կարող են հասցնել մինչև իսկ մահվան:

Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակիչ հիվանդությունների նախանշաններ

Հստ հետևյալ նշանների՝ կարող եք պարզել՝ ունե՞ք սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություն.

- անսովոր արտադրություն հեշտոցից,
- տարօրինակ հոտ,
- ցավ կամ այլ զգացողություններ որովայնի խոռոչում և հեշտոցում,
- հարաբերությունից առաջացած քոր, ցան, ոտուցք կամ վերք սեռական օրգանների վրա:

Հաշվի առնելով ձեր հաշմանդամության տեսակը՝ հնարավոր է՝ այս նշանների սոուզման հարցում դժվարություններ առաջանան: Այդ դեպքում ձեզ անհրաժեշտ կլինի ինչ-որ մեկի օգնությունը:



Հեշտոցի արդադրության փոփոխություններ

Ոչ շատ խոնավություններ կամ արդադրություններ բնական են: Այդ եղանակները մաքրում և պաշտպանվում են: Դաշտանային պարբերաշրջանում արդադրություններ ենթարկվում են փոփոխության, դառնում ավելի մածուցիկ, շատ քայլանացիկ և լարում՝ ձեր դաշտանային մուրավորապես 14օր առաջ: Քանի առաջին գույնի և հոդի փոփոխությունները կարելի են հասկանալ որ բորբոքում կա, քայլ արդադրություններ դժվար են հղուակացնել, թե վարակի ինչ դրսակ է առկա:

Ինչպես և սպուզել սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակինների նախանշանները

Եթե դուք կույր եք. Սեռական օրգանների լվացում կատարելիս մատների միջոցով փորձեք պարզել՝ կա՞ որևէ անսովոր արտադրություն, գոյացություն կամ գրգռվածություն: Այդ գործողությունները կատարեք շաբաթը մեկ անգամ, քանի որ ամենօրյա զննության դեպքում դժվար է որևէ փոփոխություն նկատելը:



Ձեր ձեռքերն ունեն շաբթան սահմանափակում, կամ ընդհանրապես չեք կարող շարժել. Եթե ձեր մատների միջոցով հնարավոր չէ ստուգել սեռական օրգաններում կատարվող փոփոխությունները, ապա կարող եք օգտագործել հայելի՝ դրանց առկայությունը պարզելու համար: Հայելին բռնել չկարողանալու դեպքում դրեք հատակին և կրացեք դրա վրա:

Ուներ ողբաշարի վնասվածքը. Եթե կարող եք զգալ և զննել ձեր սեռական օրգանները, ապա դա կատարեք շարաբը մեկ անգամ՝ լողանալու ընթացքում։ Անհրաժեշտության դեպքում խնդրեք վատահելի մեկին, որ օգնի ձեզ։ Դուք, հավանաբար, ի վիճակի չեք լինի՝ ստուգելու որովայնի ցավն ու սեռական օրգաններում քորի առկայությունը։ Բայց եթե ուներ սեռական օրգանների բորբոքում, ապա ժամանակին չըուժելու դեպքում այն կարող է առաջացնել դիզոնֆլեքսիա։ Սա վտանգավոր է։

Դժվարանում կամ ընդհանրապես չեք կարողողանում շարժել ձեր ոտքերը. Հնարավորության դեպքում ընտրեք այնպիսի դիրք, որ լողանալիս շոշափեք ձեր սեռական օրգանները կամ հայելու միջոցով կարողանաք զննել դրանք։ Անհրաժեշտության դեպքում խնդրեք, որ վստահելի մեկը ձեր ոտքերը պահի անշարժ դիրքով։

Տրիխոմոնիազ

Սա շատ անհարմարություններ և քոր առաջացնող վարակ է։ Տղամարդկանց օրգանիզմում դրա առկայությունը որևէ նախանշան չունի, բայց կարող է պահպանվել առնանդամում և սեռական ծանապարհով վիրահանցվել կնոջը։

Նախանշաններն են՝

- մոխրագոյն կամ դեղին փրփրում արտադրություն,
- տիած հոտով արտադրություն,
- քոր և կարմրություն հեշտոցում և սեռական օրգաններում,
- ցավ և այրոց՝ միզելիս։

Եթե հնարավոր է զննությամբ հաստատ համոզվել, որ ունեք տրիխոմոնիազ, ապա ընդունեք նշված դեղամիջոցներից որևէ մեկը։

8

Գոնոռեա և քլամիդիոն

Սրանք երկուսն ել լուրջ բորբոքումներ են։ Հայտնաբերման վաղ շրջանում հեշտությամբ կարելի է բուժել։ Հակառակ դեպքում կարող են առաջացնել սուր բորբոքում, պատճառ դառնալ կանանց և տղամարդկանց անպտղության։ Տղամարդու օրգանիզմում նախանշաններ ի հայտ են գալիս վարակված անձի հետ սեռական հարաբերություններ ունենալուց հետո՝ 2-5 օրվա ընթացքում։ Իսկ կինն այդ նշանները կարող է զգալ շաբաթներ, նույնիսկ՝ ամիսներ անց։ Այն մարդիկ, ովքեր դեռևս ոչինչ չեն հայտնաբերել, կարող են մյուսներին վիրահանցել և՝ գոնոռեան, և՝ քլամիդիոզը։

Կանանց օրգանիզմում առաջացող հիմնական նախանշաններն են՝

- հեշտոցից կամ հետանցքից դեղին կամ կանաչ արտադրություն,
- ցավ կամ այրոց՝ միզելիս,
- ջերմություն,
- ցավ որովայնի խոռոչում,
- արյունահոսություն կամ ցավի զգացողություն՝ սեռական հարաբերություններ ունենալիս,
- ոչ մի նախանշան։



Տղամարդկանց հիմնական նախանշաններն են՝

- արտադրություն առնանդամից,
- ցավ և այրոց՝ միզելիս,
- այսուց և ցավ ամորձիներում,
- ոչ մի նախանշան։



Բուժում

Եթե ձեր օրգանիզմում նկատվում են գոնոռեայի կամ քլամիդիոզի նախանշաններ՝ վարակված մեկի հետ առանց պաշտպանվելու սեռական հարաբերություն ունենալուց հետո, ապա անցեք զննություն՝ պարզելու, թե ինչ բորբոքում ունեք, և ինչ դեղամիջոցներ կարելի է ընդունել:

Ցավոք, թեստերը միշտ չեն, որ հասանելի են, ուստի ավելի լավ է ընդունել մի քանի բորբոքման դեմ նախատեսված դեղամիջոցներ: Անձը կարող է ունենալ մեկից ավելի բորբոքում՝ գոնոռեա և քլամիդիոզ, նաև՝ տրիխոմոնիազ և բակտերիալ վագինոց:

Սեռական մերքին օրգանների բորբոքումներ

Այս բորբոքումներն իրենց մեջ ներառում են բոլոր այն հիվանդությունները, որոնք կապված են կնոջ որովայնի ստորին շրջանում գտնվող վերաբտաղրողական օրգանների հետ: Սրանք հաճախ կոչվում են «կանացի բորբոքում»: Սեռական ներքին օրգանների բորբոքումը կարող է առաջանալ սեռական ճամապարհով փոխանցվող վարակի շրուժման դեպքում, հատկապես՝ գոնոռեայի և քլամիդիոզի:

Դուք կարող եք ունենալ այս նախանշաններից որևէ մեկը կամ մի քանիսը՝



- ցավ որովայնի խոռոչում,
- բարձր ջերմություն,
- թուլություն և վատ ինքնազգացողություն,
- կանաչ կամ դեղին, տիհած հոտ ունեցող արտադրություն հեշտոցից,
- հեշտոցային հարաբերության դեպքում՝ ցավ կամ արյունահոսություն:

Վերքերի սեռական օրգանների վրա (խոցեր)

Վերքերի և խոցերի մեծ մասը կարող է փոխանցվել սեռական ճամապարհով, բայց պառկելախտոցերը, բշտիկները և վնասվածքները նոյնպես վերքեր են առաջացնում սեռական օրգանների վրա: Ցանկացած վերք պետք է մաքուր պահել, լվանալ օճառով և մաքուր ջրով, խնամքով չորացնել: Կտորը, որով չորացրել եք վերքը, լվացրեք նախքան ձեր կամ ինչ-որ մեկի նորից օգտագործելը:

Զգուշացում. Եթե որևէ մեկի սեռական օրգաններում կա վերք, ապա դրա միջոցով ավելի է հեշտանում մեկ այլ բորբոքման, հատկապես՝ ՍԻԱՎ-ի և հեպատիտ Բ-ի փոխանցումը: Բորբոքումը կանխելու համար՝ մինչև վերքերի լավանալը, խուսափեք սեռական հարաբերությունից:

Միֆիլիս

Սա սեռական ճամապարհով փոխանցվող լուրջ հիվանդություն է, որն ազդում է ողջ մարմնի վրա: Այն կարող է լինել երկարատև և ընթացքում ավելի բարդանալ: Վաղ շրջանում ենթակա է բուժման:

Նախանշաններն են.

- Առաջին նշանն է՝ փոքր, անցավ վնասվածք, որն ունի պղուկի, բշտիկի, տափակ ու խոնավ կամ բաց վերքի տեսք: Այն մնում է միայն մի քանի օր և առանց որևէ միջամտության՝ անհետանում: Բայց հիվանդությունը շարունակում է տարածվել ողջ մարմնով:
- Շաբաթներ կամ ամիսներ անց բորբոքում ունեցող անձի կոկորդում և բերա-

նում առաջանում են վերքեր, ունենում է բոյլ ջերմություն, այսուցվում են հոդերը, գոյանում է ցան, հատկապես՝ ձեռքի ափերի և ներքանների վրա: Այս շրջանում վարակված աճար այն կարող է փոխանցել մյուսներին:

- Բոլոր այս նշանները սովորաբար անհետանում են՝ առանց որևէ միջամտության, բայց հիվանդությունը շարունակում է զարգանալ: Չբուժելու դեպքում սիֆիլիսից առաջանում են սրտի և հոգեկան հիվանդություններ, կարված: Այն կարող է հանգեցնել մինչև իսկ մահվան:

Համբորիդ

Սա սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակ է, որն առաջանում է վերքեր սեռական օրգանների վրա: Վաղ շրջանում ենթակա է դեղորայքային բուժման: Այն հեշտությամբ կարելի է շփոթել սիֆիլիսի հետ:

Նախանշաններն են.

- մեկ կամ մի քանի ցավոտ և արյունահոսող վերքեր սեռական օրգանների կամ հետանցքի վրա,
- աճուկներում ավշահանգույցների լայնացում և ցավ,
- թերթ ջերմություն:

Հերպիս սեռական օրգանների վրա

Սա ևս սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակ է: Սեռական օրգանների վրա առաջանում են փոքր բշտիկներ: Հերպեսի հարուցիչն առաջացնում է վերքեր, որոնք անհետանում են ամիսների և տարիների ընթացքում: Հերպեսն անբուժելի է, բայց գոյություն ունեն ցավը մեղմացնող դեղամիջոցներ:

8

Նախանշաններն են.

- ծակծկոց, քոր կամ ցավի զգացողություն սեռական օրգաններում և մաշկի տվյալ հատվածի վրա,
- փոքր բշտիկներ, որոնք ունեն ջրի կաթիլի տեսք, դրանք պատռվում և առաջացնում են քաց, ցավոտ վերքեր:

Առաջին անգամ գոյացած հերպեսային վերքերը մնում են 3 շաբաթից ավել: Այդ ընթացքում կարող են առաջանալ գլխացավ, ջերմություն, ցավեր մարմնում և աճուկներում, լող, ինչպես նաև՝ այտուցներ ավշային հանգույցների վրա: Վերքերը շրանում են, բայց բորբոքումը չի լավանում: Սակայն բշտիկների հաջորդ առաջացումը կլինի ոչ այնքան ցավոտ:

Քուժում: Օգտագործեք ացիլովիլ:



Հղիությունը և հերպեսը

Եթե հերպեսով վարակված կնոջ ծննդաբերության ընթացքում առկա են վերքեր, ապա դրանք փոխանցվում են երեխային: Այդ պայմանով փոքրիկը կարող է լուրջ խնդիրներ ունենալ հարկապես, եթե կնոջ մարմնում բշտիկներն առաջին անգամ են ի հայր եկել: Երեխային սպառնացող վրաններ կանգագի այն դեպքում, եթե կինն արդեն երկար ժամանակ է, ինչ հերպես ունի:

Հերպեսի առկայության դեպքում, եթե հնարավոր է, ծննդաբերեք հիվանդանում: Բժիշկը կկայացնի վիրահակություն կարարենու որոշում՝ երեխային չլարակելու և ծնվելուց հետո նրան անհրաժեշտ դեղամիջոցներով ապահովենու համար:

ՍԵՐՈՎԱՆ ԾԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ԴՐՈՒՅԹ

Վերքեր սեռական օրգանների վրա

Մրանք առաջանում են մարդկային պապիլոնա կոչվող հարուցիչից և մարմնի այլ մասերի վրա ունեն վերքերի տեսք: Հնարավոր է, որ կրեք տվյալ հարուցիչը, բայց տեղյակ չիմեք դրա մասին, հատկապես, եթե գտնվում են արգանդի ներքին մասում կամ առնանդամի տակ: Մարդկային պապիլոնայի վիրուսակիրների վրա երբեք չեն առաջանում վերքեր: Դրանք կարող են լավանալ առանց բուժման, բայց կպահանջվի երկար ժամանակ: Սովորաբար այդ վերքերը ժամանակի ընթացքում ավելի են բարդանում և ունեն բուժման կարիք: Սեռական հարաբերության ժամանակ հեշտությամբ փոխանցվում են մեկից մյուսին:

Կարևոր է. Սեռական օրգաններում առաջացած վերքերի չբուժման դեպքում դրանց որոշ մասը կարող է արգանդի վզիկի քաղցկեղի պատճառ դառնալ: Եթե սեռական օրգաններում վերքեր ունեք, փորձեք անցնել Պապ (Pap) բեստ՝ համոզվելու՝ ծեր արգանդի վզիկի վրա կա՞ն մարդկային պապիլոնա հարուցիչի կամ քաղցկեղի նախանշաններ, թե՞ ոչ:

Մարդկային պապիլոնա վիրուսի նախանշաններն են՝

- քոր,
- անցավ, սպիտակավուն կամ շագանակագույն կոշտ մակերես ունեցող գոյացություններ:

Վերքեր կանանց սեռական օրգաններում

Այս գոյացություններն իշխանականում առաջանում են հեշտոցի ներքին մասում, հեշտոցամուտքի և հետանցքի մաշկային ծալքերի վրա:

Տղամարդկանց վերքեր

Հիմնականում առաջանում են առնանդամի վրա կամ հենց դրա ներքին մասում՝ ամորդիների կամ հետանցքի վրա:

Բուժում

Վերքերի բուժման համար նախատեսված միջոցները կարելի են գտնել դեղատներում:

1. Օգտագործեք վազելին կամ այլ յուղային քսուքներ՝ շրջակա առողջ մաշկը պաշտպանելու համար:
2. Փոքր փայտիկի կամ ատամփորիչի օգնությամբ 80-90%-անոց տրիքլորացետիկ (TCA) կամ թիսլորացետիկ թքուների (BCA) լուծույթը տարածեք վերքերի վրա: Այն բռնեք այնքան ժամանակ, մինչև վերքերը դառնան սպիտակավուն:
3. Լվացրեք 2 ժամից կամ ավելի շուտ, եթե այրոցի զգացողությունը շատ մեծ է:

Կամ

Տարածեք պողոֆիլինի 20%-անոց լուծույթը նույն եղանակով, մինչև վերքերը չդառնան շագանակագույն: Այն պետք է լվանալ 6 ժամից:

Լուծույթը պետք է այրի վերքը՝ թողնելով ցավոտ հետք այն հատվածում, որտեղ այն եղել է: Վերքերը պահեք չոր և մաքուր: Հետքը պետք է անցնի 1 կամ 2 շաբաթվա ընթացքում: Հետևեք, որպեսզի դրանք չըռըռորվեն: Փորձեք խուսափել սեռական հարաբերություններից՝ մինչև վերքերի լավանալը, բայց եթե որոշում եք ունենալ, ապա ծեր գուգընկերը պետք է օգտագործի պահպանակ:

Սովորաբար մի քանի բուժումներ են անհրաժեշտ՝ վերքերի լիարժեք բուժման համար (կարևոր չե, թե որ լուծույթն եք օգտագործում): Մեկ շաբաթից կարող եք կրկնել բուժումը: Աշխատեք, որ բրվային լուծույթը չտարածվի վերքի հետքի վրա: Եթե գրգուածությունը մեծ է, նախքան բուժման մյուս վուլին անցնելը, անհրաժեշտ է ավելի երկար սպասել:

ՀՀԻՆՈՒՐՅՈՒՆ և ՎԵՐՔԵՐԸ

Խոսսափեք հղիուրյալ ընթացքում
օգտագործել պողոֆիլին: Այն կներծծվի
ձեր մաշկի մեջ և կվճասի զարգացող հրե-
խային: Վերքերը կարող են դարձնել և
արյունահոսել բայց չվճասել վորքիկին:
Երբեմն հղիուրյունից հետո դրամը
ավելի են վորքանում:




Հեպարիուներ (դեղնախալ, դեղիճ աչքեր)

Հեպատիտը լարդի բորբոքումն է, որը սովորաբար առաջանում է հարուցիչի պատճառով, բայց կարող է լինել նաև մանրէների, ալկոհոլի և քիմիական բունափորման հետևանքով: Գոյություն ունի հեպատիտի 3 հիմնական տեսակ՝ A, B և C: Դրանք վիշտանցվում են մեկից մյուսին, անկախ այն փաստից՝ հիվանդության նախանշաններն ի հայտ եկել են, թե՞ ոչ:

Հեպատիտ A-ն սովորաբար ավելի մեղմ է երեխաների և հածախ ավելի բարդ՝ մեծերի և հղի կանանց շրջանում:

Հեպատիտ B-ն վտանգավոր է բոլորի համար: Այն կարող է առաջացնել լարդի շրութվող հիվանդություն, քաղցկեղ, մինչև իսկ հանգեցնել մահվան: Եթե դուք հղի եք և նկատում եք հեպատիտ B-ի նախանշաններ, ապա անհապա դիմեք բժշկի:



Հեպատիտ C-ն նույնապես վտանգավոր է և կարող է առաջացնել լարդի անբուժելի բորբոքումներ: Այն ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի վարակակիրների մահվան հիմնական պատճառն է:

Նախանշաններն են՝

- հոգնածություն և քուլություն,
- ախտրժակի քացակայություն,
- դեղնություն աչքերում կամ մաշկի վրա (հատկապես՝ ձեռքերի ափերում և ներքաններին),
- սրտխառնոց կամ ցավ որովայնում,
- մեզի մուգ գույն և սպիտակավուն կղանք,
- երբեմն՝ ջերմություն,
- ոչ մի նախանշան:

Բուժում

Ըկա օգնող ոչ մի դեղամիջոց: Որոշ դեղամիջոցների օգտագործումը կարող է ավելի վնասել լարդը:

Հանգստացեք և ընդունեք հեղուկի մեծ քանակություն: Եթե չունեք ուտելու ցան-

կություն, ապա փորձեք խմել տարրեր մրգերից կամ բանջարեղենից պատրաստված հյութեր, արգանակ: Սրտխառնոցը կանխելու համար փորք կումերով խմեք կոլա

կամ այլ զովացուցիչ ըմպելիք: Բուսական թեյերը նույնպես կարող են օգնել, օրինակ՝ երիցովիկի: Հաճայնքի տարեց կանանցից հարցրեք, թե որ բույսն է ավելի օգտակար:



Եթր ունենում եք ուտելու ցանկություն, խորհուրդ չի տրվում ընդունել սպիտակուցների մեծ քանակություն պարունակող կենդանական ծագում ունեցող սնունդ (մսամթերք, ձկնեղեն, հավկիր), քանի որ այն ծանրաբեռնում է վնասված լյարդը: Խոսսափեք նաև կենդանական ծարպով կամ բուսական յուղով պատրաստված մթերքներից: Փոխարենը փորձեք հիմնականում օգտագործել սպիտակուցների քիչ քանակությամբ մրգեր, թարմ կամ շոգեխաշած բանջարեղեն: Առնվազն 6 ամիս արգելվում է ալկոհոլի գործածումը:

Կանխարգելում

Եվ հեպատիտ B-ն, և՝ C-ն կարող են փոխանցվել սեռական ճանապարհով, ոչ մանրեազերծ ներարկիչների օգտագործման, վարակված արյան փոխներարկման դեպքում, ինչպես նաև ծննդաբերության ժամանակ՝ մորից՝ երեխային: Հեպատիտի փոխանցումը կանխելու համար սեռական հարաբերությունների ժամանակ միշտ օգտագործեք պահպանակ և համոզվեք, որ ասեղները, ներարկիչները, կտրվածքներ և մաշկի փիրսինգ կատարող գործիքները (ինչպիսիք են տասուի, թլպատման և կանանց սեռական օրգաններում կտրվածք անող) օգտագործումից առաջ եռացվել են:

Հեպատիտ A-ի հարուցիչը փոխանցվում է, եթե մեկի կղանքը հայտնվում է այլ անձի օրգանիզմում, այն տեղի է ունենում ջրի և սննդի վարակման միջոցով: Այս երևույթը կանխելու համար անհրաժեշտ է վարակված անձի կղանքը դատարկել զուգարանակոնքի մեջ կամ թաղել հողում: Համոզվեք, որ վարակված անձը շատ մարուր է: Նա, ընտանիքի անդամները, խնամակալները պետք է պահպաննեն մաքրության կանոնները:

Հեպատիտ A-ի և B-ի դեմ գործածվող պատվաստանյութերն այժմ հասանելի են, բայց դրանք կարող են շատ թանկարժեք լինել և, հնարավոր է, ոչ մատշելի՝ բոլոր վայրերում: Եթե կարողանաք պատվաստվել հողության ընթացքում, ապա այն կկանխի հարուցիչի փոխանցումը երեխային:

Ի՞նչ անել, եթե չեք օրգանիզմում հայրմաքերվել է սեռական ճանապարհով փոխանցվող բորբոքում

- Անմիջապես սկսեք բուժումը: Այն կկանխի հետագա լուրջ խնդիրների առաջացումը և դրանց փոխանցումն այլ անձանց:
- Հնարավորության դեպքում անցեք զննություն: Դիմեք բուժիչնարկ կամ հիվանդանոց, որտեղ կարող եք իմանալ, թե ինչ բորբոքում ունեք: Այս դեպքում չեք ընդունի ոչ անհրաժեշտ դեղամիջոցներ: Փորձեք բուժման մասին զրուցել փորձառու բուժաշխատողի հետ:



- Օգնեք, որ ձեր զուգընկերը բուժվի ձեզ հետ միաժամանակ: Հակառակ դեպքում, սեռական հարաբերության ընթացքում նա հարուցիչը նորից կփոխանցի ձեզ: Հետամուտ եղեք, որ լնդունի դեղորայքը և այցելի բուժաշխատողի:
- Ընդունեք նշանակված ողջ դեղորայքը՝ նույնիսկ ձեր վիճակի բարեկալման դեպքում: Գնեք այն ամրողական չափարաժնով, քանի որ դուք (կամ ձեր զուգընկերը) չեք բուժվի, եթե ավարտին չհասցնեք բուժման ողջ փուլը:
- Փորձեք ունենալ ապահով սեռական հարաբերություններ: Չպաշտպանվելու դեպքում հեշտությամբ կարող եք վարակվել այլ բորբոքումով:

Ի՞նչ է ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-Ը

ՄԻԱՎ-Ը (Սարդու իմունային անբավարարության վիրուս) միկրոօրգանիզմ է, որը թուլացնում է իմունային համակարգը՝ օրգանիզմի այն մասը, որը պայքարում է վարակների և բորբոքումների դեմ: ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ամենատարածված եղանակը սեռական հարաբերությունն է: Եթե տղամարդը հարուցիչը փոխանցում է հոի կնոջը, կամ եթե վերջինս արդեն վարակված է այդ հիվանդությամբ, ապա այն կարող է երեխային վնասել նաև հիդրուրյան և ծննդաբերության ընթացքում կամ կրծքով կերակրելիս:



ԶԻԱՀ-Ը (Զեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ)

հիվանդություն է, որը զարգանում է ՄԻԱՎ-ով վարակվելուց որոշ ժամանակ անց: Սովորաբար ԶԻԱՀ-ով հիվանդ է համարվում այն անձը, ով սովորականից հաճախ է ունենում ընդհանուր առողջական խնդիրներ: Որոշ նախանշաններն են՝ քաշի կորուստ, չրուժվող վերքեր, ծանր հազ, քրտնարտադրություն գիշերվա ընթացքում, փորլուծություն, մաշկային ցան, ջերմություն, արտադրություն հեշտողից կամ մշտական հոգնածության զգացողություն: Այս խնդիրներից յուրաքանչյուրն ունի տարբեր պատճառներ: Դուք չեք կարող ստույգ իմանալ ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի առկայության նասին, մինչև չանցնեք արյան հատուկ թեստ:

Քանի որ ՄԻԱՎ-ով վարակակրի իմունային համակարգը հետզհետե թուլանում է յուրաքանչյուր հիվանդությունից, ուստի մարդու օրգանիզմն անկարող է դառնում՝ հիվանդության դեմ պայքարելու և այն հաղթահարելու հարցում: Սա շարունակվում է մինչև օրգանիզմի խապա թուլացումը, և հիվանդը մահանում է: Բոլորն ել կարող են վարակվել ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ով՝ անկախ հաշմանդամությունից:

ՄԻԱՎ-ով վարակվելուց հետո որոշ մարդիկ շատ շուտ մահանում են ԶԻԱՀ-ից: Բայց ոմանց մի քանի տարի է անհրաժեշտ՝ դրանով վարակվելու համար: Սա նշանակում է, որ անձը կարող է հիվանդ լինել ՄԻԱՎ-ով, բայց չիմանալ դրա մասին՝ լավ ինքնազգացողության պատճառով: Անկախ դրանից՝ վարակվելուց անմիջապես հետո նա կարող է հարուցիչը փոխանցել այլ անձի: Վարակված լինելու փաստը հաստատելու միակ եղանակն արյան թեստ անցնելն է: Սա կարելի է կատարել շատ բուժիմնարկներում և հիվանդանոցներում:

Հակառներովիրայններ կոչվող դեղամիջոցներն օգնում են ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի վարակակրի անձանց՝ ապրելու ավելի երկար և առողջ կյանքով: Սրանք չեն վերացնում ՄԻԱՎ-ը և չեն բուժում ԶԻԱՀ-ը, բայց թերևացնում են վարակակիրների կյանքը: Հղի կանաց դեպքում հակառներովիրայնին դեղամիջոցները կանխում են հիվանդության փոխանցումը մորից երեխային: Ցավոք, այս դեղամիջոցները շատ թանկարժեք են, և որոշ երկրներում դրանք ձեռք բերելը կարող է շատ դժվար լինել:

Ի՞նչ եղանակով է փարածվում ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ը

ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ առաջացնող հարուցիչը գործում է ՄԻԱՎ-ի վարակակիր անձանց մարմնի որոշ հեղուկներում, ինչպիսիք են արյունը, տղամարդկանց սերմնահեղուկը և կանանց հեշտոցային հեղուկը: Այն տարածվում է, եթե վերջիններս փոխանցվում են մարմնի մեջ: ՄԻԱՎ-ը կարող է տարածվել:

Վարակակիրի հետ
սեռական հարաբերություն ունենալիս, եթե նա չի օգտագործում
պահպանակ:

Ոչ մանրէազերծ ա-
սեղներ կամ գոր-
ծիքներ օգտագործելիս, որոնք
կտրում են մաշկը
կամ փիրսինգ են
կատարում:

Երբ վարակված
արյունը լցվում է մեկ
այլ անձի մաշկի
կտրվածքի կամ բաց
վերքի մեջ:

Վարակված մորից
երեխային հղիության, ծննդաբերության կամ կրծքով
կերակրելու ընթացքում:



Այն վայրերում, որտեղ չի կատարվում արյան ստուգում, մարդկանց ՄԻԱՎ կարող է փոխանցվել վարակված արյան փոխներարկման դեպքում:

Ի՞նչ եղանակով չի փարածվում

ՄԻԱՎ-ը մարդկային մարմնից դուրս գործում է միայն մի քանի դոպե: Այն չի կարող ինքնուրույն պահպանվել օդում կամ ջրում: Սա նշանակում է, որ դոք չեք փոխանցի կամ կրի ՄԻԱՎ՝

- շոյելիս,
գրկախառնվելիս կամ
համբուրվելիս,
- նույն
սննդամթերքներից
օգտվելիս,
- նույն ամկողնում
պառկելիս,
- միմյանց հագուստից,
անկողնային
պարագաներից կամ
նույն զուգարանից
օգտվելիս,
- միջատների
խայթոցից:



Շփումից ՄԻԱՎ չի փոխանցվում:

Ինչպես ու ի ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ն ազդում կանանց վրա

ՄԻԱՎ-ով վարակված կանայք ավելի հաճախ են ԶԻԱՀ-ով հիվանդանում, քան տղամարդիկ: Թերևնուուն ու հղիության ծանր ընթացքը կնոջ համար դժվարություններ են ստեղծում պայքարելու հիվանդության դեմ: Նրանք ավելի հաճախ են վարակվում ՄԻԱՎ-ով, քան տղամարդիկ: Եթե սեռական հարաբերությունների ընթացքում տղամարդու սերմահեղուկն անցնում է կնոջ մարմնի մեջ, հեշտությամբ կարող է նրա արգանդից կամ վզիկից փոխանցվել նաև արյան մեջ, հատկապես այս դեպքում, եթե առկա են կտրվածքներ կամ վերքեր: Սա կարող է լինել՝ անկախ կնոջ հաշմանդամությունից:

Թյուր կարծիքներ ՄԻԱՎ /ԶԻԱՎ-ի և հաշմանդամություն ունեցող կանանց մասին

Տարածված սխալ ու վճառակար կարծիքներից մեկն այն է, որ եթե վարակիր անձը սեռական հարաբերություն ունենա կույսի հետ, ապա կրուժվի: Սրանով առաջնորդվելով՝ ՄԻԱՎ-ով վարակակիր տղամարդը սկսում է փնտրել հաշմանդամություն ունեցող կնոջ, կարծելով, թե նա կույս կլինի, և ինքը բուժվելու հնարավորություն կունենա: Իրականում բոլորովին էլ այդպես չէ:

Կույսի հետ սեռական հարաբերություն ունենալը միայն կտարածի ՄԻԱՎ-ը և չի բուժի վարակակրին:

Որոշ ժամանակ առաջ ես համդիացի մի տղամարդու: Նա ինձ ասաց, որ եթե որոշի արտամուսնական կապ ունենալ, այն կլինի միայն ինձ հետ: Եթե նրան հարցո՞ւ ինչու՞, պատասխանեց, որ հաստատ համոզված է ես չեմ հղիանա, և ՄԻԱՎ-ի վարակակիր չեմ:



8

Ինչպես և իմանալ ՄԻԱՎ-ի վարակակիր լինելու մասին

ՄԻԱՎ քես

Եթե այս վարակն անցնում է արյան մեջ, իմունային համակարգը հարուցիչի դեմ պայքարելու համար սկսում է հակամարմիններ արտադրել: 2-4 շաբաթվա ընթացքում թեստը կարող է արյան մեջ հայտնաբերել դրանք: Սա ՄԻԱՎ-ը հաստատելու միակ եղանակն է:

ՄԻԱՎ թեստի դրական պատասխանը նշանակում է, որ դուք վարակակիր եք և նույնիսկ գերազանց ինքնազգացողության դեպքում այն կարող եք փոխանցել մյուսներին:

Բացասական պատասխանից կարող եք պարզել, որ.

- ՄԻԱՎ-ի վարակակիր չեք,
- կամ վերջերս եք վարակվել դրանով, սակայն օրգանիզմը դեռ չի արտադրել թեստի համար նկատելի բավարար հակամարմիններ:

Եթե թեստը տվել է բացասական պատասխան, բայց ունեք կասկածներ, ապա պետք է 6 շաբաթ անց նորից զննություն անցնեք: Եթենու դրական պատասխանի դեպքում նույնպես կրկնակի թեստի անհրաժեշտություն է լինում: Փորձառու բուժաշխատողը կարող է ձեզ օգնել դրոշում կայացնելու հարցում:

Ցուցում.

Թեստն ու խորհրդատվությունը կատարվում են միաժամանակ և դառնում առավել հասանելի: Բուժաշխատողին հարցրեք, թե ձեր համայնքում որտեղ կարող եք զննություն անցնել: Որոշ հիվանդանոցներում և առողջապահական կենտրոններում ՄԻԱՎ-ի արագ թեստը հիմնականում հասանելի է, բավականին մատչելի կամ՝




Խորհրդագովորյուն

Թեստը պետք է կատարվի միայն՝

- ձեր թույլտվությամբ,
- այն դեպքում, եթե դրանից առաջ և հետո ապահոված է խորհրդատվությունը,
- գաղտնի, միայն դուք և վատահելի մարդիկ պետք է տեղեկանաք պատասխանի մասին:

**ՄԻԱՎ-ով վարակակիրների և նրանց
ընտանիքների համար խորհրդատվությունը
կարող է նշանակել՝ տարբերություն ցանկության
և հոլոյի միջև։ Ինչպես ասում է ՄԻԱՎ-ով
վարակակիր մի կիմ Քենիայից՝ «Եթր հանդիպում
ես լավ խորհրդատուի, թվում է, թե բուժվել ես»։**



ԱՊՈՂԾԻՆԵԼՈՒ ԻՆԿԱՌՈՒԹԵՐԸ

ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի փորձված խորհրդատուն կարող է ձեզ օգնել՝ որոշելու՝ կա՞
արդյոք թեստ անցնելու անհրաժեշտություն, թե՞ ոչ։

Դրական պատասխանի դեպքում նրա խորհրդով կորոշեք՝ ում ասել այդ մասին
և ինչպես ընդունել ձեր կյանքում կատարված փոփոխությունը։

Պահպաներ զաղղություն

Յուրաքանչյուր կին պետք է կարողանա ինքնուրույն որոշում կայացնել, թե ում
և ինչպես ասի իր կարգավիճակի մասին։ Կարենք է, որ կանայք այդ թեմայով
զբոցեն իրենց գուգընկերոց կամ գուգընկերների հետ, որպեսզի նրանք ևս անցնեն
թեստավորում և կարողանան պահպանել իրենց առողջությունը։ Կանանցից ոնանք
պատմում են իրենց ընտանիքներին և այն մարդկանց, ովքեր կարող են իրենց ա-
ջակցել։ Բայց հաճախ նրանք վախենում են, որ համայնքում որևէ մեկը կտեղեկանա
այդ մասին։

Հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար դժվար է բուժաշխատողի հետ ա-
ռանձնազրույց ունենալը, քանի որ

- Բուժաշխատողին երբևէ չեն սովորեցրել, որ նրանց պետք է վերաբերվել նոյն հարգանքով, ինչպես մյուսներին:
- Բուժաշխատողը, առանց կնոջը տեղեկացնելու, կպատմի նրա ընկերներին և ընտանիքի անդամներին վերջինիս առողջական խնդիրների մասին, ներառյալ՝ ՄԻԱՎ-ի և սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների:
- Սա հատկապես լինում է այն դեպքում, եթե կինն ունի հաղորդակցման խնդիր:
- Կնոջ ընտանիքի անդամները բույլ չեն տա, որ նա մենակ այցելի բուժաշխատողին:

Իմ խլության պատճառով ես միշտ գաղտնիության հետ կապված խնդիրներ եմ ունեցել, հատկապես՝ այն դեպքերում, եթե թարգմանչը օգնությամբ է գրուցում բուժաշխատողի հետ: Այս թարգմանիչը, ով աշխատում է հիվանդանոցում, գիտի, որ այն, ինչի մասին ես և բուժաշխատողը գրուցում ենք, գաղտնի է և անձնական: Նա ոչ ոքի չի պատմի, նույնիսկ՝ այլ բուժաշխատողի:



Եթե ինձ հետ է լինում իմ սեփական թարգմանիչը, ես նրան նախագուշացնում եմ, որ այն, ինչի մասին զրուցելու ենք ես և բուժաշխատողը, խստ անձնական է: Ես փորձում եմ համոզվել, որ նա գիտակցում է թեստի պատասխանների գաղտնիությունը: Ես խնդրում եմ, որ նա ոչ մեկին չպատմի այդ մասին՝ առանց իմ թույլտվության, նույնիսկ՝ ընտանիքիս անդամներին:

8

Բուժեր ՄԻԱՎ/ԶԻԱՎ-ի առաջացրած առողջական խնդիրները

ԶԻԱՎ-ով անձը կարող է հեշտությամբ ձեռք բերել առողջական այլ խնդիրներ: Ահա որոշ ընդիանուր տեղեկատվություն դրանց մասին, բայց ավելի լավ է դիմել բուժաշխատողի կամ կարդալ «ՄԻԱՎ-ը, առողջությունը և ձեր համայնքը» գիրքը՝ մանրամասներին ծանրանալու համար:

ՄԻԱՎ/ԶԻԱՎ-ի առաջացրած ընդիանուր առողջական խնդիրներն են.

Զերմություն: Զերմությունը հաճախ կարող է տատանվել: Դժվար է ասել՝ դրա իրական պատճառը բուժվող բորբոքումներն են, ինչպիսիք են բորախտը, սեռական ներքին օրգանների բորբոքումները, մալարիան, թե՛ ՄԻԱՎ-ը: Եթե զերմության պատճառը բորբոքումն է, ապա անպայման բուժեք այն:

Փորլուծություն: Սա կրկնվող երևույթ է, և այն դժվար է բուժել: ԶԻԱՎ-ով վարակված մարդկանց փորլուծության հիմնական պատճառը ՄԻԱՎ բորբոքումն է, կամ այն կարող է լինել որոշ դեղամիջոցների առաջացրած կողմնակի ազդեցությունների հետևանքով:

Մաշկային ցան և քոր: Հաճախ դժվար է գտնել սրանց առաջացման պատճառները: ՄԻԱՎ/ԶԻԱՎ-ի հետևանքով մաշկային խնդիրներ կարող են առաջանալ.

- Դեղորայքային ալերգիկ հակագրեցության պատճառով:
- Արյան անորթների քաղցկեղի կամ ավշային հանգույցներում կապոշիի սարկոմա կոչվող գոյացությունների հետևանքով, որոնք մաշկի վրա առաջացնում են շագանակագույն կամ վարդագույն բծեր:



- Ավշային հերպես, որը սովորաբար սկսվում է ցավոտ, պատռվող բշտիկային ցանի տեսքով: Այն հիմնականում լինում է դեմքի, մեջքի և կրծքավանդակի շրջանում:

Սրտխառնոց և սրտբափոց: Առաջանում են բորբոքումների, որոշ դեղամիջոցների, ստամոքսա-աղիքային խնդիրների կամ հենց ՍԻԱՎ-ի հետևանքով:



Հազ: Առկա է բորբային խնդիրների դեպքում, ինչպիսիք են բորերի բորբոքումը կամ բորբախտը: Գրգոված կամ բորբոքված բորերն արտադրում են մեծ քանակությամբ լորձ, որն էլ դառնում է հազի պատճառ:

Թորախտ: Մանրէների պատճառով առաջացած լուրջ բորբոքում է, որն ազդում է բորերի վրա: ԶԻԱՀ-ի և թորախտի նախանշանները նման են միմյանց, բայց դրանք տարբեր հիվանդություններ են: Թորախտով վարակված որոշ տղամարդիկ, կանայք և երեխաներ չեն ունենում ԶԻԱՀ: Բայց ԶԻԱՀ ունեցողը կարող է հեշտությամբ վարակվել բորբախտով, քանի որ օրգանիզմը շատ թույլ է՝ դրա դեմ պայքարելու համար: ԶԻԱՀ-ից մահացած երեք անձից մեկի մահվան պատճառը բորբախտն է:

Քերանի և կոկորդի հետ կապված խնդիրներ: Իրենց մեջ ներառում են գրգովածություն, ճարեր, վերքեր, բշտիկներ և սպիտակ բծեր լեզվի վրա:

Քաշի կորուստ և թերսնում: ԶԻԱՀ-ով վարակվիր անձը կարող է մշտական հիվանդության, փորլուծության, ախտրժակի բացակայության, բերանի բորբոքումների և ուտելու ընթացքի հետ կապված դժվարության հետևանքով թերսնվել, որը կանխում է կերակրի սնուցիչների ներծծումն օրգանիզմի մեջ:

ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի բուժումը

Ո՛չ ժամանակակից բժշկությունը, ո՛չ ավանդական բուժական համակարգը դեռևս չեն գտել բուժում ԶԻԱՀ-ի դեմ: Բայց կան շատ միջոցներ, որոնք կարող են օգնել վարակվիր մարդուն: Մաքուր ջուրը և հագուստը, հագեցած սնունդը, հանգստի և քննելու վայրերի մաքրությունը, ընտանիքի ու ընկերների լավ վերաբերմունքը կարող են օգնել, որ նա պահպանի իր առողջությունը: Այն սնունդը, որն օգտակար նաև վարակվիր անձնավորությանը:



Չնայած ԶԻԱՀ-ը բուժում չունի, բայց ներկայումս կան հակառետրովիրուսային դեղամիջոցներ, որոնք շատ օգտակար են վարակվիր անձանց համար: Դրանք ամրացնում են հիվանդի իմունային համակարգը, ուստի նա կարող է դիմակայել վարակին և պահպանել իր առողջությունը: Սակայն ՍԻԱՎ-ն անբուժելի է: Հարուցիչի որոշ քանակություն միշտ մնում է օրգանիզմում, և վարակվիր անձը կարող է այն փոխանցել այլ անձնավորության:

Լավ բուժօգնություն ստանալը հաճախ դժվար է հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար, իսկ ՍԻԱՎ-ով վարակվիրներն այս հարցում առավել դժվարությունների են հանդիպում: Բուժաշխատողները, հնարավոր են, չկամությամբ թեստավորեն կամ բուժեն կանանց, քանի որ կարծում են, թե նրանք չեն կարող վարել

սեռական կյանք, վարակվել ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ով, իսկ վարակվելու դեպքում էլ շատ շուտ կմահանան:

Բայց հաշմանդամություն ունեցող կանայք նոյնպես գտնվում են ԶԻԱՀ-ով վարակվելու վտանգի առաջ, ինչպես նյուտերը, և բուժման դեպքում կապրեն երկար և առողջ կյանքով:

Հակառեպրովիրուսային թերապիա: ՀՌԹ

Սա նշանակում է՝ օրական առնվազն երկու անգամ ընդունել 3 հակառետրովիրուսային դեղամիջոցների համակցություն: Եթե ԶԻԱՀ-ով վարակակիրը սկսում է ընդունել դեղորայք, պետք է այդ անի պարտաճանաչորեն, ամեն օր: Հակառետրովիրուսային թերապիայի ընթացքում կավելանա կնոջ քաշը, նաև ավելի առողջ տեսք և լավ ինքնազգացողություն կունենա: Իսկ եթե ընդիհատում է բուժումը, կորցնում դեղորայքի չափաբաժնը կամ այն ընդունում է տարբեր ժամերի, ապա հիվանդությունը կրկին գլուխ կրաքարացնի և կրուլացնի օրգանիզմը:

Չնայած այն փաստին, որ բուժման այս տեսակը թանկարժեք է, որոշ երկրներում այն դաշնում է ավելի մատչելի և հասանելի: Կառավարությունը կամ առողջապահական այլ ծրագրեր կարող են առաջարկել մատչելի կամ անվճար հակառետրովիրուսային թերապիա:

Նոյնիսկ այս դեպքում, շատ երկրներում ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի դեղորայքը մատչելի չէ շատերին: Հարուստ երկրներում հզոր դեղագործական ընկերությունները շատ հաճախ խոչընդոտում են մյուս տարածքներում առավել էժանագին դեղամիջոցների արտադրությունը: Սա խանգարում է վարակակիր միջնավոր կանանց՝ ձեռք բերելու անհրաժեշտ դեղամիջոցներ:

Որոշ վարակիչ հիվանդությունների դեղորայքային կանխարգելումը

ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ով վարակակիրների դեպքում քողրիմոքսազոլի ընդունումն օգնում է կանխիկ բոքաբորբը, փորլուծությունը և այլ հիվանդություններ: Դուք կարող եք սկսել այս դեղամիջոցի ընդունումը, եթե խնդիրներ ունեք քաշի կորսարի հետ, շրբումքների վրա առաջացել են վերքեր և ճաքեր, ցան, որը զուգորդվում է քորով, թերանային խոցերով կամ հաճախակի հարրուխով:

Բուժում

Խմեր 960գ քողրիմոքսազոլ (կրկնակի չափաբաժն) ամեն օր, ջրի մեջ քանակության հետ միասին: Հնարավորությամ դեպքում ընդունեք դեղորայքը՝ անկախ չեր ինքնազգացողությունից:

Կարեւոր է.


ԶԻԱՀ-ով վարակակիրների համար քողրիմոքսազոլի դեմ հակազդեցությունը քնական է: Դադարեցնեք դրա ընդունումը, եթե առաջացնում է մաշկային նոր ցան կամ դեղորայքին ալերգիայի այլ նախանշաններ:

Որոշ կանայք, նախքան հակաբորբոքայիններ ընդունելը, ունենում են սեռական օրգանների ավելի լուրջ սնկային բռբորում: Յոզուրը կամ թթվասեր ուտելը, կամ ջրային լոգանքը, որում առկա է յոզուրի կամ քացախի որոշ քանակություն, կարող են օգնել:

Որոշ երկրներում խորհուրդ է լրացնել դեղամիջոցների՝ բոքախոր կանխիկու համար: Այս թեմայով զրուցեք փորձառու բուժաշխատողի հետ:

Լավ սնկելը

ԶԻԱՀ-ը խանգարում է լավ մարսողությանը, ազդում ախտրժակի վրա, այդ պատճառով էլ մարդք սկսում է նիհարել: Սա կարող է լինել նաև դեղորայքի կողմնակի ազդեցությունների, բերանի և կոկորդի բորբոքումների, փորլուծության և դժվարամարս ճարպերի հետևանքով:



Հատկապես կարևոր է վարակակիրների լավ սնվելը, որպեսզի շոնենան քաշի կորուստ, և օրգանիզմն ու իմունային համակարգը լինեն հնարավորինս առողջ: Ուստի փորձեք ճեր ճաշացանկի մեջ ներառել բազմազան և որակյալ մքերքներ, խմեր մաքրուր ջուր և ամեն օր օգտագործեք մուլտիվիտամիններ: Հնարավորության դեպքում ընդունեք հավելյալ A, C և E վիտամիններ, քանի որ դրանք դանդաղեցնում են ՍԻԱՎ հարուցիչի զարգացումը օրգանիզմում:

Վիտամին A պարունակող մքերքներն են՝ գազար, մանգո, պապայա, քաղցր կարտոֆիլ, կաթ, ձու և մուգ կանաչ տերևներով բանջարեղեն (գանգրակաղամբ, սպանախ, շաղգամ):

Վիտամին C-կարմիր և կանաչ պղպեղ, մուգ կանաչ տերևներով բանջարեղեն (գանգրակաղամբ, շաղգամ, մանանեխ և սպանախ), նարինջ, դեղին և կարմիր մրգեր:

Վիտամին E-ձու, նուշի յուղ, եգիպտացորեն, արմավենու ընկույզներ, գետնանուշ, արևածաղկի սերմ, ցորենի հատիկներ և ձիթապտուղ:

Ախտրժակի բացակայության դեպքում, հնարավոր է, ճեզ համար հեշտ լինի առավոտյան մեծ չափաբանով սննդի ընդունումը: Կամ կարող եք նախընտրել քիչ բանակությամբ սնունդ՝ օրական 6-8 անգամ: Սնվելիս սառը հեղուկների գործածությունը առավել դյուրին է դարձնում կլման ակտը:

Ես ԶԻԱՀ-ի վարակակիր եմ, բայց կարող եմ ընդունել լավ սնունդ, մաքրուր ջուր և դեղամիջոցներ: Ինձ լավ եմ զգում և շարունակում եմ կատարել իմ աշխատանքը: Փոստատանը տեսակավորում և դասավորում եմ նամակները:



Համակերպեկար ՍԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ով սպրելուն

Դուք առողջ կմնաք, եքեւ.

- Խմեք մաքրուր, ապահով ջուր և սրնունդը պատրաստեք դրանով:
- Խուսափեք հում բանջարեղենից, քանի որ այն դյուրամարս չէ, կարող է պարունակել մանրէներ:

- Ընդունեք հեղուկի մեծ քանակություն և հետևեք, որ ճեր օրգանիզմում չառաջանան ջրազրկման նախանշաններ:
- Ընեք օրական առնվազն 8 ժամ, իսկ հոգնածության զգալու դեպքում հանգստացեք:
- Ժամանակ անցկացրեք ընկերների և ընտանիքի հետ:

- Արեք այն, ինչը ծեզ հաճույք է պատճառում:
Բարձր տրամադրությունը բուժնան մի նասն է:
- Մի՛ հուզվեք: Հոգեկան լարվածությունը կարող է վնասել ծեր իմունային համակարգը:
- Չբաղվեք առօրյա գործերով և փորձեք լինել առավել եռանդուն:
- Հնարավորինս մարզվեք:
- Խուսափեք ծխախոտից, ալկոհոլից և դեղորայքից:
- Հաճախակի լվացվելով՝ կանխեք վարակները:
- Վարեք ապահով սեռական կյանք, քանի որ բորբոքումներն ու հղիությունը բուլացնում են իմունային համակարգը:
- Շուտ արձագանքեք խնդիրներին, որպեսզի կանխարգելի նոր հիվանդությունների առաջացումը:
- Փորլուծությունը կանխելու համար ընդունեք քոտրիմոքսազոլ:
- Այն վայրերում, որը տարածված է մալարիան, քնեք անկողնային քողի տակ:

Պայքարեք հիվանդությունը տարածող պատճառների, ոչ թե վարակիրների դեմ: Խորականությունը խոչընդոտում է մարդկանց կանխելու վարակի տարածումը:



8

ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի խարանը

Որոշ համայնքներում ՄԻԱՎ կամ ԶԻԱՀ ունեցողներին ստիպում են ամաչել: Նրանց հետ ոչ յի հաղորդակցվում, որվիետու մտածում են՝ վարակակիր անձն ու նրա ընտանիքը խայտառակում են համայնքը:

Հազարավոր վարակակիրներ թաքցնում են իրենց կարգավիճակը՝ վախենալով ընկերների, ընտանիքի և հարևանների արձագանքից, եթե նույնիսկ վարակվել են ոչ պատահական հարաբերության հետևանքով:

Նրանցից ոմանք և ընտանիքները ամորի ու խայտառակության պատճառով իրենց համայնքից օգնություն չեն խնդրում: Սա կարող է խոչընդոտել վարակակիր անձի՝ օգնություն և բուժում ստանալուն, նույնիսկ այն դեպքում, եթե դեղորայքը հասանելի է, որը և բույլ կտա նրան ապրել ավելի երկար և առողջ կյանքով:

Վարակի կանխումը տևային պայմաններում

Ոմանք կարծում են, թե ՄԻԱՎ-ը հեշտությամբ է տարածվում: Սակայն այդպես չէ: Այս ուղեցույցներին հետևելիս հիշեք, որ չկա ՄԻԱՎ կամ հեպատիտ ծեռք բերելու և տարածելու ոչ մի վտանգ հենց վարակակիր անձից կամ նրան շրջապատողներից:

- Որևէ մեկի հետ մի օգտագործեք ածելիներ, ասեղներ, կտրող այլ գործիքներ և ատամի խոզանակներ: Եթե ստիպված եք նրա հետ զուգահեռ օգտագործել նոյն պարագաները, ապա նախապես դրանք 20 րոպե եռացրեք:
- Վերքերը վիրակապեք մաքուր կտորով: Բոլորը, անկախ նրանից, ՄԻԱՎ-ի կամ հեպատիտի վարակակիր են, թե ոչ, պետք է հետևեն այս խորհրդին:
- Թաղեք կամ այրեք բոլոր այն վիրակապերը, որոնք այլևս լվացման ենթակա չեն:

- Խուսափեք օրգանական հեղուկներին ձեռքով դիպչելոց: Անմաքուր վիրակապերը, կտորները, արյունը, փխսուքը կամ կղանքը թափելու համար օգտագործեք բուլը, ուստինե ձեռնոցներ կամ մեծ տերևներ:
- Կեղտուտ շորերն ու անկողնային պարագաները փոխելոց հետո լվացվեք մաքուր ջրով և օճառով: Դրանք լվանալու համար պետք է:
 - Հեռու պահել մեկ որիշի անկողնային պարագաներից:
 - Առանձին լվանալ կտորի այն հատվածը, որի վրա առկա են օրգանական հեղուկներ:
 - Լվանալ օճառաջրով, փոել շորանալու, հնարավորության դեպքում՝ արևին, և ծալել կամ արդրուել, ինչպես արվում է տպիրաբար:
- Անկողնային պարագաները լվանալու ընթացքում օգտակար է, բայց ոչ պարտադիր, որ կրեք ձեռնոցներ կամ ուստինե պարկեր:

ՄԻԱՎ-Ը կանխելու այլ եղանակներ

Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունները բուժեք վաղ շրջանում: Բորբոքում ունենալու դեպքում ավելի է մեծանում ՄԻԱՎ-ով կամ այդ ճանապարհով փոխանցվող այլ վարակների հավանականությունը:

- Ներարկում ստանալուց առաջ համոզվեք, որ գործիքները մանրէազերծված են: Բուժաշխատողները չպետք է կրկնակի օգտագործեն ասեղներն ու ներարկիչները:
- Երբեք որևէ մեկի հետ զուգահեռ մի օգտագործեք ասեղ կամ ներարկիչ, եթե նախօրոք 20 րոպե չեն եռացվել կամ ախտահանվել:
- Համոզվեք, որ կտրվածքներ, ալկանջի դակում, ասեղնաբուժություն կամ ավանդական այլ եղանակներ, ինչպիսին է դաշվածքը, կատարող գործիքները եռացվել են առնվազն 20 րոպե:
- Զգուշացեք օրգանական հեղուկներից, ինչպիսիք են արյունը, փխսուքը, կղանքը կամ մեզը:
- Ցանկացած արյուն պետք է անցնի ստուգում՝ ՄԻԱՎ-ը և հեպատիտը հերպելու համար:

Նոյնիսկ այդ դեպքում խուսափեք արյան փոխներարկումից, եթե չկա կյանքին սպառնացող վտանգ:



Ապահով սեռական հարաբերություն

Մեծամասամբ ՄԻԱՎ-ը և այլ վարակներ փոխանցվում են սեռական ճանապարհով: Դուք կարող եք պաշտպանվել դրանցից, եթե տեղեկացված լինեք ապահով սեռական հարաբերության, հարգանքի, պահպանակների հասանելիության և ձեր զուգընկերոց հետ մտերմության մասին:

Այն կանանց համար, ովքեր չեն կարող կամ ում չեն բույլատրում որոշումներ կայացնել իրենց սեռական կյանքին վերաբերող հարցերում, կարող է դժվարանալ վարակներից

խուսափելը: Հնարավոր է՝ աճաշեք կամ վախենաք ձեր զուգընկերոջն ասել, որ պահպանակ օգտագործի, կամ ստիպված լինեք սեռական հարաբերություն ունենալ նրա պահանջով: Հնարավոր է նաև, որ անտեղյակ լինեք նրա վարած անկանոն սեռական կյանքին:

Յուրաքանչյուր կին կարիք ունի տեղեկացված լինելու ապահով սեռական կյանքի մասին:

Ապահով սեռական հարաբերության եղանակներ

Այս դեպքում պետք է գործածել պատնեշային եղանակը (օրինակ՝ պահպանակը): Այն կկանխի սերմնահեղուկի անցումն այլ օրգանիզմ կամ այնպիսի սեռահարաբերությունը, որը կնվազեցնի վարակի փոխանցման հավանականությունը:

Հեշտոցային եղանակը սեռական հարաբերությունների ամենատարածված ձևն է: Սակայն զույգը կարող է փոխանցել և ստանալ սեռական հաճույք՝ տարբեր զրույցների և փաղաքանընների միջոցով: Եթե ձեր զուգընկերը չի ցանկանում պահպանակ օգտագործել, ապա կարող եք փորձել այլ, սեռական հարաբերության ավելի ապահով եղանակ: Սա կարող է հաճելի լինել ձեր զուգընկերոջը և ապահով՝ ձեզ համար:

Ծառ ապահով

- Ընդհանրապես խուսափեք սեռական հարաբերություններից: Դրանց բացակայության դեպքում դուք չեք ենթարկվի սեռական ճանապարհով վարակվելու վտանգին: Երիտասարդ տարիքում որոշ կանաց համար սա կարող է լինել լավագույն տարբերակը, իսկ ոմանց համար՝ անհնար և ոչ ցանկալի:
- Սեռական հարաբերություններ ունեցեք միայն մեկ զուգընկերոջ հետ, այն դեպքում, եթե համոզված եք, որ ձեզ չի դափնանում և հաստատ գիտեք (քեստի միջոցով), որ ձեզանից ոչ մեկը նախորդ զուգընկերոջից չի վարակվել:
- Բավարարվեք միմյանց փաղաքշելով:

Ապահով

- Հարաբերություն ունենալիս անպայման օգտագործեք կանացի կամ տղամարդու լատեքսե պահպանակներ:
- Կնոջ և տղամարդու միջև սեռական հարաբերության որոշ տեսակներ ավելի ապահով են, քան մյուսները, օրինակ՝ համբուրգելը և շփումը:
- Հարաբերություններն առանց պահպանակի շատ վտանգավոր են:
- Եթե տղամարդը խուսափի սերմնաժայթքումից, կնվազի ՄԻԱՎ-ով վարակվելու վտանգը:
- Խուսափեք չոր սեռական հարաբերությունից: Եթե հեշտոցը չոր է, մեծանում է պատովածքի առաջացման և բորբոքման հավանականությունը: Օգտագործեք թուր, սպերմիցիդներ կամ քսուրներ: Պահպանակ օգտագործելու դեպքում խորհուրդ չի տրվում գործածել յուղեր, քսուրներ կամ վագելին, քանի որ դրանց պատճառով այն կարող է պատռվել:

Սեռական հարաբերություններ և դաշտանը

Այս ընթացքում խորհուրդ է տրվում խուսափել հարաբերությունից, մինչև հաստատ համոզվեք, որ դուք կամ ձեր զուգընկերը ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի կամ այլ հիվանդության վարակակիր չեք: Եթե ՄԻԱՎ-ի վարակակիր եք, ապա հարուցիչը կրափանցի և՝ հեշտոցային սեկրեցիայի (արտազատման), և՝ արյան մեջ: Սա մեծանում է ձեր

գուգընկերոց վարակվելու հավանականությունը: Եթե նա վարակված է, իսկ դուք՝ ոչ, ապա դրա փտանգն ավելի է մեծանում դաշտանի ընթացքում: Պահպանակ օգտագործելու դեպքում այն կրճատվում է:

Կատարենք փոխիխություններ

- Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակն ու ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ը ողջ համայնքի խնդիրն են՝ ներառյալ հաշմանդամություն ունեցող կանանց: Երբեմն հաշմանդամություն ունեցողների խմբերը կարծում են, թե կարիք չկա մտահոգվելու սեռական առողջության համար: Բայց սեռական դաստիարակությունը կարող է մարդկային կյանքեր փրկել:
- Սեռական առողջության և այդ ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների մասին տեղեկատվությունը պետք է հասանելի լինի բոլորին՝ ներառյալ հաշմանդամություն ունեցող կանանց: Օրինակ՝ ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի կանխարգելման մասին տեղեկատվությունը, որն հաճախ տարածվում է ռադիոյի կամ տպագիր թերթիկների միջոցով, պետք է մատչելի լինի նաև խոլ և կույր կանանց:

Հաշմանդամություն ունեցողներին ապահովեք ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի և սեռական առողջության մասին տեղեկատվությամբ:



Ի՞նչ կարող են անել հաշմանդամություն ունեցող կանայք

- Հանդիպեք նրանց խնամակալներին, ընտանիքի անդամներին և բացատրեք, թե որքան կարևոր է սեռական դաստիարակությունը բոլորի համար:
- Աշխատեք բուժաշխատողների և ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի խրնողով զբաղվող այլ խմբերի հետ՝ համոզվելու, որ այդ ծառայություններից օգտվում են նաև հաշմանդամություն ունեցողները:
- Եթե որևէ մեկի կողմից ենթարկվել եք սեռական բռնության, ապա դրա մասին պատմեք նրան, ում վստահում եք՝ ընտանիքի անդամին, հարևանին կամ բուժաշխատողին:

Ի՞նչ կարող են անել իմաստակալներն ու բնադրանիքները

Համոզվեք, որ հաշմանդամություն ունեցող կանայք տեղեկացված են ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի և սեռական ճանապարհով փոխանցվող այլ վարակների մասին: Տեղեկատվությունը կազմակերպեք հարգալից և գաղտնի պայմաններում:

Օգնեք հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողներին՝ հասկանալու, որ երբ նրանք մեծանան, կցանկանան սեռական կյանք վարել մյուսների նման:

Համայնքների դերը

Շատ կարևոր է, որ համայնքում բոլորը տեղեկացված լինեն ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի և սեռական ճանապարհով փոխանցվող այլ հիվանդությունների տարածման և կանխարգելման մասին: Այդ դեպքում մարդիկ կգիտակցեն, որ դա կարող է լինել և իրենց կյանքում, ու կձեռնարկեն կանխարգելիչ միջոցներ: Նրանք կհասկանան, որ հաշմանդամություն ունեցող կանայք իրենց պես զբու են նույն ծառայությունների կարիքը:

Պայքարեք հիվանդություններ տարածող պատճառների, ոչ թե վարակակիրների դեմ: ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ի և սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների կանխարգելումն ավելի արդյունավետ կլինի, երբ պայքարն ընթանա սոցիալական և տնտեսական այն պայմաններում, որոնք բույլ կտան կանանց՝ ներառյալ հաշմանդամություն ունեցողներին, ինքնուրույն որոշումներ կայացնել: Որպեսզի աշխատանք գտնելու համար ընտանիքները ստիպված չինեն բաժանվել, իսկ շատերը՝ զբաղվել մարմնավաճառությամբ:

- Համոզվեք, որ բոլորին հասանելի են սեռական առողջության մասին տեղեկատվությունն ու ծառայությունները, ինչպես նաև՝ լատեքսն պահպանակները՝ համայնքում ՄԻԱՎ-ի և սեռական ճանապարհով փոխանցվող այլ հիվանդությունների տարածումը կանխելու համար:
- Համոզվեք, որ ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ով վարակակիր անձանց հասանելի են անհրաժեշտ դեղամիջոցները, մաքուր ջուրը և սննդարար մթերքները:
- Կրթեք համայնքի անդամներին, որ կանխեն հաշմանդամություն ունեցող կանանց և աղջիկների նկատմամբ սեռական բռնությունը և գիտակցեն, որ հաշմանդամություն ունեցող անձի հետ սեռական հարաբերություններն իրենց չեն բուժի ԶԻԱՀ-ից:

8

ՄԵՐԱԿԱՆ ԱԽՈՂՑՈՒԹՅՈՒՆ

Բուժաշխարողի համար

Ներառեք հաշմանդամություն ունեցող կանանց սեռական դաստիարակության դասընթացներում և խմբերում: Հնարավորություններ փնտրեք, որպեսզի առողջության մասին տեղեկատվությունն ավելի հասանելի լինի նրանց խմբերի համար: Սիշտ հարգեք նրանց՝ անձնական հարցերում զաղտմիության իրավունքը: Կնոջ խնդրի մասին երբեք մի զրուցեք մյուսների հետ՝ նույնիսկ ընտանիքի անդամների, մինչև ինքը չտա իր



համաձայնությունը:

- Բացատրեք, թե ինչպես են տարածվում ՍԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ն ու սեռական ճանապարհով փոխանցվող այլ վարակները, և թե ինչպես կարելի է կանխարգելել դրանք:
- Ցույց տվեք, թե ինչպես են օգտագործում կանաց և տղանաբանական պահպանակները:
- Տեղեկացրեք հաշմանդամություն ունեցող կանաց ՍԻԱՎ-ի դեմ օգտագործվող որոշ դեղամիջոցների առաջացրած հնարավոր խնդիրների մասին:
- Որևէ խնդիր ունեցող կնոջ հանդիպելիս՝ պարզեք՝ չի՞ ենթարկվում, արդյոք, սեռական բռնության:
- Համոզվեք, որ նրանց հասանելի են ՍԻԱՎ-ի խորհրդատվությունն ու թեստերը:

Բուժաշխատողները հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողներին կարող են տեղեկացնել, որ եթե նրանք տեղյակ լինեն սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակիչ հիվանդություններին և ՍԻԱՎ/ԶԻԱՀ-ին, ապա հետագայում սեռական կյանք վարելիս ավելի ճիշտ