

រមេងឆ្អឹងខ្នង (Tuberculosis of the Backbone)

លក្ខណៈជំងឺ

ជំងឺរមេងឆ្អឹងខ្នងជាជំងឺម្យ៉ាងមិនមែនធម្មតា ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញនៅតាមសហគមន៍ក្រីក្រ ជាពិសេសវាកើតចំពោះកុមារ ។ ជំងឺរមេងឆ្អឹងខ្នង មានទម្រង់ដ៏សាមញ្ញបំផុត ។

ដូច្នេះសំខាន់បំផុត គឺត្រូវកំណត់សំគាល់ និងព្យាបាលអោយទាន់ពេលវេលា មុនពេលឆ្អឹងខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញ ដែលនាំទៅរកការបំផ្លាញប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ និងកំរិតខ្លួនលែងបាន។

ប្រសិនបើ ចំណុចកណ្តាលខ្នងរបស់កុមារ មានការវិវត្តន៍ទៅរកការកោងខ្លាំង រួមជាមួយទ្រូងទន់ហើយរឹង គេសន្មតថាជាជំងឺរមេងឆ្អឹងជំនី ។ អ្នកអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក មានម្នាក់កើតជំងឺរមេងសួត ។



នៅពេលឆ្អឹងជំនី ពត់ចុះក្រោមខ្នង ពេលនោះកុមារអាចទប់ខ្លួនរបស់គេដោយប្រើប្រាស់ដៃទាំងពីរ ។

ដូច្នេះត្រូវធ្វើការពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតអោយបានឆាប់ ។ ធ្វើការពិនិត្យស្បែកដោយកាំរស្មី X-ray (នៅត្រង់ទ្រូង និងឆ្អឹងជំនី) និងពិនិត្យដោយប្រើប្រព័ន្ធមីក្រូហ្វូតូត្រង់កន្លែងអាប៊ែស(ដុំខ្លះ) ដែលអាចជួយដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន ។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធ X-ray បង្ហាញថាឆ្អឹងត្រូវបានទ្រុឌទ្រោមនោះ កុមារគួរត្រូវធ្វើការព្យាបាលជំងឺរមេង ទោះបីគេមិនអាចមើលឃើញមេរោគរមេងក៏ដោយ ។

រោគសញ្ញា

- វាចាប់ផ្តើមបន្តិចម្តងៗ - ជារឿយៗ ដោយគ្មានការឈឺចាប់ទេនៅពេលដំបូង
- ដុំពកវាកកើតនៅលើឆ្អឹងខ្នង ។ នេះពិប្រោះតែផ្នែកខាងមុខនៃឆ្អឹងខ្នងមួយ ឬច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញ និងទន់បាក់




- កុមារមានបញ្ហាក្នុងការបត់ខ្លួនចាប់កាន់អ្វីមួយ ទៅតាមចលនាដែលគេចង់ធ្វើ
- បួសពេញទៅដោយខ្លះ ដែលអាចបង្កើតនូវដុំពកនៅក្នុងឆ្អឹងជំនី ។ វាអាចបើកចំហរផ្នែកខាងក្រោមនៃរាងកាយ និងបណ្តាលអោយចេញខ្លះ
- នៅពេលស្ថានភាពកាន់តែពិបាកទៅៗ ការឈឺចាប់អាចកើតមានឡើងម្តងទៀត
- រោគសញ្ញានៃរបួសខ្លះឆ្អឹងខ្នង អាចអោយមានការឈឺចាប់ស្លឹកខ្សោយ ឬខូចកំណត់នៃប្រអប់ជើង និងជើង ហើយបាត់បង់នូវទឹកនោម និងមិនអាចគ្រប់គ្រងទៅលើពោះវៀន (សូមមើលរបួសខ្លះឆ្អឹងខ្នង)
- ការពិនិត្យមើលទៅលើស្បែកនៃជំងឺរមេង ជាទូទៅមានលក្ខណៈវិជ្ជមាន ។ (ទោះជាយ៉ាងណា ការពិនិត្យស្បែកអាចធ្វើទៅបានក្នុងករណីដែលកុមារមិនត្រូវបានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរមេង) ។
- ជាញឹកញាប់ មានសមាជិកម្នាក់ ក្នុងក្រុមគ្រួសារឆ្លងជំងឺរមេង ។
- មានកុមារពាក់កណ្តាលប៉ុណ្ណោះ ដែលមានជំងឺរមេងឆ្អឹងជំនី និងរមេងសួត ។

ការព្យាបាល

- យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំ ត្រូវប្រើថ្នាំព្យាបាលជំងឺរបេង ២ ទៅ ៣ ដង នេះសំដៅទៅលើជំងឺរបេងស្ងួត (សូមមើលត្រង់កន្លែងដែលគ្មានវេជ្ជបណ្ឌិត) ។
- **រលាបដាក់ខ្នង** អាចជួយអោយឆ្អឹងជំនីដែលរងការបំផ្លាញបានត្រង់ឡើងវិញ ដែលទ្រនាប់ធ្វើឡើងដោយម្តងសីលា ឬដីរដោយប្រើនូវបច្ចេកទេសស្រដៀង និងបច្ចេកទេសធ្វើរលាបជើងដីរដៃ ។

ឬក៏ធ្វើទ្រនាប់ខ្នងយ៉ាងសាមញ្ញបំផុត មកពីកំប៉ុងដែក ឬស្នូរ:

១. កាត់ចេញមួយបន្ទះពីកំប៉ុងរឹង



២. ដាក់កំប៉ុងដោយប្រើព្យញ្ជូរទៅតាមរាងខ្នងរបស់កុមារ ពត់ថ្នមៗនៅលើខ្នងអោយបានត្រង់ដែលអាចធ្វើទៅបាន



៣. រុំដោយប្រើក្រណាត់ទន់លើកំប៉ុង



៤. បង់រុំទន់តាមនឹងខ្នងរបស់កុមារយ៉ាងណែន



ចូរប្រយ័ត្ន: ធានាថា បង់រុំនោះមិនធ្វើអោយកុមារឈឺចាប់ ខូចស្បែក ឬក៏ធ្វើអោយគេពិបាកដកដង្ហើម ។

នៅទំព័រមុន អ្នកបានឃើញរូបកុមារ ដែលត្រូវបានដាក់ចន្លោះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមបែបបូរណ ។

- ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ឬការរីកកាត់ អាចជាការចាំបាច់ដើម្បីតំរង់ឆ្អឹងជំនីអោយបានត្រង់ និងលែងឃ្លឹងឃ្លោង

ចូរប្រយ័ត្ន: ដោយសារតែការប្រថុយនឹងការកំរើកខ្លួនលែងរួច បើអាចធ្វើបានការរីកកាត់ដោយដាក់រលាបត្រូវបានគេ ពិគ្រោះយោបល់ ។

ក្តីសង្ឃឹមក្នុងពេលអនាគត

នៅពេលកើតភ្លាមៗ ត្រូវធ្វើការព្យាបាលឆ្អឹងដែលបាក់អោយជាសះស្បើយ ពេលនោះកុមារអាចរស់រានដូចធម្មតា ថ្វីត្បិតតែកោងពឹងឡើងក៏ដោយ ។

ប្រសិនបើប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទខូច និងកំរើកលែងរួចបានចាប់ផ្តើមនោះ ជួនកាលការរីកកាត់(ឬជាការដាក់រលាបក្នុងពេលព្យាបាល) អាចកែលំអបានយ៉ាងល្អ ។

នៅពេលប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទខូចធ្ងន់ធ្ងរ ការស្តារលទ្ធភាពពលកម្មនឹងត្រូវធ្វើដូចជាជំងឺរបេងខ្លាំងខ្លាំងដែរ ។

ការបង្ការ ត្រូវកត់សំគាល់ និងព្យាបាលជំងឺអោយបានឆាប់ ក្នុងគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រ ការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរបេងអាចជួយបានផងដែរ ។