


ລະບົບຖ່າຍເທ ແລະ ອະໄວຍະວະເພດ

ບົດທີ 18

ລະບົບຖ່າຍເທເຮັດໜ້າທີ່ລະບາຍຂອງເສຍອອກຈາກເລືອດເຊິ່ງກຳຈັດອອກມາໃນຮູບແບບນ້ຳຢຸ່ງວ: ຄຳອະທິບາຍຮູບ:


ໝາກໄຂ່ຫຼັງ:
ກິນຕອງເລືອດ
ແລະ
ຜະລິດນ້ຳຢຸ່ງວ.



ພິກຢຸ່ງວຄືຖືງເກັບນ້ຳຢຸ່ງວ ເຊິ່ງຂະຫຍາຍໄດ້ ເມື່ອມີນ້ຳຢຸ່ງວເຂົ້າ.

ທໍ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງ:
ຄືທໍ່ທີ່ສົ່ງນ້ຳຢຸ່ງວ
ໄປສູ່ພິກຢຸ່ງວ.

ທໍ່ຢຸ່ງວຈະນຳນ້ຳຢຸ່ງວ
ອອກມາຜ່ານທາງ
ອະໄວຍະວະເພດ
ຊາຍ ຫຼື ຜ່ານຮູນ້ອຍໆ
ໃນອະໄວຍະວະເພດຍິງ.



ອະໄວຍະວະເພດ


ຊາຍ

ພິກຢຸ່ງວ.

ທໍ່ຢຸ່ງວ.

ອະໄວຍະວະ
ສືບພັນຊາຍ (ໂຄຍ).
(ອົງຄະຊາດ)

ຖົງໄຂ່ຫຳທີ່ຫໍ່ຫຸ້ມໄຂ່ຫຳ.



ທໍ່ນ້ຳເຊື້ອ

ຕ່ອມຜະລິດນ້ຳລັງໂຕອະສຸຈີ.

ໄຂ່ຫຳ (ແກ່ມອັນທະ)ທີ່
ຜະລິດໂຕອະສຸຈີ (ນ້ຳເຊື້ອ)
ເຊິ່ງເປັນຈຸລັງນ້ອຍໆທີ່ມີ
ທາງເມື່ອມາປະສົມກັບໄຂ່
ຂອງຜູ້ຍິງແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້
ຖືພາ (ມີລູກອ່ອນໃນທ້ອງ).




ຍິງ:

• ຮິມນອກຂອງ
ອະໄວຍະວະເພດຍິງ.

• ຮິມໃນ.

• ຮູທະວານ: ສ່ວນສຸດ
ຂອງລຳໄສ້.



ຈອມສັງວາດແມ່ນຈຸດທີ່ມີຄວາມ
ຮັສຶກ ໄວຄ້າຍຄືກັບອະໄວຍະວະ
ສືບ ພັນເພດຊາຍແຕ່ມີຮູບຮ່າງນ້ອຍໆ.

ຮູຢຸ່ງວເປັນຮູນ້ອຍໆທີ່ນ້ຳຢຸ່ງວ
ອອກມາ.

ຊອງຄອດ (ຮູຫີ) ເບິ່ງໜ້າ 280).

HLI Seattle Health Leaders International Field Draft Copy

ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບທາງເດີນນໍ້າຢູ່ງວ.

ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງມັກເກີດຂຶ້ນກັບທາງເດີນບັດສະວະ ແລະ ເປັນການຍາກທີ່ຈະບອກໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງແທ້. ບາງແນວກໍບໍ່ຮ້າຍແຮງບາງແນວກໍອາດຈະອັນຕະລາຍຫຼາຍ. ໂລກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍນັ້ນອາດຈະເລີ່ມດ້ວຍອາການພຽງເບົາບາງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເປັນການຍາກທີ່ສຸດຈະຫາສາຍເຫດຂອງອາການໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍອາໄສການໃຊ້ປຶ້ມພຽງແຕ່ຫົວດຽວນີ້. ມັນຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ສະເພາະໃນການກວດກາພະຍາດແຕ່ລະຢ່າງຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄວນໄປປຶກສາກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ.

ບັນຫາທົ່ວໄປທີ່ເກີດກັບລະບົບທາງເດີນນໍ້າຢູ່ງວປະກອບມີດັ່ງນີ້:


1. ທາງເດີນບັດສາວະຕິດເຊື້ອ. ໂລກຊະນິດນີ້ທົ່ວໄປແມ່ນມັກເກີດກັບເພດຍິງ. (ບາງຄັ້ງພວກມັນເລີ່ມຈາກຫຼັງຈາກການຮ່ວມເພດ, ແຕ່ອາດຈະເປັນພາຍຫຼັງກໍໄດ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະຕັ້ງຄັນ).
2. ຫົວໝາກໄຂ່ຫຼັງ.
3. ບັນຫາກຸ່ງວກັບຕອມຜະລິດນໍ້າລ້ຽງຕົວອະສຸຈິ (ຖ່າຍເບົາບໍ່ສະດວກເພາະຕ່ອມຂະຫຍາຍຕົວໃຫຍ່ຂຶ້ນ; ມັກຈະພົບກັບຜູ້ຊາຍອາຍຸສູງ).
4. ໂລກໜອງໃນ (ຖ່າຍເບົາບໍ່ສະດວກມີໜອງໃນທີ່ຢູ່ງວເປັນໂລກຕິດຕໍ່ກັນໂດຍກົງຈາກການຮ່ວມເພດ).
5. ຢູ່ບາງພາກສ່ວນຂອງໂລກ, ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກແມກາຝາກທີ່ດູດເລືອດ (ພະຍາດໃບໄມ້ເລືອດ) ແມ່ນເປັນສາຍເຫດຂອງການຢູ່ງວເປັນເລືອດ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ກັບການຕິດເຊື້ອແມກາຝາກຊະນິດອື່ນໆ. ເບິ່ງທີ່ໜ້າ 146

ອາການ:

- ບາງຄັ້ງຮູ້ສຶກວ່າພົກຢູ່ງວຍັງມີນໍ້າຢູ່ງວຢູ່ຕະຫຼອດ

ອາການ:

- ບາງເທື່ອມີໄຂ້ໜາວສັ້ນເຈັບຫົວ.
- ບາງເທື່ອເຈັບຕາມສ້ວງ.
- ເວລາຢູ່ງວມີອາການເຈັບ ແລະ ຕ້ອງທຽວຖ່າຍເບົາເລື້ອຍໆ.
- ບໍ່ສາມາດກັ້ນຖ່າຍເບົາໄດ້ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນເກີດກັບເດັກ).
- ນໍ້າຢູ່ງວເປັນສີຂຸ້ນໆ ຫຼື ແດງ (ເປັນເລືອດ).



ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບຖ່າຍເບົາຢູ່ເລື້ອຍໆ.

- ບາງເທື່ອມີອາການເຈັບບັນແອວ (ໝາກໄຂ່ຫຼັງ) ບວດແອວ.
- ບາງເທື່ອມີອາການເຈັບລົງໄປຕາມຂາ.
- ໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ (ພະຍາດໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ) ໃບໜ້າ ແລະ ຕີນອາດມີອາການບວມ.

ໂລກຕິດເຊື້ອໃນລະບົບທາງເດີນນ້ຳຢ່າງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມັກພົບໃນຜູ້ຍິງ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມ
ທໍລະມານຈາກໂລກນີ້ຫຼາຍ. ແຕ່ໃນຜູ້ຊາຍແລ້ວບໍ່ຄ່ອຍມັກເປັນບານໂດ. ບາງຄັ້ງພຽງແຕ່ມີອາການຖ່າຍ
ເປົາຝືດໆ ເຄື່ອງໆ ແລະ ທຽວຢ່າງເລື້ອຍໆ. ອາການທີ່ໄປກໍ່ມີເຊັ່ນ: ຢ່າງອອກເລືອດ ແລະ ເຈັບ
ຫ້ອງນ້ອຍ. ເຈັບຫຼັງສ່ວນກາງ ຫຼື ສ່ວນລຸ່ມມາເຖິງກະດູກຂ້າງທາງລຸ່ມ ແລະ ມີອາການໄຂ້ນຳກໍ
ສະແດງວ່າອາດຈະເປັນບັນຫາໜັກ.

ການປິ່ນປົວ:



- ດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍໆເພາະວ່າການດື່ມນ້ຳນີ້ຈະຊ່ວຍປິ່ນປົວໃຫ້
ເຊົາຈາກໂລກນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກິນຢາເລີຍ. ດື່ມນ້ຳຢ່າງນ້ອຍ
1 ຈອກທຸກໆ 30 ນາທີໃນເວລາ 3 ຫາ 4 ຊົ່ວໂມງ ແລະ
ອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນເພື່ອຈະເປັນການສ້າງນິດໃສ່ຮັກການດື່ມ
ນ້ຳ. (ແຕ່ຖ້າຄົນເຈັບບໍ່ສາມາດຢ່າງໄດ້ ແລະ ໃບໜ້າ ແລະ
ມືໃຄ່ບວມບໍ່ຄວນກິນນ້ຳຫຼາຍ).
- ຖ້າຄົນເຈັບບໍ່ມີອາການດີຂຶ້ນທັງໆທີ່ກິນນ້ຳຫຼາຍແລ້ວ ຫຼື ຖ້າມີອາການໄຂ້ຄວນກິນຢາໂຄຼຣິໂມຊາ
ໂຊນ (ໜ້າ 357), ອາໂມກຊີຊິລິນ (ໜ້າ 352), ຫຼືຢາເຫຼືອຕາຊິລິນ (ໜ້າ 352). ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ການກິນຢາໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄຳແນະນຳທີ່ບອກໄວ້. ຖ້າຈະໃຫ້ດີເລີຍອາດຈະຕ້ອງກິນຢາເປັນເວລາ
10 ມື້ ຫຼື ກວ່ານັ້ນ. ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນເວລາໃຊ້ຢານີ້ຢູ່ຄວນກິນນ້ຳຫຼາຍໆໂດຍສະເພາະເວລາໃຊ້ຢາ
ຊັ້ນຟານາໂມ.
- ຖ້າອາການຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນໂດຍໄວແລ້ວ ຄວນຮີບໄປຫາແພດ.
- ຢາຊະນິດໃໝ່ໆບາງຊະນິດສາມາດເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບຫາຍໄປ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາໃຫ້ຫາຍຂາດ
ຈາກໂລດຕິດເຊື້ອໃນນ້ຳຢ່າງໄດ້. ສະນັ້ນບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາເຫຼົ່ານັ້ນເກີນກວ່າ 2 ມື້.

ໜັ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ໜັ້ວພິກຢ່າງ:

ອາການ:

- ອາການທຳອິດຂອງໜັ້ວໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຫຼື ໜັ້ວພິກຢ່າງ ມັກມີອາການເຈັບຢ່າງແຮງຢູ່ໃກ້ໆແອວ,
ທາງດ້ານຂ້າງ ຫຼື ຫ້ອງນ້ອຍ ຫຼື ກົກອະໄວຍະວະສືບພັນ (ໂຄຍ).
- ບາງເທື່ອທີ່ຢ່າງຖືກຕ້ານເປັນເຫດໃຫ້ຖ່າຍເປົາບໍ່ຄ່ອຍອອກ ຫຼື ອາດຈະມີເລືອດອອກມາພ້ອມໃນ
ເວລາເລີ່ມຢ່າງ.
- ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນອາດຈະເປັນໂລກຕິດເຊື້ອທີ່ລະບົບທາງເດີນນ້ຳຢ່າງ.

ການປິ່ນປົວ:

- ການປິ່ນປົວແມ່ນໃຊ້ວິທີດຽວກັນກັບການປິ່ນປົວໂລກທາງເດີນນ້ຳຢ່າງຄືດັ່ງໄດ້ເວົ້າມາແລ້ວຂ້າງ
ເທິງນັ້ນ.
- ນອກຈາກນັ້ນແມ່ນໃຫ້ຢາແອດສະໄວລິນ ຫຼື ຢາແກ້ປວດອື່ນໆ ແລະ ຢາລະງັບອາການຊັກກະດູກ
ຫລື ຫົດເກັ່ງ (ເບິ່ງໜ້າ 380).
- ຖ້າຖ່າຍເປົາບໍ່ອອກຍ່ອມມີກ້ອນໜັ້ວຕັ້ນຢູ່ໃຫ້ເຈົ້າລອງຖ່າຍເປົາໃນທ່ານອນຫຼາຍເພາະອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ກ້ອນໜັ້ວກຶ່ງກັບຄືນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຢ່າງເປີດໄດ້.
- ໃນກໍລະນີຢູ່ໃນຂັ້ນຮຸນແຮງໃຫ້ຟ້າວພາຄົນເຈັບໄປພົບແພດເພາະວ່າບາງຄັ້ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າ
ຕັດ.

ຕ່ອມຜະລິດນ້ຳລ້ຽງອະສຸຈິໃຫຍ່:


ພະຍາດນີ້ມັກເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆກັບຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 40 ປີ. ມັນເກີດຈາກການໃຄ່ບວມຂອງຕ່ອມ
ຜະລິດນ້ຳລ້ຽງເຊິ່ງຢູ່ລະຫວ່າງພິກຢ່າງ ແລະ ທໍ່ຢ່າງ.

- ຄົນເຈັບຈະຖ່າຍເປົາບໍ່ອອກ ແລະ ອາດຈະຖ່າຍໜັກຍາກ; ອາດຈະຢ່າງອອກມາຢອດໆ ແຢດໆ ຫຼື
ຖ່າຍເປົາບໍ່ອອກເລີຍ. ບາງຄັ້ງຄົນເຈັບຖ່າຍບໍ່ອອກເປັນເວລາຫຼາຍໆມື້.
- ຖ້າມີອາການໄຂ້ນຳສະແດງວ່າມີການຕິດເຊື້ອ.

Health Leadership International
Field Draft Copy

ວິທີປົນປົວເມື່ອຕ່ອມຜະລິດນ້ຳລ້ຽງອະສຸຈິໃຫຍ່:

- ຖ້າຄົນເຈັບຖ່າຍເປົາບໍ່ອອກ ຄວນນັ່ງແຊ່ໃນອ່າງນ້ຳຮ້ອນຄືດັ່ງຮູບ. ແຕ່ຖ້າຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນຄວນໃຊ້ທ່ສວນຢຽວຈະຊ່ວຍໄດ້ (ໜ້າ 239).
- ຖ້າມີອາການໄຂ້ນໍາ ຄວນໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອເຊັ່ນ: ແອມພິຊິລິນ (ໜ້າ 352) ຫຼື ເຕຕຼາໄຊຄຼິນ (ໜ້າ 355).
- ຄວນໄປພົບແພດເພາະວ່າຖ້າເປັນຫຼາຍໆຫຼືເປັນຊໍາເຮື້ອຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດ.



ພາຍເຫດ: ທັງສອງພະຍາດຄືໂລກຕ່ອມຜະລິດນ້ຳລ້ຽງໄຄ່

ແລະ ໂລກໜອງຈະເຮັດໃຫ້ຢຽວຂັດໆເຄື່ອງໆຄືກັນ. ຖ້າເປັນກັບຜູ້ເຖົ້າມັກຈະເປັນຍ້ອນຕ່ອມຜະລິດນ້ຳລ້ຽງຕົວອະສຸຈິໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າ. ແຕ່ຖ້າເປັນກັບຊາຍໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຳພັນທາງເພດກັບຜູ້ຍິງເປັນໂລກໜອງໃນ (ພາຍໃນໄລຍະ 2-3 ມື້ ເຖິງ 2-3 ອາທິດຜ່ານມາ) ຄັ້ງຈະເປັນໂລກໜອງໃນຫຼາຍກວ່າ.

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ.

ຕໍ່ຈາກນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງການຕິດເຊື້ອໂດຍທົ່ວໆໄປທີ່ມີການຕິດເຊື້ອໂດຍການຮ່ວມເພດ ເຊັ່ນ: ໂລກໜອງໃນ, ໂລກຊີພິລິດ, ແລະ ໂລກຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງບວມ. ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂອງໂລກເອດສ ແລະ ການຮ່ວມເພດທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເຈັບອະໄວຍະວະເພດຊາຍ (ຕ່ານເຕັ້ນຢູ່ອະໄວຍະວະເພດ, ຂີ້ກະຕອດຢູ່ອະໄວຍະວະເພດ, ແລະ ຊີພິລິດທຽມ) ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຢູ່ໜ້າທີ່ 399 ຫາ 403.

ໂລກໜອງໃນ ແລະ ໜອງໃນທຽມ

ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍແມ່ນມີອັນຕາສູງໃນການຕິດເຊື້ອໂລກໜອງໃນແທ້ ຫຼື ໜອງໃນທຽມເຊັ່ນກັນໂດຍທີ່ບໍ່ມີອາການຫຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ໂລກໜອງໃນ ແລະ ໜອງໃນທຽມສາມາດສະແດງອາການຄືກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າໂລກໜອງໃນຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມັກເກີດກ່ອນ ແລະ ມີຄວາມເຈັບປວດຫຼາຍກວ່າ. ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍແມ່ນມີອັນຕາສູງໃນການຕິດເຊື້ອໂລກໜອງໃນ ແລະ ໜອງໃນທຽມໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ຄວນມີການປົນປົວໄປພ້ອມໆກັນໂລດ. ຖ້າວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການປົນປົວບໍ່ວ່າຈະແມ່ນໂລກໜອງໃນແທ້ ຫຼື ໜອງໃນທຽມກໍຈະເຮັດໃຫ້ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍເປັນໝັນໄດ້.

ຖ້າວ່າແມ່ມານຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກໜອງໃນແທ້ ຫຼື ໜອງໃນທຽມບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາກ່ອນເກີດລູກ, ຕາຂອງແອນອ້ອຍອາດຈະຕິດເຊື້ອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ້ (ເບິ່ງໜ້າ 221).

ອາການໃນເພດຊາຍ:

- ໃນເວລາຖ່າຍເປົາມີອາການເຈັບປວດ.
- ບາງຄັ້ງມີໜອງໄຫຼອອກມາ.



ອາການໃນຊາຍ ແລະ ຍິງ:

- ຖ່າຍເປົາຂັດໆ ເຄື່ອງໆ (ບາງຄັ້ງຖ່າຍບໍ່ອອກເລີຍ).
- ເປັນຕຸ່ມມ່ນມ່ານ ຫຼື ຕຸ່ມເບື້ອຍຕາມຕົນໂຕ.
- ເຈັບປວດເນື່ອງຈາກອາການບວມຕາມຫົວເຂົ້າ, ຄໍ່ຕີນ, ຫຼື ຄໍ່ມື.

ອາການໃນຍິງ:

- ມີສິ່ງທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກອະໄວຍະວະເພດມີສີເຫຼືອງ ຫຼື ຊຽວ.
- ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ (ໂລກທ້ອງນ້ອຍອັກເສບ) (ໜ້າ 234)
- ມີໄຂ້
- ມີອາການເຈັບໃນຂະນະຮ່ວມເພດ



HHS Seattle Health Leadership Field Draft Copy International

ໃນເພດຊາຍນັ້ນອາການທຳອິດຂອງໂລກໜອງໃນຈະເລີ່ມໃນໄລຍະ 2 ເຖິງ 5 ມື້ (ເຖິງ 3 ອາທິດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ) ຫຼັງຈາກຮ່ວມເພດກັບຜູ້ເປັນໂລກນີ້. ໃນເພດຍິງອາດຈະບໍ່ມີອາການໃດໆຫຼັງຈາກຕິດເຊື້ອໂລກມາເປັນຫຼາຍອາທິດ ຫຼືເປັນຫຼາຍເດືອນ. ແຕ່ທັງໆທີ່ບໍ່ປາກົດອາການໃດໆນັ້ນກໍສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄປສູ່ຜູ້ອື່ນໄດ້ໂດຍເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫຼັງຈາກຕິດເຊື້ອໂລກນີ້ມາ.

ການປິ່ນປົວ:

- ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາໂລກໜອງໃນແທ້ແມ່ນຮັກສາໂດຍຢາເປນີຊີລິນ, ແຕ່ປະຈຸບັນນີ້ໂລກນີ້ແມ່ນຢາເພນີຊີລິນໃຊ້ແລ້ວບໍ່ໄດ້ຜົນແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດອື່ນໆ. ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ໄປປຶກສາສາທາລະນະສຸກໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສືບຖາມຫາຢາທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫາໄດ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ເຈົ້າຢູ່. ຢາທີ່ໃຊ້ຮັກສາເຊື້ອໂລກໜອງໃນ ຫຼື ໜອງໃນທຽມແມ່ນມີລາຍ ລະອຽດໃນໜ້າ 359. ຖ້າອາການເຈັບປວດບໍ່ຫາຍໄປພາຍໃນ 2 ຫຼື 3 ມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າໂລກໜອງໃນດີ້ຢາຊະນິດນັ້ນ ແລະ ຄົນຜູ້ນັ້ນຈະຕິດເຊື້ອໃນໜອງໃນທຽມໄດ້.
- ຖ້າເພດຍິງທີ່ຕິດເຊື້ອໂລກໜອງໃນແທ້ ຫຼື ໜອງໃນທຽມແມ່ນໄຂ້ ແລະ ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ, ລາວອາດຈະເປັນໂລກທ້ອງນ້ອຍອັກເສບ (ເບິ່ງໜ້າ 243);
- ທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ມີການຮ່ວມເພດກັບຜູ້ທີ່ເປັນໂລກໜອງໃນແທ້ ຫຼື ໜອງໃນທຽມແມ່ນຄວນຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍສະເພາະແມ່ນເມຍຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອໂລກນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີອາການໃດສະແດງອອກ ໃນແມ່ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນກໍຕາມພວກເຂົາກໍມີສິດຕິດເຊື້ອໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ຖ້າວ່າແມ່ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບການ ປິ່ນປົວພວກເຂົາຈະເອົາໂລກນີ້ໄປຕິດໃສ່ຄົນໃຫ້ແກ່ຜົວຂອງພວກເຂົາອີກ.
- ແອນ້ອຍທຸກຄົນຄວນໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນຈາກໂລກໜອງໃນຕິດເຊື້ອທີ່ຕາ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂລກໜອງໃນແທ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕາບອດໄດ້ (ເບິ່ງໜ້າ 221) ສາມາດເບິ່ງວິທີປິ່ນປົວໄດ້ໃນໜ້າ 378.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ຜູ້ທີ່ເປັນໂລກໜອງໃນແທ້ ຫຼື ໜອງໃນທຽມອາດຈະເປັນໂລກຊີພິລິດນຳທັງໆທີ່ບໍ່ຮູ້ເລີຍ. ບາງເທື່ອ ຄວນຈະປິ່ນປົວໂລກຊີພິລິດໄປນຳໂລດເພາະການປິ່ນປົວໂລກໜອງໃນອາດຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນອາການໄລຍະທຳອິດຂອງໂລກຊີພິລິດແຕ່ອາດຈະບໍ່ປິ່ນປົວໂລກນີ້ໄດ້.

ສຳລັບເລື່ອງການປ້ອງກັນໂລກໜອງໃນ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນອື່ນ ເບິ່ງໜ້າ 239.

ໂລກຊີພິລິດ

ໂລກຊີພິລິດເປັນໂລກອັນຕະລາຍທີ່ພົບພໍ້ເລື້ອຍໆ ແລະ ຕິດຕໍ່ຈາກຜູ້ໜຶ່ງໄປຫາອີກຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ໂດຍການຮ່ວມເພດ.

ອາການ:

- ອາການທຳອິດມັກເປັນບາດແຜກາມະໂລກ. ມັນຈະປາກົດຂຶ້ນຫຼັງການຮ່ວມເພດກັບຜູ້ເປັນໂລກນີ້ແລ້ວປະມານ 2 ເຖິງ 5 ອາທິດ. ບາດແຜນີ້ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບສິວ ບາດໂຄ່ພອງນ້ອຍໆ ຫຼື ບາດເປື້ອຍ ແລະ ມັກຈະປາກົດຢູ່ໃນ ອະໄວຍະວະເພດຂອງຊາຍ ຫຼື ຍິງ (ບາງເທື່ອອາດປາກົດຂຶ້ນເທິງຮິມສົບ, ນິ້ວມື, ກັນ ຫຼື ປາກ). ບາດແຜດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍເຊື້ອໂລກທີ່ຕິດຕໍ່ໄປຫາຄົນອື່ນໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ບາດແຜມັກຈະບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບ ແລະ ຖ້າເປັນຂຶ້ນໃນຊ່ອງຄອດຜູ້ຍິງອາດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕໄດ້. ແຕ່ຍັງສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄປຫາຜູ້ອື່ນໄດ້. ຖ້າວ່າມີອາການເຈັບບາດເປື້ອຍ, ມັນອາດຈະເປັນໂລກຊີພິລິດທຽມ (ເບິ່ງໜ້າ 403).
- ບາດຈະເປັນຢູ່ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ແລ້ວກໍ່ດີໄປເອງບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວກໍ່ໄດ້. ແຕ່ເຊື້ອໂລກຈະຍັງແຜ່ລາມຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆທົ່ວຮ່າງກາຍ.



HLI Seattle
 Health Leadership
 Field Dr. [unclear] International

- ຫຼາຍອາທິດ ຫຼື ຫຼາຍເດືອນຕໍ່ໄປອາດຈະມີອາການເຈັບຄໍ, ເປັນໄຂ້ເລັກໜ້ອຍ, ປາກເປື້ອນ ຫຼື ໄຄບວມຕາມຄໍ ຫຼື ອາການຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງຜິວໜັງເຊັ່ນ:

ແຜ່ນຕຸ່ນແດງໆ ຫຼື ສິວທົ່ວ ຮ່າງກາຍທີ່ເຈັບປວດຫຼາຍ.



ເປັນລົມຜິດ ຫຼື ອອກ ຕຸ່ມມູນມານ.



ແຜ່ນຕຸ່ນຄັນເທິງມື-ຕີນ.



ອາການເຫຼົ່ານີ້ຈະຫາຍໄປເອງເຊິ່ງຜູ້ເຈັບມັກຈະຄິດວ່າຕົນເອງດີແລ້ວ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວເຊື້ອໂລກຢັງສືບຕໍ່ ຄູກຕາມເລື້ອຍໆໄປ. ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເປັນຢ່າງດີແລ້ວ ໂລກຊີວິດກໍຈະລາມໄປເຖິງສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກທົ່ວໃຈວາຍ, ອຳມະພາດ, ບ້າ ແລະ ໂລກອື່ນໆອີກຫຼວງຫຼາຍ.

ໝາຍເຫດ: ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອແຕ່ໄປແນມມີການອາການຫຼາຍຢ່າງຄືກັບໂລກຊີວິດ (ເບິ່ງໜ້າ 202).

ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ຖ້າມີຕຸ່ມແປກໆເກີດຂຶ້ນຕາມຜິວໜັງຫຼາຍໆມື້ ຫຼື ຫຼາຍໆອາທິດຫຼັງຈາກມີຕຸ່ມ ຫຼື ບາດປາກົດຂຶ້ນ ຕາມອະໄວຍະວະເພດອາດຈະເປັນໂລກຊີວິດ. ຖ້າບໍ່ແນ່ໃຈຄວນໄປປຶກສາແພດ.

ການປິ່ນປົວໂລກຊີວິດ: (ການປິ່ນປົວຢ່າງຄົບຖ້ວນແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ)

- ຖ້າອາການໂລກໜອງໃນສະແດງອາການໜ້ອຍກວ່າ 1 ປີ ໃຫ້ສັກຢາເປັນຊາຕິນເຟນີຊີລິນ 2.4 ລ້ານໜ່ວຍຄັ້ງດຽວ. ແບ່ງຄັ້ງໜຶ່ງໃສ່ກະໂພກແຕ່ລະຂ້າງ (ເບິ່ງໜ້າ 352). ຄົນທີ່ແພ້ຢາເປນີຊີລິນ ຫຼື ຄົນເຈັບ ປິ່ນປົວດ້ວຍຢາເປນີຊີລິນແລ້ວຍັງ ບໍ່ດີຄວນໃຊ້ຢາເຕຕຼາຊີລິນ ຫຼື ຢາອີລີໂທໄມຊິນຈຳນວນ 500 ມກ, 3 ມື້, ມື້ລະ 4 ເທື່ອ ເປັນເວລາ 15 ມື້.
- ຖ້າອາການສະແດງອອກຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ ໃຫ້ສັກຢາບັນຊາຕິນເຟນີຊີລິນ 2.4 ລ້ານໜ່ວຍໃນໜຶ່ງຄັ້ງ, ແບ່ງຄັ້ງໜຶ່ງໃສ່ກະໂພກແຕ່ລະຂ້າງ, ສັກ 1 ເທື່ອ / ອາທິດເປັນເວລາ 3 ອາທິດ, ປະລິມານຢາແມ່ນ 7.2 ລ້ານໜ່ວຍ. ຄົນທີ່ແພ້ ຢາເປນີຊີລິນ ຫຼື ຄົນເຈັບປິ່ນປົວດ້ວຍຢາເປນີຊີລິນແລ້ວ ຍັງບໍ່ດີຄວນໃຊ້ຢາເຕຕຼາຊີລິນ ຫຼື ຢາອີລີໂທໄມຊິນຈຳນວນ 500 ມິລິກຼາມ, ມື້ລະ 4 ເທື່ອ ເປັນເວລາ 30 ມື້.
- ເຮົາຄວນຮີບເຂົ້າປຶກສານຳແພດໂລດເຊິ່ງອາດຈະຕ້ອງກວດເລືອດ. ຖ້າບໍ່ມີໂອກາດກວດເລືອດກໍຍັງ ຄວນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂລກຊີວິດເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນໄວ້.
- ທຸກໆຄົນທີ່ມີການຮ່ວມເພດກັບຜູ້ທີ່ເປັນໂລກຊີວິດຄວນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍສະເພາະຜົວ ຫຼື ເມຍຂອງຜູ້ເປັນໂລກນີ້.

ໝາຍເຫດ: ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຖືພາ ຫຼື ໃຫ້ນົມລູກທີ່ມີອາການແພ້ຢາເປນີຊີລິນສາມາດໃຊ້ຢາເຕຕຼາຊີລິນ ຫຼື ຢາອີລີໂທໄມຊິນແທນ (ເບິ່ງໜ້າ 355). ເລື່ອງການປ້ອງກັນໂລກຊີວິດເບິ່ງໜ້າຕໍ່ໄປ.


ໂລກຕ່ອມນ້ຳຢາງເຫຼືອງຢູ່ກະດັນຂາແຕກ ແລະ ເປັນບາດຊຳເຮື້ອ.(ຝີໝາກມ່ວງ) ອາການ:

- ໃນຜູ້ຊາຍ: ຕ່ອມນ້ຳເຫລືອງໃຫ່ຍ, ສີເຂັ້ມ ຢູ່ຂາໜີບ, ເປັນແຜເປີດ, ມີໜອງໄຫລ ແລ້ວເຂົາໄປ ແລະ ເປັນຄືນມາອີກ
- ໃນຜູ້ຍິງ: ພົບຕ່ອມນ້ຳເຫລືອງໃຫ່ຍຄືກັບຜູ້ຊາຍ. ຫລື ມີອາການເຈັບປວດ, ມີໜອງຊຶມອອກ ແລະ ເຈັບປວດທີ່ຮູທະວານໜັກ (ຮູຂີ້)

ການປິ່ນປົວ:

- ໄປຫາແພດທັນທີ.
- ໃຊ້ຢາເຕຕຼາໂຊຄລິນຂະນິດແຕ້ບຊູນໆລະ 250 ມກ. 1 ຫຼື 2 ກ້ອນ, ມື້ລະ 4 ເທື່ອເປັນເວລາ 14 ມື້.
- ງົດການຮ່ວມເພດຈົນບາດແຜຈະດີຄັກ.

ໝາຍເຫດ: ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງຢູ່ແອບແອຂາແມ່ນອາການຂອງຊີວິດທຽມ (ເບິ່ງໜ້າ 403).



ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ


ຄວນລະມັດລະວັງໃນການພົວພັນເລື່ອງເພດ: ຜູ້ໃດທີ່ມີການຮ່ວມເພດກັບຫຼາຍຄົນແມ່ນມີອັດຕາສູງຂອງການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ ໂດຍລະເພາະແມ່ນໂສເພນີ. ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຈາກການຕິດເຊື້ອຈົ່ງຊື່ສັດໃນການຮ່ວມເພດກັບຄູ່ຄອງຂອງເຈົ້າເອງເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າວ່າຕົນເອງ ຫຼື ຄູ່ຄອງຂອງເຈົ້າມີການຮ່ວມເພດກັບບຸກຄົນອື່ນແມ່ນໃຫ້ໃສ່ຖົງຢາງອາໄນເປັນປະຈຳເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ.

1. ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍໄວ: ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນສຳລັບຄົນທີ່ເປັນໂລກນີ້ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດຍທັນທີເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແຜ່ເຊື້ອໄປຫາຄົນອື່ນໆ. ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນແມ່ນນຳໄປສູ່ການຕິດເຊື້ອເອດສ ຫຼື ໂລກທີ່ຜ່ານການຮ່ວມເພດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍສະນັ້ນຄວນກຽດການຮ່ວມເພດຈົນກວ່າຈະປິ່ນປົວແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມື້. (ໂລກເອດສແມ່ນບໍ່ສາມາດຮັກສາໃຫ້ດີໄດ້, ຜູ້ໃດທີ່ເປັນໂລກນີ້ແມ່ນລໍຖ້າວັນຕາຍເທົ່ານັ້ນ).
2. ຄວນແນະນຳຜູ້ອື່ນທີ່ເປັນໂລກໄປຮັບການປິ່ນປົວ: ເມື່ອພົບພໍ້ວ່າຕົນເອງເປັນໂລກຊະນິດໃດຊະນິດໜຶ່ງແລ້ວຄວນແນະນຳໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຕົນໄດ້ຮ່ວມເພດນຳນັ້ນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຄືກັນ. ໂດຍສະເພາະຜູ້ຊາຍຈຳເປັນຕ້ອງບອກຜູ້ຍິງທີ່ຕົນໄດ້ຮ່ວມເພດນັ້ນໃຫ້ຮູ້ເພາະຖ້າບໍ່ຮູ້ແລ້ວຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນກໍຈະແຜ່ເຊື້ອຕໍ່ໄປອີກ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງລູກນ້ອຍທີ່ເກີດມາອາດຈະຕິດເຊື້ອໂລກ ຫຼື ອາດຈະຕາບອດໄດ້, ແລະ ແມ່ຍິງຄົນນັ້ນອາດຈະເປັນໜັ້ນ ຫຼື ເຈັບປວດຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.
3. ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນໆ: ແນະນຳໝູ່ເພື່ອນທີ່ເປັນໂລກໄປຮັບການປິ່ນປົວຮັກສາໂດຍໄວ ແລະ ຢຸດເຊົາການຮ່ວມເພດຈົນກວ່າຈະດີຂາດຕົວ.

ວິທີໃຊ້ທີ່ແຫຍ່ (ສາຍຢາງທີ່ໃຊ້ແຫຍ່ໃຫ້ນ້ຳຢູ່ງວອອກມາ)

ເມື່ອໃດຄວນຈະໃຊ້ ແລະ ເມື່ອໃດຄວນຈະບໍ່ໃຊ້ທີ່ແຫຍ່

- ໃຊ້ເວລາຈຳເປັນແທ້ໆເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເວລາບໍ່ສາມາດຊອກຫາແພດໄດ້ທັນນອກຈາກນີ້ແລ້ວບໍ່ຄວນໃຊ້ເລີຍ ເພາະວ່າເຖິງຈະໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງກໍອາດຈະເຮັດອັນຕະລາຍຕໍ່ທີ່ຢູ່ງວໄດ້ຫຼືອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້.
- ຖ້າຖ່າຍເປົາພ້ອມແຕ່ເຖິງຈະມີອອກພຽງເລັກໜ້ອຍກໍຕາມບໍ່ຄວນໃຊ້ເລີຍ.
- ຖ້າຢູ່ງວບໍ່ອອກກ່ອນອື່ນຄວນໃຫ້ນ້ຳຢູ່ງວໃນນ້ຳອື່ນ (ເບິ່ງໜ້າ236). ແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນປິ່ນປົວຕາມໂລກທີ່ເປັນເຊັ່ນ: ໂລກໜອງໃນ ຫຼື ຕ່ອມຜະລິດນ້ຳລ້ຽງໂຕອະສຸຈິອັກເສບທັນທີໂລດ.
- ຖ້າຄົນເຈັບມີນ້ຳຢູ່ງວຢູ່ໃນພິກຢູ່ງວຈົນເຕັມ ແລະ ເຈັບປວດຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຖ່າຍອອກມາໄດ້ຫຼືເລີ່ມມີອາການນ້ຳຢູ່ງວເປັນພິດຈິງຄວນໃຊ້ທີ່ແຫຍ່. ຖ້າອາການຍັງບໍ່ເປັນໜັກເຖິງຂັ້ນນີ້ກໍຍັງບໍ່ຄວນໃຊ້ທີ່ແຫຍ່ເທື່ອ.



ອາການນ້ຳຢູ່ງວເປັນພິດ:

- ລົມຫາຍໃຈມີກິ່ນນ້ຳຢູ່ງວ.
- ໃບໜ້າ ແລະ ຕີນໄຄ່ບວມ.
- ຮາກ, ກະວົນກະວາຍ ແລະ ສັບສົນກ້ວງວິນໃຈ.


ໝາຍເຫດ: ຄົນເຈັບມີອາການຢູ່ງວບໍ່ອອກຕ່ອມຜະລິດນ້ຳເຊື້ອເພດຊາຍໃຫຍ່ ຫຼື ເປັນໜົວໝາກໄຂ່ຫຼັງຄວນຊື່ທີ່ແຫຍ່ ແລະ ເກັບໄວ້ໃກ້ມືເພື່ອໃຊ້ໃນໂອກາດອື່ນຈຳເປັນ.



HLLI Seattle Health Leadership International Field Draft Copy

ວິທີແຍ້ງຍ່າງ

1. ຕົ້ມທໍ່ແຍ່ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ ໃນການແຍ່ເປັນ ເວລາ 15 ນາທີ.



2. ລ້າງອະໄວຍະວະເພດ ແລະ ບໍລິເວນໃກ້ໆໃຫ້ສະອາດດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ ແລະ ສະບູ.




3. ລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ໃຫ້ສະອາດ. ຫຼັງຈາກ ລ້າງມືແລ້ວຈັບແຕ່ສິ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຫຼໍ້ຄວາມ ສະອາດເທົ່ານັ້ນ.




4. ບົກບໍລິເວນຮອບໜອກອະໄວຍະວະເພດ ດ້ວຍຜັງທີ່ສະອາດເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຂ້າ ເຊື້ອແລ້ວ.




5. ໃສ່ຖົງມືແພດທີ່ສະອາດ ຫຼື ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດ້ວຍເຫຼົ້າ 90 ຫຼື ສະບູທີ່ໃຊ້ສໍາລັບແພດກໍໄດ້.



6. ເຮັດໃຫ້ທໍ່ແຍ່ມີນ ດ້ວຍຂີ້ເຜີ້ງຕ້ານເຊື້ອຫຼື ຢາເຮັດໃຫ້ມີນ.



7. ເປີດໜັງຫຸ້ມອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ຫຼື ຂະຫຍາຍປາກ ອະໄວຍະວະເພດຍິງເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການແຍ່ທໍ່.



8. ຈັບອະໄວຍະວະເພດຊາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໃຊ້ມືຍະຮິມໃຫຍ່, ຮີມນ້ອຍອອກ ແລ້ວແຍ່ທໍ່ເຂົ້າໄປໃນຮູຍ່າງ, ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.



ຈັບອະໄວຍະວະເພດຊາຍຂຶ້ນດັ່ງຮູບນີ້

9. ແຍ່ທໍ່ເຂົ້າໄປຈົນ ກວ່າຢູ່ວເລີ່ມ ໄຫຼອອກມາ, ຫຼັງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ແຍ່ເຂົ້າ ຕື່ມ 3 ຊມ ຫຼື ຫຼາຍ ກວ່ານັ້ນ.



ໝາຍເຫດ: ທໍ່ຍ່າງຂອງແມ່ຍິງແມ່ນສັ້ນ ກວ່າທໍ່ຍ່າງຂອງຜູ້ຊາຍ.

ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ: ຖ້າຄົນເຈັບມີອາການນໍ້າຍ່າງເປັນພິດ ຢາໃຫ້ ນໍ້າຍ່າງອອກມາທັງໝົດໃນເທື່ອດຽວ. ແຕ່ຄວນຈະຄ່ອຍໆ ໃຫ້ອອກມາເທື່ອລະໜ້ອຍໆໃນໄລຍະເວລາ 1 ຫຼື 2 ຊົ່ວໂມງ.

ໃນແມ່ຍິງບາງເທື່ອນໍ້າຍ່າງບໍ່ອອກຫຼັງຈາກເກີດລູກ. ຖ້າວ່າເວລາຜ່ານໄປ 6 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນຍັງບໍ່ອອກ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າພິກຍ່າງເຕັມແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ທໍ່ແຍ່. ຖ້າວ່າແມ່ຍິງຄົນນັ້ນບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າ ພິກຍ່າງເຕັມ, ມັນບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະແຍ່ທໍ່ເຮົາພຽງແຕ່ໃຫ້ລາວຕື່ມນໍ້າຫຼາຍໆເທົ່ານັ້ນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນການແຍ່ທໍ່ແມ່ນສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ບົມ Disabled Village Children, ຢູ່ບົດທີ່ 25.

ບັນຫາຂອງຜູ້ຍິງ

ລະດູຂາວ ແລະ ສີອື່ນໆ (ສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືມູກ ຫຼື ໜອງທີ່ອອກມາຈາກຊ່ອງຄອດ)

ຜູ້ຍິງເກືອບທຸກໆຄົນມີລະດູຂາວເລັກໜ້ອຍອອກມາທາງຊ່ອງຄອດ ເຊິ່ງມີລັກສະນະໃສ່ງຄ້າຍຄືນໍ້າມັນ ຫຼື ມີສີເຫຼືອງເລັກໜ້ອຍ. ຖ້າບໍ່ມີກິ່ນ ຫຼື ບໍ່ມີອາການຄັນ ກໍສະແດງວ່າອາດບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງຜິດປົກກະຕິ.

ແຕ່ວ່າຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນ ໂດຍສະເພາະເວລາຖືພາຕ້ອງທໍລະມານກັບເປັນລະດູຂາວ ແລະ ອາການຄັນບໍ່ລິເວນຊ່ອງຄອດ ເຊິ່ງເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆສ່ວນໃຫຍ່ກໍເປັນການລົບກວນຊຶ່ງແຕ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ແຕ່ວ່າລົງຂາວທີ່ເກີດຈາກໂລກໜອງໃນແທ້ ຫຼື ໜອງໃນທຽມສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກທີ່ເກີດມາໄດ້.

1. ລະດູຂາວທີ່ມີລັກສະນະເປັນຟອງແຫຼວໆ ສີຂຽວໆ ບົນເຫຼືອງ ຫຼື ສີຂາວມີກິ່ນເໝັນ ແລະ ມີອາການຄັນນັ້ນ ອາດຈະເປັນຜົນເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອຈາກໂລກຊ່ອງຄອດອັກເສບ. ມັນເຮັດໃຫ້ແສບເວລາຖ່າຍເປົາ (ຍິງວ) ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະເພດເຈັບປວດ ແລະ ໄຄ່ບວມ.

ການປິ່ນປົວ:

- ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຮັກສາໃຫ້ອະໄວຍະວະເພດສະອາດ ຢູ່ສະເໝີ.
- ລ້າງຊ່ອງຄອດ ຫຼື ໃຊ້ທີ່ແຍ່ລ້າງຊ່ອງຄອດດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ ປະສົມນໍ້າສົ້ມຂາວ. ຖ້າບໍ່ມີນໍ້າສົ້ມຂາວໃຫ້ໃຊ້ນໍ້າໝາກນາວໂດຍ.

ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ: ໃຫ້ນໍ້າທີ່ໃຊ້ລ້າງຊ່ອງຄອດໄຫຼເຂົ້າຊ່ອງຄອດຊ້າໆໃນເວລາ 3 ນາທີ. ບໍ່ໃຫ້ໃສ່ທີ່ແຍ່ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດເກີນ 3 ນິ້ວ.

ບົບໃສ່ນໍ້າແທນກໍໄດ້.
ໃຊ້ນໍ້າສົ້ມຂາວ 6
ປວງກາແຟ ຕໍ່ນໍ້າ
ສະອາດ 1 ລິດ.



ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ບໍ່ໃຫ້ລ້າງຊ່ອງຄອດໃນໄລຍະ 4 ອາທິດທີ່ໄກ້ຈະເກີດລູກ ຫຼື 6 ອາທິດຫຼັງຈາກເກີດລູກ. ຖ້າວ່າການລ້າງລະດູຂາວລົບກວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຍັດໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ (ໃຫ້ເບິ່ງ#2ໃນໜ້າຕໍ່ໄປ).

- ພວກເຈົ້າສາມາດໃຊ້ກະທຽມຍັດໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດ. (ປອກເປືອກກະທຽມອອກຄວນລະມັດລະວັງ ບໍ່ໃຫ້ມັນແຕກ. ຫໍ່ດ້ວຍຜ້າບາງໆທີ່ສະອາດ ແລະ ຍັດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດ).
- ລ້າງຊ່ອງຄອດໃຫ້ສະອາດມື້ລະສອງເທື່ອ ແລະ ໃນແຕ່ລະຄືນແມ່ນໃຫ້ເອົາກະທຽມໃໝ່ໜຶ່ງກີບ ຍັດໃສ່ຊ່ອງຄອດແທນກະທຽມກີບເກົ່າເຮັດແນວນີ້ເປັນເວລາ 10 ຫາ 14 ມື້.
- ຖ້າວ່າວິທີທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ຢາຍັດທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງຢາ ເມໂທໂນດາໂຊນ ຫຼື ຢາຊະນິດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງແພດ ຫຼື ໃຫ້ກິນຢາເມໂທໂນດາໂຊນ. ສໍາລັບຂໍ້ຄວນລະວັງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຕ່າງໆຢູ່ໜ້າທີ່ 370.

ຂໍ້ສໍາຄັນ: ຜົວຂອງຜູ້ຍິງທີ່ຕິດເຊື້ອໃນລະບົບສືບພັນອາດຈະຕິດເຊື້ອໂລກນໍາເຖິງວ່າຈະບໍ່ຮູ້ສຶກແນວໃດກໍຕາມ. (ຜູ້ຊາຍບາງຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໃນລະບົບໃບພັນຈະຮູ້ສຶກເຈັບແສບຮ້ອນໆໃນເວລາຍິງວ) ຖ້າຜູ້ຍິງຕິດເຊື້ອມີຄືນຕື່ມອີກຫຼັງຈາກປິ່ນປົວແລ້ວທັງຜົວ ແລະ ເມຍຄວນກິນຢາເມໂທໂນດາໂຊນສະເພາະແຕ່ໃນກໍລະນີມີອາການຕິດເຊື້ອຢ່າງຮ້າຍແຮງເທົ່ານັ້ນ.

HealthSeal Partnership International
Field Test Copy

2. ລະດູຂາວທີ່ມີລັກສະນະເປັນເຫຼືອງໆແຕ່ຂາວຊັ້ນໆແດ່ ແລະ ມີກິ່ນຄືເຊື້ອເຫັດ, ຂອງຕົກໂພະ ຫຼື ກິ່ນເຂົ້າຈີ່ເກົ່າ.ອາດເກີດຈາກເຊື້ອເຫັດອາດມີອາການຄັນຫຼາຍ. ຢູ່ບໍລິເວນປາກຊ່ອງຄອດຈະເປັນສີແດງ ຊຳໆ ແລະ ເຈັບປວດ. ໃນເວລາຖ່າຍເປົາຈະເຈັບແສບຫຼາຍ. ໂລກດັງກວ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນສະເໝີກັບຜູ້ຍິງມີທ້ອງ, ຜູ້ກຳລັງເຈັບປ່ວຍເປັນເປົາຫວານ (ເບິ່ງໜ້າ 127), ຜູ້ເປັນໂລກເອດສຫຼືຜູ້ທີ່ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຫຼືໃຊ້ຢາຄຸມກຳ ເນີດ.

ການປິ່ນປົວ: ລ້າງຊ່ອງຄອດດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ນ້ຳສົ້ມ (ເບິ່ງໜ້າ 241) ຫຼື ຢາທາສີອິດ (ເຈນທຽນໄວໂອເລດ / Gentian violet) ໃນອັດຕາສ່ວນຄື: ຢາເຈນທຽນໄວໂອເລດ 2 ສ່ວນຕໍ່ນ້ຳ 100 ສ່ວນ (2 ບວງກາເຟ ຕໍ່ນ້ຳເຄິ່ງລິດ). ຫຼືໃຊ້ຢາຍັດຊ່ອງຄອດທຳລາຍເຊື້ອເຫັດສຳລັບການໃຊ້ ແລະ ຄຳແນະນຳສາມາດ ເບິ່ງໄດ້ໃນໜ້າ 370. ໃຊ້ນົມສົ້ມຂະນິດບໍ່ຫວານຢັດໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດແມ່ນແບບແຜນຢາ ປະຈຳບ້ານທີ່ສາມາດຄວບຄຸມເຊື້ອເຫັດ. ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໃນການຮັກສາການຕິດເຊື້ອເພາະວ່າ ພວກມັນເຮັດໃຫ້ຮຸນແຮງກວ່າເກົ່າ.


3. ລະດູຂາວທີ່ມີລັກສະນະຊັ້ນໆຄືນ້ຳນົມມີກິ່ນອັບໆອາດຈະມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອແບັກທີເລຍ. ສິ່ງທີ່ຈຳ ເປັນທີ່ສຸດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບເປັນພິເສດເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຄັກແນ່ວ່າບໍ່ແມ່ນການຕິດເຊື້ອມິດລູກອັກເສບ. ຄວນລ້າງດ້ວຍນ້ຳປະສົມນ້ຳສົ້ມ (ເບິ່ງໜ້າ 241) ຫຼື ຢາທີ່ມີສ່ວນໃນປະສົມໂປວິດັນ-ອີໂອດິນ (ເບຕາດິນ: 6 ບວງກາເຟຕໍ່ນ້ຳ 1 ລິດ). ໃຊ້ກະທຽມຢັດໃສ່ໃນຊ່ອງຄອດທຸກໆຄືນເປັນເວລາ 2 ອາທິດ (ເບິ່ງໜ້າ 241. ຖ້າຢາ ເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້ແມ່ນຄວນລອງຢາເມໂທນິດາໂສນ (ເບິ່ງໜ້າ 368).

4. ລະດູຂາວແຫຼວຄືນ້ຳມັນສີນ້ຳຕານ ຫຼື ສີໝັ້ນອາດຈະມີເລືອດບົນຢູ່ ແລະ ມີກິ່ນເໝັນຫຼາຍໆນັ້ນເປັນ ລັກສະນະຂອງອາການທີ່ຕິດເຊື້ອຮ້າຍແຮງອາດຈະເປັນມະເຮັງ (ໜ້າ 280). ຖ້າມີອາການໄຂ້ນ້ຳຈຶ່ງໃຊ້ ຢາຕ້ານເຊື້ອ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ໃຊ້ຢາແອມພິຊີລິນຄວມຄູ່ກັບຢາເຕຕາຊີລິນບິ່ງໜ້າ 352 ແລະ ໜ້າ 355). ຄວນໄປຫາແພດໂດຍໄວທີ່ສຸດ.

ຂໍ້ສຳຄັນ: ຖ້າອາການເປັນຊຳເຮື້ອ (ເປັນດົນບໍ່ເຊົາ) ແລະ ບໍ່ມີອາການດີຂຶ້ນເລີຍຫຼັງການປິ່ນປົວແລ້ວຄວນ ໄປຫາແພດ.

ວິທີຜູ້ຍິງຈະຫຼີກເວັ້ນຈາກການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ:

1. ຮັກສາບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ. ໃນເວລາອາບນ້ຳຄວນລ້າງເປັນຢ່າງດີດ້ວຍສະບູ ອ່ອນ.
2. ຫຼັງຈາກການຮ່ວມເພດແລ້ວຄວນຖ່າຍເປົາເພື່ອປ້ອງການການຕິດເຊື້ອ (ແຕ່ບໍ່ອາດປ້ອງກັນການມີທ້ອງໄດ້).
3. ຫຼັງຈາກການຖ່າຍໜັກແຕ່ລະຄັ້ງຄວນອານະໄມເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເຊັດກິ່ນຈາກທາງໜ້າໄປທາງຫຼັງ ສະເໝີ.




ການເຮັດອານາໄມຈາກທາງຫຼັງໄປທາງໜ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ, ຕົວອະມີບາ ແລະ ແມ່ທ້ອງຕ່າງໆເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດ. ແມ່ນແຕ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງກໍຄວນໄດ້ຮັບການລ້າງຈາກດ້ານໜ້າໄປຫຼັງ ແລະ ສອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວິທີການເຮັດອານາໄມຕາມວິທີນີ້ດ້ວຍຕົນເອງສະເໝີ.

Field Staff Copy
Health Leadership International

ອາການເຈັບປວດ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍທ້ອງນ້ອຍຂອງຜູ້ຍິງ

ອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍອາດມາຈາກຫຼາຍສາເຫດທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ ໃນບົ້ມຫົວນີ້. ຈາກລາຍການຂ້າງລຸ່ມນີ້ຈະເປັນ ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄົ້ນຄ້ວາຫາສາເຫດໄດ້. ການ ເຈັບທ້ອງນ້ອຍອາດມີສາເຫດມາຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້:



1. ການເຈັບປະຈຳເດືອນ (ໜ້າ 246) ເຊິ່ງເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ໄລຍະກ່ອນມີປະຈຳເດືອນ ຫຼື ລະຫວ່າງມີປະຈຳເດືອນ?
2. ພິກຍຸ່ງວອ້ກເສບ (ໜ້າ 234) ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບ ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍທີ່ມັກພົບເລື້ອຍໆ, ທ່ານຖ່າຍເບົາ ເລື້ອຍໆ ແລະ ເຈັບຫຼາຍບໍ່?

ການອັກເສບຜັງທ້ອງນ້ອຍ. ເຊິ່ງແມ່ນອາການເກືອບຂັ້ນສຸດ ທ້າຍຂອງການເປັນໂລກໜອງໃນແທ້ ຫຼື ໂລກໜອງໃນທຽມ (ໜ້າ 236) ແມ່ນມີອາການເຈັບປວດທ້ອງນ້ອຍ ແລະເປັນໄຂ້. ມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກເກີດລູກ, ເອົາລູກອອກ, ລູລູກ, ຫຼື ການໃສ່ທ່ວງ. ການປິ່ນປົວໂລກໜອງໃນ ໂດຍການໃຫ້ຢາ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໃນໜ້າ 360 ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຈົນກວ່າຈະຫາຍໄຂ້ພາຍໃນສອງມື້. ນອກຈາກນັ້ນຄວນໃຫ້ຢາດ່ອກຊີຊີລິນ ຫຼືຢາເຕຫຼາຊີລິນ (ໜ້າ 355) ຫຼື ອີລີໂທໄມຊິນ (ໜ້າ 354) ເປັນເວລາ 14 ມື້. ຖ້າມີ ອາການຮຸນແຮງແມ່ນຄວນໃຫ້ຢາເມໂທນິດາໂຊນ 500 ມກ 3 ເທື່ອຕໍ່ມື້ເປັນເວລາ 14 ມື້. ຖ້າແມ່ຍິງຜູ້ໃດໃສ່ທ່ວງແມ່ນໃຫ້ເອົາ ອອກ. ຄວນຟ້າວໄປພົບແພດ.
3. ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຄ້ອງກັບພະຍາດທ້ອງນ້ອຍອັກເສບ: ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ກ່າວມາຢ່າງຫຍໍ້ຢູ່ໜ້າ 280 ແລະ ອາດເປັນໂລກຖຽນນໍ້າໃນຮັງໄຂ ແລະ ໂລກມະເຮັງໄດ້. ການ ກວດພະຍາດ ໂດຍສະເພາະທີ່ເຮັດໂດຍພະນັກງານສາທາລະນະ ສຸກ ແມ່ນຈຳເປັນຫຼາຍເພາະຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຂົາ ເປັນ ຫຍັງກັນແທ້.
4. ມີລູກນອກພິກ (ຕົວອ່ອນມີການພັດທະນະການຢູ່ນອກມົດລູກ ໜ້າ 280). ຕາມທຳມະດາແລ້ວແມ່ນມີອາການເຈັບຮຸນແຮງກັບການມີເລືອດອອກຜິດປົກກະຕິ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຍິງທີ່ຫາກໍ່ມີທ້ອງອ່ອນໆ (ເບິ່ງໜ້າທີ່ 247) ແລະພວກເຂົາມີອາການວິນຫົວ ແລະ ອ່ອຍເພຍຫຼາຍ. ຟ້າວໄປຫາແພດ ໂດຍດ່ວນເພາະວ່າຊີວິດຂອງແມ່ມານແມ່ນຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ.
5. ພະຍາດແຊກຊ້ອນຫຼັງຈາກການລູລູກ (ໜ້າ 414). ຈະມີອາການເປັນໄຂ້, ເລືອດອອກເປັນກ້ອນໆຈາກຊ່ອງຄອດ, ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ, ຖ່າຍເບົາຍາກ, ແລະ ຊຶອກ. ເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ຢາ ຕ້ານເຊື້ອຄືກັບການເປັນໄຂ້ໃນເວລາເກີດລູກ (ໜ້າ 276), ແລະ ຟ້າວພາຄົນເຈັບໄປໂຮງໝໍທັນທີທັນ ໃດເພາະຊີວິດຂອງລາວແມ່ນຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ.
6. ບັນຫາການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ບັນຫາອື່ນຂອງລຳໂສ້ ຫຼື ຮູທະວານ (ໜ້າ 145) ອາການເຈັບຂຶ້ນຢູ່ກັບເວລາ ກິນອາຫານຫຼືຖ່າຍໜັກບໍ່?

ບັນຫາທີ່ໄດ້ເວົ້າມາຂ້າງເທິງນັ້ນບາງຢ່າງບໍ່ຮ້າຍແຮງປານໃດ. ບາງຢ່າງກໍ່ເປັນອັນຕະລາຍເຊິ່ງບໍ່ສາມາດ ຈຳແນກອອກໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງແທ້ ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດ ຫຼື ວິໄຈພິເສດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ອາການເຈັບປວດແມ່ນມີສາເຫດຈາກອັນໃດ ຫຼື ຖ້າອາການບໍ່ດີຂຶ້ນຄວນໄປພົບແພດ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ ເຕີມກ່ຽວກັບການຮັກສາບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເພດຍິງແມ່ນສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ຢູ່ບົ້ມແມ່ຍິງຢູ່ທ່າງ ໂກແພດ.

HLLI Seattle
Health Leads
Field Draft Copy International

ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້ (ເປັນໝັນ)


ບາງເທື່ອຜົວເມຍພະຍາຍາມຢາກມີລູກແຕ່ຜູ້ຍິງພັດບໍ່ຖືພາຈັກເທື່ອສະແດງວ່າອາດແມ່ນຜົວຫຼືເມຍເປັນໝັນ ເຊິ່ງມັກຈະປົນປົວໄດ້ຍາກ, ແຕ່ວ່າບາງເທື່ອກໍອາດຈະຊ່ວຍໄດ້ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີຂຶ້ນກັບສາເຫດຂອງມັນ.

ສາເຫດທົ່ວໆໄປຂອງການເປັນໝັນ:

1. ເປັນໝັນເອງ: ຕາມທຳມະຊາດເພາະຮ່າງກາຍຂອງຄົນບາງຄົນນັ້ນບໍ່ອາດມີລູກໄດ້ໂດຍກຳເນີດ.
2. ຮ່າງກາຍອ່ອນແອຫຼືຂາດສານອາຫານ: ໂລກເລືອດຈາງ, ອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ, ຂາດທາດໄອໂອດີນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂອກາດການມີລູກຫຼຸດລົງຫຼືອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ລູກໃນທ້ອງຕາຍຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ. ບາງເທື່ອຜູ້ເປັນແມ່ຈະບໍ່ຮູ້ເມື່ອວ່າຕົນເອງຖືພາຊ້າ (ເບິ່ງການຫລຸກໜ້າ 281). ຜູ້ຍິງບາງຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດມີລູກ ຫຼື ມີການລູກເລື້ອຍໆຄວນກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ພຽງພໍ. ຖ້າເລືອດຈາງຫຼາຍຄວນກິນຢາທາດເຫຼັກຊະນິດກ້ອນອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດມີລູກ ແລະ ມີລູກທີ່ສົມບູນໄດ້.
3. ໂລກຂ້າເຮື້ອ: ໂດຍສະເພາະໂລກທ້ອງນ້ອຍອັກເສບເຊັ່ນໂລກໜອງໃນແທ້ ແລະ ໜອງໃນທຽມ (ໜ້າ243) ອາດຈະເປັນສາເຫດຂອງການເປັນໝັນໄດ້. ຖ້າເຊື້ອໂລກບໍ່ຄຸກຄາມໄປຫຼາຍອາດຈະປົນປົວໃຫ້ເຂົາໄດ້. ການປ້ອງກັນ ແລະ ປົນປົວແຕ່ຫົວທີ່ຈະປ້ອງກັນຜູ້ຍິງຈາກການເປັນໝັນໄດ້.
4. ຜູ້ຊາຍບາງຄົນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເມຍມີລູກໄດ້ເພາະມີຈຳນວນຕົວອະສຸຈິໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ. ການຍຸດເຂົາຮ່ວມເພດຈັກໄລຍະໜຶ່ງໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນໃນໄລຍະກ່ອນທີ່ຜູ້ຍິງຈະເລີ້ມມີໄຂ່ສຸກໃນແຕ່ລະເດືອນເຊິ່ງເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາລະຫວ່າງຮອບປະຈຳເດືອນນີ້ກັບຮອບປະຈຳເດືອນໜ້າ. (ເບິ່ງວິທີນີ້ບໍ່ມີ ແລະ ວິທີກວດນຳເມືອກໜ້າ 291 ແລະ 292) ເພື່ອຮ່ວມເພດກັນໃນໄລຍະນີ້ທີ່ເມຍມີໂອກາດມີລູກໄດ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜົວມີຈຳນວນຕົວອະສຸຈິຫຼາຍພຽງພໍເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີລູກໄດ້.

ຄຳເຕືອນ: ຢາຮໍໂມນ ແລະ ຢາອື່ນໆທີ່ໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ແມ່ຍິງໃຊ້ນັ້ນມັກຈະບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີລູກໄດ້ໂດຍສະເພາະຜູ້ຊາຍ. ການປົນປົວແບບໝັນເມື່ອງກໍຄືຈະຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນສະນັ້ນຈິ່ງບໍ່ຄວນຈະເສຍເງິນຄ່າໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້.

ສຳລັບຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້ແມ່ນຍັງມີຫຼາຍວິທີທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນເດັກນ້ອຍ ແລະ ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກໄດ້:



- ພວກເຈົ້າອາດຈະຫາລູກລ້ຽງມາລ້ຽງ (ໂດຍເອົາເດັກນ້ອຍກາພາ ຫຼື ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີພໍ່ກອາໄສ). ຫຼາຍຄູ່ຜົວເມຍຮັກລູກລ້ຽງຄືກັບລູກຄົງຂອງຕົນ.
- ພວກເຈົ້າອາດຈະສະໝັກເປັນພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າເອງໂດຍວິທີການອື່ນໆ. ເພາະຄວາມຮັກທີ່ເຈົ້າຈະໃຫ້ລູກຂອງເຈົ້າສາມາດໃຫ້ກັບສິ່ງຕ່າງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແລະ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດທັງສິ້ນ.
- ພວກເຈົ້າອາດຈະຊ່ວຍໝູ່ບ້ານບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນສ່ວນຫຼາຍເຫັນວ່າເລື່ອງທີ່ຜູ້ຍິງບໍ່ສາມາດມີລູກເປັນເລື່ອງອັບອາຍຂາຍໜ້າ. ບາງທີ່ເຈົ້າສາມາດຮ່ວມກຸ່ມ ກັນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນໆ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຂົາ ເຈົ້າເຫັນວ່າການມີລູກນັ້ນບໍ່ແມ່ນເປັນສິ່ງດຽວທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງມີຄຸນຄ່າ (ສາມາດເຮັດແນວອື່ນໆໄດ້ນຳ).

HLLI Seal of Leadership International
Health Leadership International
Field Draft Copy