



ဖျားနာခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း၊ နို့တိုက်ကျွေးခြင်း၊ ခရီးရှည် သွားလာခြင်း၊ အလုပ်များခြင်း (သို့) အစားအသောက်ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် လစဉ်ရာသီသွေးဆင်းခြင်းမှာတချိန်နှင့်တချိန်မတူဘဲပြောင်းလဲတတ်သည်။ သို့ သော်လစဉ်ရာသီသွေးပေါ်ရာ၌ရုတ်တစ်ရက်ပြောင်းလဲမှုရှိခြင်း၊ လပေါင်းများ စွာကြာရှိခြင်း၊ (သို့) အခြားပြဿနာများနှင့် အတူတွဲဖြစ်ခြင်းသည်ပိုမိုဆိုးရွား သောပြဿနာ၏လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။

➤လစဉ်ရာသီသွေးဆင်းရာ၌ ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုရှိ လျှင်သားဆက်ခြားနည်း သုံးထားသော်လည်းကိုယ် ဝန်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ် နိုင်ကြောင်းကိုအမြဲတစေ စဉ်းစားသင့်သည်။

အန္တရာယ်ရှိသောလက္ခဏာများ။

အမျိုးသမီးတယောက်သည်အောက်ဖော်ပြပါအန္တရာယ်လက္ခဏာများ ရှိလျှင်ဆေးကုသမှုခံယူရန်ချက်ချင်းလိုအပ်သည်။

- ပုံမှန်ရာသီသွေးမဆင်းဘဲလကျော်ပြီးမှ သွေးပြန်ပေါ်ပြီးပိုက်နာကျင်ခြင်း။
- ကိုယ်ဝန်ရင့်လာသည့်ချိန်မှာသွေးဆင်းခြင်း။
- ကလေးမွေးပြီး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီးနောက်သွေးအလွန်အကျွံဆင်းခြင်း။

လစဉ်ရာသီသွေးဆင်းချိန်တွင်ဖြစ်နိုင်သောပြဿနာများ။

(၁) လစဉ်ရာသီသွေးအဆင်းများခြင်း (သို့) အချိန်ကြာမြင့်စွာ သွေးဆင်းခြင်း။

- အချိန်တစ်နာရီအတွင်းတွင်ရာသီခံ (သို့) အဝတ်စသည်စိုရွဲသွားလျှင် ရာသီသွေးအဆင်းများသည်ဟုဆိုသည်။
- (၈)ရက်ထက်ပို၍ကြာမြင့်လျှင်ရာသီသွေးဆင်းခြင်းမှာကြာမြင့်သည် ဟုဆိုသည်။
- သွေးခဲများ (သွေးထဲတွင်အသည်းနှင့်ဆင်တူသည်ပျော့ပြီးနီညိုရောင် အတုံးအခဲများ) ပါလျှင်ရာသီသွေးအဆင်းများခြင်း၏လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။
- ရက်သတ္တပတ်များစွာ၊ လပေါင်းများစွာ (သို့) နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ အောင်သွေးအဆင်းများလျှင်သွေးအားနည်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။

ဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရင်းများ။

- ဟော်မုန်းခါတ်များမညီမျှသောကြောင့် သားဥအိမ်သည်သားဥမထုတ်လွတ်သော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသက် ၂၀အောက်နှင့် အသက် ၄၀ အထက်အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များသည်။
- သားအိမ်တွင်းထည့် သနွေ တားကိရိယာ (IUD) သည်လစဉ်ရာသီ သွေးပို၍အဆင်းများ ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
- သင့်ကိုယ်သင်ကိုယ် ဝန်မရှိထင်ထားသည့် တိုင်အောင်ကိုယ်ဝန်ပျက် ကျခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
- သွေးဆင်းခြင်းနှင့်အ တူဝမ်းဗိုက်တွင်နာကျင် မှုရှိလျှင်သားအိမ်အပြင် ဘက်သားဥပြွန်တွင်ကိုယ်ဝန်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင် သည်။ ဆေးရုံသို့ချက်ချင်းသွားပါ။
- (Thyroid gland) တွင်ပြဿနာရှိသောကြောင့်ဖြစ် နိုင်သည်။
- သားအိမ်တွင်အလုံးအကျိတ်များ (သို့) ကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။



အရေးကြီးသောမှတ်ချက်။

အကယ်၍သင့်မှာသွေးဆင်းများပြီးအောက်ပါလက္ခဏာတစ်ခုခုရှိပါက ဆီးခုံတွင်းစမ်းသပ်ရန်လေ့ကျင့်ထားသောကျန်းမာရေးလုပ်သားနှင့်ပြသပါ။

- မွေးလမ်းကြောင်းမှသွေးဒလဟောထွက်ခြင်း။
- ၃လကြာရာသီသွေးဆင်းများခြင်း။
- ကိုယ်ဝန်ရှိသည်ဟုယူဆခြင်း။
- သွေးဆင်းပြီးအလွန်အမင်းနာကျင်ခြင်း။

(၂) လစဉ်ရာသီသွေးအဆင်းနည်းခြင်း။

လစဉ်ရာသီသွေးအဆင်းနည်းခြင်းသည်ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။

ဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းများ။

- အချို့သောသားဆက်ခြားနည်းများ (ဥပမာ - ဆေးထိုးခြင်း၊ ဆေးသောက်ခြင်း) ကိုအချိန်အတန်ကြာအောင်သုံးပါကရာသီသွေးအဆင်းနည်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
- သားဥအိမ်မှသားဥမထုတ်လွှတ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။


(၃) သွေးမကြာခဏဆင်းခြင်း (သို့) အချိန်မမှန်သွေးဆင်းခြင်း။

ရာသီသွေးဆင်းခြင်းသည် ၃ ပါတ်တကြိမ်ထက်ပို၍ဆင်းခြင်း (သို့) ပုံမှန်မဟုတ်လာလိုက်၊ ပျောက်လိုက်ဖြစ်ခြင်းသည်သာမန်ဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါ။


ဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းများ။

- သားဥအိမ်သည်သားဥမထုတ်လွှတ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
- အထူးသဖြင့်ပုံမှန်မလာဘဲရာသီသွေးဆင်းများပါကသားအိမ်ထဲတွင် အလုံး(သို့)ကင်ဆာရှိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။

- မီးယပ်ဆုံးပြီးနောက် (estrogen) ပါသောဆေးများသောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။




- အချို့သောသားဆက်ခြားနည်းလမ်းများ (သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေး၊ အရေပြားအောက်စိုက်ဆေးများ) သည်ရာသီသွေးမကြာခဏဆင်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။



➤ ဟော်မုန်းသုံးသားဆက်ခြားနည်းများ (သန္ဓေတားဆေးလုံး၊ ထိုးဆေး၊ အရေပြားအောက်စိုက်ဆေး) သည်ရာသီသွေးဆင်းပုံကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။

➤ အကယ်၍ အသက် (၁၈) နှစ်အထက်ဖြစ်ပြီး ရာသီသွေး တခါမှပေါ်လျှင်ဆေးကုသမှု ခံယူပါ။



➤ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် အသက်အရွယ်ကြီးလာသည် နှင့်အမျှ ရာသီသွေးဆင်းခြင်း မှာလည်း ပြောင်းလဲလာသည်။








(၄) ရာသီသွေးအဆင်းကွာခြားလွန်းခြင်း (သို့) ရပ်သွားခြင်း။

ရာသီသွေးဆင်းခြင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၁ ရက်မှ ၃၅ ရက်အတွင်း တစ်ကြိမ်ဆင်းလေ့ရှိပါသည်။ ရာသီသွေးဆင်းရာတွင် တစ်ခါနှင့်တစ်ခါ အချိန်ကွာခြားခြင်းမှာ ပုံမှန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ (သို့သော် အကယ်၍ ရာသီလုံးဝမဆင်းတော့လျှင် ရောဂါတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ခြင်း (သို့) ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။)



ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းရင်းများ။

- ကိုယ်ဝန်ရှိနေခြင်း။
- ကိုယ်ဝန်ရှိပြီး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျနေခြင်း။
- သားဥအိမ်မှ သားဥမထုတ်လွတ်ခြင်း။
- စိုးရိမ်ဖွယ်နာမကျန်းဖြစ်ခြင်း။ (ဥပမာ - ငှက်ဖျား၊ တီဘီရောဂါ (သို့) AIDS)
- အသက် ၄၀ (သို့) ၄၅ နှစ်ကျော်လာလျှင် သွေးဆုံးရန်နီးလာခြင်း။
- အချို့သော သားဆက်ခြားနည်းများ။ (ဥပမာ - ပဋိသန္ဓေတားသောက်ဆေး၊ ထိုးဆေး၊ စိုက်ဆေး) သည် ရာသီသွေးဆင်းချိန်ကို ကွာခြားစေပါသည်။

အခြားသွေးဆင်းခြင်းပြဿနာအမျိုးအစားများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း (သို့) ကလေးမွေးပြီးနောက်သွေး ဆင်းခြင်း

သွေးဆင်းခြင်းပြဿနာ	ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်း	ဆောင်ရွက်ရန်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့်ပထမ ၃ လအတွင်းတောက်လျှောက် နာကျင်နေခြင်း (သို့) နာလိုက် ပျောက်လိုက်ဖြစ်ခြင်း။	<p>သားဥပြွန်အတွင်းသန္ဓေတည်ခြင်း</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • အရေးပေါ်အခြေအနေ။ • ချက်ချင်းဆေးရုံသို့သွားပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့်နောက်ဆုံး ၃လတွင်သွေးဆင်းခြင်း	<ul style="list-style-type: none"> • အချင်းသည် သားအိမ်နံရံမှကွာ ကျလာခြင်း။ • သားအိမ်ထိပ်ဝဋ် အချင်းပိတ်နေခြင်း။ 	<ul style="list-style-type: none"> • အရေးပေါ်အခြေအနေ။ • ချက်ချင်းဆေးရုံသို့သွားပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့်ပထမ (၆)လအတွင်းသွေးဆင်းခြင်း။	<p>ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း။</p>  <p>(အထူးသဖြင့်ကလေး မွေးချိန်မှာနာကျင်သကဲ့ သို့ကြွက်တက်သလိုနာကျင်လျှင်)။</p>	<ul style="list-style-type: none"> • စောင့်ကြည့်ပါ။ • အကယ်၍သွေးဆင်းတာများ လာလျှင်ဆေးရုံသို့သွားပါ။
ကလေးမွေးစဉ် (သို့) မွေးပြီး ခဏ၌သွေးဆင်းတာများခြင်း။	<ul style="list-style-type: none"> • အချင်းအစအနများသားအိမ်ထဲ ကျန်ခဲ့ခြင်း။ • သားအိမ်ညှစ်အား နည်းခြင်း။ 	<ul style="list-style-type: none"> • အရေးပေါ်အခြေအနေ။ • သွေးဆင်းတာများလာလျှင် ဆေးရုံ (သို့) သားဖွားဆရာမသို့ သွားပြပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့်ပထမ ၃ လအတွင်းနာကျင်ခြင်းမရှိဘဲ သွေးအနည်းငယ်ဆင်းခြင်း။ (ပန်းရောင်သွေးဆင်းခြင်း)	<ul style="list-style-type: none"> • ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်း။ • (သို့) ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းအစ၏ လက္ခဏာဖြစ်ခြင်း။ 	ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သွေးဆင်း ခြင်းအကြောင်းဖတ်ပါ။
လစဉ်ရာသီသွေးဆင်းခြင်းမ ဟုတ်ဘဲ သွေးအနည်းငယ် (သွေးစက်နည်းငယ်) ဆင်း ခြင်း။	<ul style="list-style-type: none"> • သန္ဓေသားကသားအိမ်နံရံသို့ကပ် တွယ်ခြင်း။ • ပုံမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ 	ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် ကလေး မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းဖတ်ပါ။


ကိုယ်ဝန်ပျက်ပြီးနောက်သွေးဆင်းခြင်း

သွေးဆင်းခြင်းပြဿနာ	ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်း	ဆောင်ရွက်ရန်
<p>သွေးဆင်းများခြင်း(သို့) ၁၅ ရက်ထက်ပို၍သွေးဆင်းခြင်း (သို့)သွေးဆင်းခြင်းနှင့်အတူ နာကျင်ခြင်း (သို့) အဖျားရှိခြင်း။</p>	<ul style="list-style-type: none"> • အချင်း၊ သန္ဓေသားအစအနများ သားအိမ်ထဲတွင်ကျန်ခဲ့ခြင်း။ • သားအိမ်ထဲပိုးဝင်ခြင်း။ 	<p>ဆေးရုံ(သို့)ဆေးခန်းသို့ ချက်ချင်းသွားပါ။</p>
<p>သာမန်ရာသီလာသကဲ့သို့သွေးဆင်းခြင်း။ သို့သော် ၅ရက် မှ ၁၅ရက်အထိကြာခြင်း။ တဖြည်းဖြည်းနည်းသွားခြင်း။</p>	<p>ပုံမှန်ဖြစ်သည်</p> 	<p>ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီးနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ်များအကြောင်းဖတ်ပါ။</p>

လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်သွေးဆင်းခြင်း

သွေးဆင်းခြင်းပြဿနာ	ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်း	ဆောင်ရွက်ရန်
<p>လိင်ဆက်ဆံစဉ် (သို့) ဆက်ဆံပြီးနောက်သွေးဆင်းခြင်း။</p>	<ul style="list-style-type: none"> • လိင်မှုဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများ။ • ဆီးခုံတွင်းရောင်ယမ်းခြင်း။ (PID) • အတင်းအဓမ္မလိင်ဆက်ဆံခံရခြင်း။ • သားအိမ်ခေါင်း (သို့) သားအိမ်တွင် အကျိတ် (သို့) ကင်ဆာဖြစ်ခြင်း။ 	<ul style="list-style-type: none"> • ဂိုနိုရီးယားနှင့် chlamydia အကြောင်းဖတ်ပါ။ • PID သို့ကြည့်ပါ။ • မုဒိမ်းမှုအခန်းကိုဖတ်ပါ။ • သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနှင့် သားအိမ်ပြဿနာများအကြောင်းဖတ်ပါ။

မီးယပ်ဆုံးပြီးနောက်သွေးဆင်းခြင်း

သွေးဆင်းခြင်းပြဿနာ	ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်း	ဆောင်ရွက်ရန်
<p>သွေးဆုံးပြီး ၁၂လ (သို့) ထိုထက် ပိုကြာပြီးမှသွေးပြန်ဆင်းခြင်း။</p>	<ul style="list-style-type: none"> • သားအိမ်ထဲတွင်အလုံးအကျိတ် (သို့) ကင်ဆာဖြစ်ခြင်း။ • သားအိမ်ခေါင်းတွင်အလုံးအကျိတ် (သို့) ကင်ဆာဖြစ်ခြင်း။ 	<ul style="list-style-type: none"> • ဆီးခုံတွင်းစမ်းသပ်ရန် လေ့ကျင့်ထားသောကျန်းမာရေးလုပ်သားနှင့်ပြပါ။ • Pap Test စစ်ဆေးခြင်း (သို့) သားအိမ်ခြစ်ခြင်းလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည်။