

ہڈیوں کا بخار:

ہڈیوں کا بخار ایک خطرناک بیماری ہے جس میں جوڑوں میں درد اور بخار ہوتا ہے۔ یہ عموماً چھ ہفتے تک رہتی ہے لیکن چھ مہینے بھی ہو سکتی ہے (یا بہت کم اس سے بھی زیادہ) پھر جوڑوں کا درد عموماً ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر دل کو نقصان پہنچا ہو تو وہ مستقل رہتا ہے یا معذوری کی شکل اختیار کر سکتا ہے (چھوٹا چھوٹا سانس لینا)

وجوہات:

ہڈیوں کا بخار عموماً سٹریپٹوکوکس نامی بیکٹریا کی وجہ سے گلے میں زخم ہونے کے بعد ہوتا ہے (ہڈیوں کا بخار اگر جب رد عمل کے طرح ہوتا ہے) زکام کی علامات کے بغیر گلے میں درد اور بخار کے ساتھ اکثر اچانک گلے میں خراش شروع ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں کا بخار ان بچہوں میں زیادہ عام ہوتا ہے جہاں گلے کی خراش کی دوا عام ہو۔ اور ایسی پر بھوم بچہ نہیں جہاں صحت و صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو۔

روک تھام:

اگر بچے میں گلے کی خراش کی علامات ہوں تو اس کو پنسلین دینے سے ہڈیوں کے بخار کو روکا جاسکتا ہے۔ تمام علامات ختم ہونے کے بعد کم از کم تین دنوں تک بچے کو پنسلین دیتے رہیں۔ دیر پاروک تمام کے لئے ضروری ہے کہ حفظان صحت کا خیال رکھتے ہوئے صحت و صفائی پر زیادہ زور دیا جائے۔

مثالی نمونے کی علامات:

- ☆ پانچ سے چھ سال کی عمر کا بچہ
- ☆ گلے میں شدید خراش کے 1-3 ہفتے بعد شروع ہوا۔
- ☆ تیز بخار
- ☆ جوڑوں میں درد، درد اکثر ایک یا ایک سے زیادہ بڑے جوڑوں میں شروع ہوتا ہے (خصوصاً گلاناں اور گتھے) پھر دوسرے جوڑوں میں منتقل ہوتا ہے اکثر گتھوں اور کہلوں میں پر درد جوڑو سوجھ سکتے ہیں اور سرخ اور گرم! ہاتھ ہیں۔
- ☆ چھ ہفتوں سے لے کر تین مہینوں میں بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن دوبارہ گلا خراب ہونے کے بعد یہی بیماری ہو سکتی ہے۔
- ☆ دوسری علامات (ہیشہ موجود نہیں ہوتیں)
- ☆ جلد پر سرخ نیڑھی لکیریں
- ☆ جوڑوں کے اوپر یا ان کے قریب جلد کے نیچے مڑ کے دانے جتنی گھنٹیاں۔
- ☆ گل کے مسائل، اگر آپ بچے کے سینے پر کان رکھیں تو سرگوشی کی آواز سن سکتے ہیں دل دھڑکنے کی عام آواز کی بجائے ایک اور قسم کی آواز سنائی دے گی۔ "اوش" کی آواز کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کے ایک والو کو اس طرح نقصان پہنچا ہے کہ وہ کسٹل طور پر بند نہیں ہوتا۔ انتہائی حالت میں اس کی وجہ سے دل ٹپل ہو سکتا ہے۔
- ☆ صرف چند لوگوں میں ناک سے خون، پیٹ میں درد، سینے میں درد یا مونیٹا کی علامات ہوتی ہیں۔

احتیاط: اکثر بچوں میں عام زکام کے ساتھ گلا خراب ہوتا ہے ایسی حالت میں پنسلین، انٹی بائیوٹک یا ٹیکوں سے اس کا علاج نہیں کرنا چاہئے۔ ایسی حالت میں گلے کی خراش کافی تکلیف دہ اور اچانک شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ تیز بخار ہوتا ہے اور زکام کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔

علاج:

- ☆ اگر آپ کے خیال میں بیچے کو ہڈیوں کا بخار ہے تو جلدی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ابتداء میں علاج سے دل کے نقصان کی روک تھام ہو سکتی ہے (بخار اور جوڑوں میں درد شروع ہونے کے بعد علاج سے بیماری کا دورانیہ کم نہیں ہوتا)
- ☆ دس دنوں تک منہ سے پھسلین دیں۔ یا بیٹزا آئسین پھسلین جی کا ایک ٹیکہ یا دس دنوں تک روزانہ پروکین پھسلین کا ٹیکہ جن بچوں کو پھسلین سے الرجی ہو ان کو ایئر تھراپی دیں
- ☆ خوراک کی مقدار کیلئے پیچھے دیکھیں۔
- ☆ زیادہ مقدار میں اسپرین دیں، اسپرین کھانے کے خوراک کی مقدار اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں صفحہ 134 پر معلوماتی پرچہ دیا گیا ہے۔
- ☆ چند دنوں تک اسپرین کا استعمال جاری رکھیں جب تک ساری علامات ختم نہیں ہو جاتے۔
- ☆ درد اور سوجن کو کم کرنے کے لئے پردرد جوڑوں پر گرم یا ٹھنڈی چیز رکھیں
- ☆ پردرد جوڑوں کی حرکت کی حد درڈشیں روزانہ کریں۔
- ☆ قوت برقرار رکھنے کے لئے بغیر حرکت کی ورزشیں کریں
- ☆ تقریباً چھ ہفتوں تک بچہ چار پائی پر رہے اور مکمل آرام کرے۔ جب ساری علامات ختم ہو جائیں تو وہ اپنے کام رفتہ رفتہ شروع کر سکتا ہے۔

ہڈیوں کے بخار کا علاج :

دوا کا نام	عمر	مقدار	کب لینی چاہئے
پھسلین V یا جی (منہ سے)	3 سال تک	150mg	دس دنوں تک دن میں چار مرتبہ
	3 سال سے زیادہ	250mg	
	(اس میں بڑے بھی شامل ہیں)		
بیٹزا آئسین پھسلین بذریعہ ٹیکہ	تین سال تک،	600,000 یونٹ	
	تین سال سے زیادہ	1200,000 یونٹ	ایک ٹیکہ ہر چوتھے دن میں آدھا
	اس میں بڑے بھی شامل ہیں		
پروکین پھسلین بذریعہ ٹیکہ	تین سال تک	600,000 یونٹ	
	تین سال سے زیادہ اس میں بڑے بھی شامل ہیں	1200,000 یونٹ	دس دنوں تک ہر چوتھے دن میں آدھا لگائیں۔
			جن افراد کو پھسلین سے الرجی ہو
ایئر تھراپی (منہ سے)	تین سال تک	125mg	
	تین سال سے زیادہ	250mg	دس دنوں تک دن میں چار مرتبہ روزانہ
	اس میں بڑے بھی شامل ہیں		

(نوٹ) اگر ممکن ہو تو بچوں کو منہ کے ذریعے دوا دینا ٹیکے سے زیادہ محفوظ ہے۔

دوبارہ حملوں کی روک تھام:

جن افراد کو ایک مرتبہ ہڈیوں کا بخار ہو جائے تو ان کو دوبارہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ایسے افراد کے لئے گلے کے خراش کا علاج جلدی پھسلین کے ساتھ کریں۔ اگر پہلے حملے کے ساتھ دل کے نقصان پہنچے تو دوبارہ حملوں کے ساتھ مزید نقصان کا خطرہ ہے۔ ان افراد کے لئے یہ بہتر ہوگا کہ کم از کم ایک سال تک یا سترہ سال تک پھسلین کی حفاظتی خوراک لیتے

رہیں (جب گلے کی خراش کا خطرہ کم ہو جاتا ہے) جن افراد کے دلوں کو ہڈیوں کے بخار کی وجہ سے پہلے ہی زیادہ نقصان پہنچ چکا ہو تو ان کے لئے دیرپا حفاظتی اقدامات خصوصاً ضروری ہیں۔

حفاظتی خوراک:

- ☆ مہینے میں ایک مرتبہ تیز آئسین پھسلین جی کا 1200,000 یونٹ کا ایک ٹیکہ
- ☆ یادن میں دو مرتبہ سلفا ڈائزن کی 500mg کی ایک گولی
- ☆ یادن میں دو مرتبہ خالی پیٹ پوٹاشیم پھسلین V کی 250mg کی ایک گولی
- ☆ جن بچوں کو پھسلین سے الرجی ہو ان کو دن میں دو مرتبہ ایئر ٹروماکسین کی 250mg کی ایک گولی۔

☆☆☆☆☆