

KIJAN POU NOU ITILIZE PAJ VÈT YO.

Pati sa a bay enfòmasyon sou medikaman ki parèt nan liv la. N ap jwenn enfòmasyon sou tout medikaman yo an jeneral, nan chapit ki rele “Itilizasyon Medikaman nan domèn Sante Fanm” (paj 468). N ap jwenn enfòmasyon espesyal sou chak medikaman apa nan Paj Vèt yo. Lis lan fèt ak non jeneric (non syantifik medikaman yo). Se menm non sa yo ki andedan chapit yo. Lis la se yon lis alfabetik, sa vle di li bati menm jan ak alfabè a:

a, an, b, ch, d, e, è, en, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ò, on, ou, p, r, s t, v, w y, z

Pa egzanp, si n ap chache idwoksizin, n ap jwenn li apre doksisiklin, men anvan metwonidazòl. Pou nou jwenn yon medikaman nan Paj Vèt yo, nou ka itilize:

- lis **pwoblèm yo** ki nan paj 486. N ap jwenn nan lis sa a tout pwoblèm sante ki nan liv la ansanm ak medikaman ki trete yo. Nan menm lis la, n ap wè nan ki paj n ap jwenn enfòmasyon sou chak maladi a. Anvan n kòmanse trete yon maladi ak yon medikaman, fòk nou li enfòmasyon sou maladi a. Pa blyie, medikaman pa vle di lasante! “Medikaman” ki pi bon pou lasante se enfòmasyon sou lasante.
- lis **medikaman yo** ki nan paj 488. Lis yo bay non jeneric medikaman yo ak kèk non kòmèsyal. Si n vle sèvi ak yon medikaman, n ap wè, nan lis lan, paj kote n ap jwenn plis enfòmasyon sou medikaman sa a.

Enfòmasyon sou chak medikaman apa.

Enfòmasyon sa yo kòmanse nan paj 490.

Enfòmasyon sa yo andedan yon tablo ki menm jan ak tablo sa a:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---------------------------|---|--|---|---|---|--|---|-----------------------------------|--|---|--|---------------------------|-------------------------------------|--|
| <p>Non jeneric medikaman yo parèt ak karakte gra</p> <p>Enfèmasyon jeneral sou medikaman yo</p> <p>Rès tablo a bay bon jan enfòmasyon sou kijan w dwe itilize medikaman an ak tout prekosyon.</p> | <p>Non Komèsyal medikaman yo</p> | <p>Imaj sa make Atansyon lè moun ansent oubyen fanm kap bay tete dwe pran swen espesyal. Si fanm ansent oubyen kap bay tete pa k ap pran medikaman sa yo, imaj sa yo bare</p> | <p>Podofilin (Condylox, Podocon-25)</p>  <p>Podofilin se yon likid ki ka seche bouton moun genyen nan pati entim yo.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> Sou ki fòm medikaman an vini  </td><td style="padding: 5px;"> Likid: 10-25 % </td><td style="padding: 5px;"> Avètisman (Atansyon  pa kapon)  </td><td style="padding: 5px;"> Si bouton yo ap fè san, nou pa dwe pase podofilin sou yo. Si n gen gwo iritasyon tou, se pou n sispann pase podofilin. </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè?  </td><td style="padding: 5px;"> Pran yon aplikatè osnon pwent yon moso twal ki pwòp pou n pase likid la. Apre 4 trèd tan, se pou n lave bouton yo ak savon epi n rense yo ak dlo. Nou dwe fè sa 1 fwa pa semèn, pandan 4 semèn. </td><td style="padding: 5px;"> Sa nou dwe konnen  </td><td style="padding: 5px;"> Podofilin ka irite kote ki pa malad yo trapde. Anvan n mete medikaman an, se pou n pase yon ti vazlin arebò bouton yo. </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Kilès ki pa ka pran medikaman an  </td><td style="padding: 5px;"> Fanm ansent ak fanm k ap bay tete </td><td style="padding: 5px;"> Lè dòz nou pran an twò fò  </td><td style="padding: 5px;"> Nou ka gen noze, vomisman, doulé nan vant ak dyare. Po nou gen dwa dekale, fann oswa blese. </td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Efè segondè  </td><td style="padding: 5px;"> Podofilin ka irite po nou </td><td style="padding: 5px;"> Lòt medikaman ki bon tou </td><td style="padding: 5px;"> Pou bouton nan pati entim: asid triklowo-asetik, asid biklowo-asetik </td></tr> </tbody> </table> | Sou ki fòm medikaman an vini  | Likid: 10-25 % | Avètisman (Atansyon  pa kapon)  | Si bouton yo ap fè san, nou pa dwe pase podofilin sou yo. Si n gen gwo iritasyon tou, se pou n sispann pase podofilin. | Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè?  | Pran yon aplikatè osnon pwent yon moso twal ki pwòp pou n pase likid la. Apre 4 trèd tan, se pou n lave bouton yo ak savon epi n rense yo ak dlo. Nou dwe fè sa 1 fwa pa semèn, pandan 4 semèn. | Sa nou dwe konnen  | Podofilin ka irite kote ki pa malad yo trapde. Anvan n mete medikaman an, se pou n pase yon ti vazlin arebò bouton yo. | Kilès ki pa ka pran medikaman an  | Fanm ansent ak fanm k ap bay tete | Lè dòz nou pran an twò fò  | Nou ka gen noze, vomisman, doulé nan vant ak dyare. Po nou gen dwa dekale, fann oswa blese. | Efè segondè  | Podofilin ka irite po nou | Lòt medikaman ki bon tou | Pou bouton nan pati entim: asid triklowo-asetik, asid biklowo-asetik |
| Sou ki fòm medikaman an vini  | Likid: 10-25 % | Avètisman (Atansyon  pa kapon)  | Si bouton yo ap fè san, nou pa dwe pase podofilin sou yo. Si n gen gwo iritasyon tou, se pou n sispann pase podofilin. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè?  | Pran yon aplikatè osnon pwent yon moso twal ki pwòp pou n pase likid la. Apre 4 trèd tan, se pou n lave bouton yo ak savon epi n rense yo ak dlo. Nou dwe fè sa 1 fwa pa semèn, pandan 4 semèn. | Sa nou dwe konnen  | Podofilin ka irite kote ki pa malad yo trapde. Anvan n mete medikaman an, se pou n pase yon ti vazlin arebò bouton yo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kilès ki pa ka pran medikaman an  | Fanm ansent ak fanm k ap bay tete | Lè dòz nou pran an twò fò  | Nou ka gen noze, vomisman, doulé nan vant ak dyare. Po nou gen dwa dekale, fann oswa blese. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efè segondè  | Podofilin ka irite po nou | Lòt medikaman ki bon tou | Pou bouton nan pati entim: asid triklowo-asetik, asid biklowo-asetik | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lis Pwoblèm yo

Men lis pwoblèm yo. Agoch, n ap wè maladi yo, nan mitan, paj kote yo pale sou yo nan liv la, adwat medikaman ki trete yo. Li ta bon pou nou chache enfòmasyon sou kèlkeswa medikaman n ap pran. Pou plis enfòmasyon sou yon medikaman, ale nan tablo ki prezante medikaman yo, soti nan paj 490 rive nan paj 516.

| Pwoblèm | Paj | Medikaman |
|--|----------------------------------|---|
| atwòz | 133 | aspirin, ibipwofèn |
| vajen k ap bay san | | |
| apre avòtman | 251-253 | ègometrin |
| apre akouchman | 92-93 | ègometrin, oksitosen |
| yon ti tan anvan menopoz | 129 | medwoksiwojestewòn, seftriyakson, sipwofloksasin, |
| chank | 268-269, 278 | eritwomisin, kotrimoksazòl |
| klamidya | 264-266, 277 | kotrimoksazòl, doksisiklin, |
| tous | 303 | eritwomisin, tetrasiklin |
| dyare | 298-299 | kodeyin |
| metòd planin dijans | 224-225 | kotrimoksazòl, metwonidazòl, nòfloksasin |
| lafyèv | 297 | grenn planin fèb dòz (gwoup 2 ak 3) |
| lafyèv apre avòtman | 255-256 | aspirin, parasetamòl, ibipwofèn |
| apre akouchman | 97 | amoksisilin, dòksisiklin, metwonidazòl |
| pandan tranche | 86 | amoksisilin, metwonidazòl, pwokayin penisilin, kloramfenikòl |
| kriz pandan gwosè | 87 | anpisilin, pwokayin penisilin |
| champion nan bouch (chanklèt) | 305 | diazepam, silfat mayezyòm |
| sou po | 300 | jennsyàn yvolèt, ketokonazòl, nistaten |
| nan vajen | 264-266, 277 | jennsyàn yvolèt, ketokonazòl, nistaten |
| gonore | 264-266, 277 | jennsyàn yvolèt, kloramfenikòl, nistaten, vinèg, ketokonazòl |
| bouton-maleng-èpès | 269-270, 301 | sefiksim, seftriyazòn, siprofloksasin, kotrimoksazòl, doksisiklin, kanamisin, metwonidazòl, nòfloksasin |
| enfeksyon (prevansyon) | 249, 465 | asiklovir |
| lè famm eksize ak dekoud | 465 | amoksisilin, doksisiklin |
| enfeksyon (trètman) apre avòtman | 255-257 | amoksisilin, eritwomisin, vaksen pou tetanos |
| nan blad pipi | 368 | amoksisilin, benzil penisilin, doksisiklin, eritwomisin, jenntamisin, kloramfenikòl, metwonidazòl, vaksen pou tetanòs |
| nan tete | 116-117 | amoksisilin, kloramfenikòl, eritwomisin, metwonidazòl, penisilin, pwokayin penisilin |
| apre akouchman | 97, 465 | diklosaksilin, eritwomisin, vaksen tetanòs |
| apre yon eksizyon | 461-462 | amoksisilin, kotrimoksazòl |
| nan ren | 368 | diklosaksilin, eritwomisin, vaksen tetanòs |
| de manjezon pati entim | (ale nan vajen k ap bay vle dlo) | amoksisilin, kotrimoksazòl, anpisilin, jenntamisin |
| nan po | 30 | difenidramin, idwokötizòn, idroksizin |
| kè plen | 302 | pwometazin |
| swen pou je ti bebe ki fenk fèt | 83 | pomad eritwomisin, pomad tetrasiklin, pomad kloranfenikòl |
| pou je doulè | | |
| doulè ki pa twò gwo | 482 | aspirin, parasetamòl, ibipwofèn |
| gwo doulè | 482 | kodeyin |

| | | |
|----------------------------------|------------------------|--|
| enflamasyon nan basen | 272 | doksisiklin, metwonidazòl, nòfloksasin |
| nemoni moun ki gen Sida yo | 304 | kotrimoksazòl |
| bouton-maleng ki enfekte | 307 | dikloksasilin, eritwomisin, penisilin, potasyòm pèmaganant benzatin penisilin, eritwomisin |
| nan pati entim | 268-270, 278 | benzatin penisilin, doksisiklin, eritwomisin, tetrasiklin |
| sifilis | 268-269, 278 | penisilin G |
| tetanòs ti bebe | 95 | silfat mayezyòm, diazepam |
| Toksemi/kriz (eklanpsi) | 87 | metwonidazòl |
| trikomonas | 264-266, 277 | kotrimoksazòl, doksisiklin, metwonidazòl |
| vajen k ap bay vye dlo | (ale nan chapit 16) | klotrimazòl, jennsyàn vyolèt, metwonidazòl |
| ak danje MST | 264-266, 277 | podofilin, asid triklowoasetik amoksisilin, |
| san danje MST | 264-266, 277 | kloramfenikòl, metwonidazòl, penisilin, pwokayin penisilin |
| gwo bouton nan pati entim | 267 | jennsyàn vyolèt, klotrimazòl, mikonazol, nistaten, vinèg, |
| enfeksyon nan matris | 97, 264-266, 277 | ketokonazòl |
| chanpyon, chank lèt | 117, 264-266, 277, 300 | |

Lis Medikaman yo

Lis medikaman sa yo gen 2 pati (non komèsyal ak non jenerik). W ka chèche non yon medikaman w swete itilize nan lis la epi gade nimewo paj la kote w ka jwenn plis enfòmasyon sou li. Se nan paj vèt yo w ka jwenn enfòmasyon sa yo.

| | |
|----------|--|
| A | adrenalin, ale nan epinefrin 497 <i>Adrenaline</i> , epinefrin 499 aktive, chabon 494 <i>Amen</i> , medwokspwojestewòn 491 <i>Aminophylline</i> , podofilin 510 <i>Amizol</i> , metwonidazòl 505 amoksisinil 490 amoksisinil ak klavilanat potasyòm 490 <i>Amox</i> , amoksisinil 490 <i>Amoxiclav</i> , amoksisinil ak klavinat potasyòm 490 <i>Amoxil</i> amoksisinil 490 <i>Ampifen</i> , anpisilin 491 <i>Anatoxalte</i> , toksoyid pou tetanoù 515 anpisilin 491 <i>Apo-acyclovir</i> , asiklovir 492 <i>Apo-doxycilline</i> , doksisiklin 496 <i>Apo-hydroxyzine</i> , idwoksizin 500 <i>ASA</i> , aspirin 492 asetaminofèn ale nan parasetamòl 509 asetat medwokspwojestewòn ... 491 asid asetyl-salisilik, ale nan aspirin 492 asid biklowo-asetik, ale nan asid triklowo-asetik 492 asiklovir 492 <i>Asperic</i> , aspirin 492 aspirin 492 <i>Atarax</i> , idwoksizin 504 <i>Augmentin</i> , amoksisinil ak klavinat potasyòm 490 <i>azidothymidine</i> , AZT 493 azitwomisin 493 AZT 493 |
|----------|--|

B

| |
|--|
| <i>Bactamox</i> , amoksisinil 490 <i>Bactrim</i> , ko-trimoksazòl 504 <i>Benadryl</i> , difenidramin 495 <i>Benemid</i> , pwobenesid 511 bennzatin penisilin 493 bennzilpenisilin 494 <i>Bervinor</i> , gress planin 518 <i>Bicillin L-A</i> , bennzatin penisilin 493 <i>Bioxil</i> , amoksisinil 490 <i>Brevicon 1+35</i> , gress planin ... 517 <i>Brevicon</i> gress planin 518 |
|--|

C

| |
|---|
| <i>Calmplex</i> , dyazepam 495 <i>Canesten</i> , klotrimazòl 503 <i>Carbolevure</i> , chabon active 494 <i>Cephalex</i> , sefaleksin 513 <i>Cetraxlal</i> , sipwofloksasin 514 |
|---|

chabon aktive 494

| |
|--|
| <i>Charbon Aktivè</i> , chabon aktive 494 <i>Chloramex</i> , kloramfenikòl 503 Chloromycetin, kloranfenikòl 503 <i>Cipro</i> , sipwofloksasin 514 <i>Ciproxina</i> , sipwofloksasin 514 <i>Cortaid</i> , idwokòtizòn 500 <i>Coxacilline</i> , dikloksasilin 496 <i>Cytotec</i> , mizoprostòl 506 |
|--|

D

| |
|--|
| <i>Daktarin</i> , mikonazòl 506 <i>Datril</i> , parasetamòl 509 <i>Decadron</i> , deksametazòn 494 deksametazòn 494 <i>Delfen</i> , espèmid 520 Depo Provera (DMPA), piki planin 519 Depo Provera, medwoksi- pwojestewòn 491 <i>Dermodox</i> , nistaten 507 <i>Dexafect</i> , deksametazòn 494 <i>Dexambutol</i> , etanbitòl 499 diazepam 495 difenidramin 495 dikloksasilin 496 doksisiklin 496 <i>Doliprane</i> , parasetamòl 509 <i>Doli-stop</i> , ibipwofèn 499 <i>Doryx</i> , doksisiklin 496 <i>Dox</i> , doksisiklin 496 <i>Doxicap</i> , doksisiklin 496 dyazepam 495 <i>Dramamine</i> , difenidramin 495 |
|--|

E

| |
|---|
| ègometrin maleyat 497 <i>EMB</i> , Etambitòl 499 <i>Emko</i> , espèmid 520 <i>Engerix – B</i> , vaksons epatit B 516 <i>Ephedrine</i> , epinefrin 497 epinefrin 497 Epinephrine, epinefrin 497 Ergonovine ègometrin maleyat 497 Ergotrate, ègometrin maleyat ... 497 <i>Eriped</i> , eritwomisin 498 eritwomisin 498 <i>Erythrocin</i> , eritwomisin 498 estreptomisin 498 estwojèn 498 etanbitòl 499 etinil estradyòl gade estwojèn 498 <i>Eugynon</i> , gress planin 517 |
|---|

| |
|---|
| F |
| <i>Femenal</i> , gress planin 517 <i>Femulen</i> , gress planin 517 <i>Flagyl</i> , metwonidazòl 505 <i>Floxan</i> , nòflaksasen 508 <i>Furantoina</i> , nitwofirantoyin 507 |

G

| |
|--|
| <i>Gantanol</i> , kotrimoksazòl 497 <i>Garamycin</i> , jenntamisin 501 <i>Gentamycin</i> , jenntamisin 501 gress planin 517-519 |
|--|

I

| |
|--|
| ibipwofèn 499 idwokòtizòn 500 idwoksizin 500 <i>INCG</i> , bennzilpenisilin 494 <i>INH</i> izonyazid 501 <i>isonicotinic acid hydrazide</i> , izonyazid 501 izonyazid 501 |
|--|

J

| |
|-----------------------|
| jenntamisin 501 |
|-----------------------|

K

| |
|---|
| kanamisin 502 <i>Kantrex</i> , kanamisin 502 <i>Keflex</i> , sefaleksin 513 ketoconazòl 502 kloramfenikòl 503 klotrimazòl 503 kodeyin 504 ko-trimoksazòl 504 |
|---|

L

| |
|---|
| <i>Lempko</i> , espèmid 520 <i>Liquid antidòt</i> , chabon aktive 493 <i>Loestrin 1/20</i> , gress planin 517 <i>Lo-Femenal</i> , gress planin 517 <i>Logynon</i> , gress planin 517 <i>Lo-Ovral</i> , gress planin 517 <i>Lotrimin</i> klotrimazòl 503 |
|---|

M

| |
|--|
| <i>Mesigyna</i> , piki planin 519 <i>Mestranòl</i> , gade estwojèn 498 <i>Methergine</i> , ègometrin maleyat 497 metil ègonovin maleyat, ègometrin 497 metilrosanilnyòm klorid, Vyolet Jennsyen 516 <i>Metrogyl</i> , metwonidazòl 505 metwonidazòl 505 <i>Microgynon 30</i> , gress planin 517 <i>Microlut</i> , gress planin 517 <i>Micronor</i> , gress planin 517 <i>Micronovum</i> , gress planin 517 |
|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----|--|-----|--|--|--|
| <i>Microclar</i> , gress planin | 517 | <i>Penisilin G</i> , benzilpenisilin | 494 | <i>Theracine</i> , tetrasiklin | 516 | | | |
| mifepristòn | 505 | <i>Pentrexyl</i> , anpisilin | 491 | <i>Thiazina</i> , tyasetazòn | 516 | | | |
| mikonazòl | 506 | <i>PenVee K</i> , penisilin | 509 | <i>TMP/SMX</i> , kotrimoksazòl | 504 | | | |
| <i>Minovlar</i> , gress planin | 517 | <i>Perle LD</i> , gress planin | 517 | toksoyid pou tetanòs | 515 | | | |
| mizopwostòl | 506 | <i>Perle</i> , gress planin | 517 | <i>Tricef</i> , seftriyaksòn | 513 | | | |
| <i>Modicon</i> , gress planin | 517 | <i>Phenergan</i> , pwometazin | 512 | trimetwopin, gade nan ko-trimoksazòl | 504 | | | |
| <i>Motrin</i> , ibipwofèn | 499 | <i>phenoxyethyl penicillin</i> , penisilin | 509 | <i>Trinordiol</i> , gress planin | 517 | | | |
| <i>Myambutol</i> , etanbitòl | 499 | pirazinamid | 510 | <i>Trinovum</i> , gress planin | 517 | | | |
| <i>Mysostatin</i> , nistatin | 507 | <i>Pitocin</i> , oksitosin | 508 | <i>Triphasil</i> , gress planin | 517 | | | |
| <i>Mycoster</i> , ketoconazòl | 502 | <i>PNVK</i> , penisilin | 509 | <i>Triquilar</i> , gress planin | 517 | | | |
| <i>Mycrol</i> , etambitòl | 501 | podofilin | 510 | <i>Tromic</i> , azitwomisin | 493 | | | |
| N | | | | | | | | |
| nakotik, gade nan kodeyin | 497 | <i>Postinor-2</i> , gress planin nan ka ijans | 519 | <i>Tussex</i> , kodeyin | 504 | | | |
| <i>Neogynon</i> , gress planin | 517 | <i>Premarin</i> , estwojèn | 498 | tyasetazòn | 516 | | | |
| <i>Neokon</i> , gress planin | 517 | <i>Prempack</i> , estwojèn | 498 | <i>Tylenol</i> , parasetamòl | 509 | | | |
| <i>Neo-Sampoone</i> , espèmisisid | 520 | <i>Primovlar</i> , gress planin | 517 | V | | | | |
| <i>Neusil</i> , podoofilin | 510 | <i>Probenecid</i> , pwobenesid | 511 | vaksen kont epatit B | 516 | | | |
| <i>Nilstat</i> , nistaten | 507 | <i>Progesta</i> , pwojestewòn | 511 | vaksen tetanòs toksoyid | 515 | | | |
| nistaten | 507 | <i>Progestin</i> , pwojestewòn | 511 | <i>Valium</i> , dyazepam | 495 | | | |
| nitwofirantwen | 507 | <i>Promaz</i> , pwometazin | 512 | Vyolèt Jennsyàn | 516 | | | |
| <i>Nizoral</i> , mikonazòl | 506 | <i>Provera</i> , medwoski- pwojestewòn | 491 | W | | | | |
| <i>Nòplan</i> , enplan (metòd planin) | 520 | pwobenesid | 511 | <i>Winasorb</i> , parasetamòl | 509 | | | |
| <i>Nopril</i> , ko-trimoksazòl | 504 | pwojestewòn | 511 | Z | | | | |
| <i>Noprilam</i> , amoksilin ak klavint potasyòm | 490 | pwojestin | 511 | <i>zidovudine</i> , AZT | 493 | | | |
| <i>Nor-QD</i> , gress planin | 517 | pwokayin penisilin | 511 | <i>Zithromax</i> , azitwomisin | 493 | | | |
| <i>Nordette</i> , gress planin | 517 | pwometazin | 512 | <i>Zovirax</i> , asiklovir | 492 | | | |
| <i>Nordiol</i> , gress planin | 517 | <i>PZA</i> , pirazinamid | 510 | R | | | | |
| nòfloksasen | 508 | <i>Recombivax HB</i> , vaksen kont epatit B | 516 | <i>Retapen</i> , bennzatin penisilin | 493 | | | |
| <i>Noriday 1 + 50</i> , gress planin | 517 | <i>Retrovir</i> , AZT | 493 | <i>Rifanpen</i> , rifampisin | 512 | | | |
| <i>Norimin</i> , gress planin | 517 | rifampisin | 512 | <i>Rocephin</i> , seftriyaksòn | 513 | | | |
| <i>Norinyl 1 + 35</i> , 1 + 50, gress planin | 517 | <i>RU 486</i> mifepristòn | 505 | <i>S</i> | | | | |
| <i>Noristerat (Net-En)</i> , piki planin | 519 | sefaleksin | 513 | <i>sefiksime</i> | 513 | | | |
| <i>Norlestrin</i> , gress planin | 517 | sefriyaksòn | 513 | <i>Septra</i> , kotrimoksazòl | 504 | | | |
| <i>Novopen</i> , benzilpenisilin | 494 | <i>Solu-cortef</i> , idwokòtizòn | 500 | <i>Sulfametwoksazòl</i> , gade nan ko-trimoksazòl | 504 | | | |
| <i>Norplant</i> , (metòd planin) | 520 | sulfat manyezòm | 514 | <i>silfat</i> | 514 | | | |
| <i>Nuprin</i> ibipwofèn | 499 | silfisoksazòl | 514 | <i>sipwofloksasin</i> | 514 | | | |
| <i>Nystat</i> , nistaten | 507 | sipwofloksasin | 514 | <i>streptomycin</i> , esteptomisin | 498 | | | |
| O | | | | | | | | |
| oksitosen | 508 | <i>streptomycin</i> , esteptomisin | 498 | <i>sulfate de magnesie</i> , silfat mayezòm | 514 | | | |
| <i>Omnipen</i> , anpisilin | 491 | <i>Tempra</i> , parasetamòl | 511 | <i>Sulfathiazol</i> , silfisoksazòl | 514 | | | |
| <i>Oroken</i> , sefiksime | 513 | <i>Tetavax</i> vaksen tetanus toksoyid | 515 | <i>Sulfatrim</i> , ko-trimoksazòl | 504 | | | |
| <i>Ortho-Novum 1 / 35, 1 / 50</i> , gress planin | 517 | <i>tetracycline</i> , tetrasiklin | 515 | <i>Sulfatrim</i> , kotrimoksazòl | 497 | | | |
| <i>Ovcon</i> , gress planin | 517 | tetasiklin | 515 | <i>Synophase</i> , gress planin | 517 | | | |
| <i>Ovcon 50</i> , gress planin | 517 | T | | | | | | |
| <i>Ovral</i> , gress planin | 517 | <i>Tempra</i> , parasetamòl | 511 | | | | | |
| <i>Ovrette</i> , gress planin | 517 | <i>Tetavax</i> vaksen tetanus toksoyid | 515 | | | | | |
| <i>Ovysmen</i> , gress planin | 517 | <i>tetracycline</i> , tetrasiklin | 515 | | | | | |
| <i>Ovysmen</i> , 1/35 | 517 | tetasiklin | 515 | | | | | |
| <i>Oxacilline</i> , dikloksasilin | 496 | Tetragynon , gress planin ijans | 519 | | | | | |
| <i>Oxtimon</i> , oksitosen | 510 | | | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| <i>Panadol</i> , parasetamòl | 509 | | | | | | | |
| parasetamòl | 509 | | | | | | | |
| <i>Penadur L-A</i> , bennzatin penisilin | 493 | | | | | | | |
| <i>Penbritin</i> , anpisilin | 491 | | | | | | | |
| penisilin | 509 | | | | | | | |
| <i>Penicillin Procaine</i> , pwokayin penisilin | 512 | | | | | | | |

adrenalin oswa epinefrin (Adrenaline, Ephedrine, Epinephrine)

Se menm medikaman an ki pote tou 2 non sa yo. Yo itilize l pou konbat aleji grav osnon endispozisyon aleji lakòz. Li soulaje, pa egzanp, pwoblèm aleji ak penisilin. Yo sèvi avè l tou pou konbat gwo atak opresyon.
Gade epinefrin nan paj 497.

amoksisilin (Amox, Amoxil, Bactamox, Bioxil)

Amoxicilin se yon antibiotik ki soti nan fanmiy penisilin. Yo itilize l pou konbat enfeksyon nan matris, enfeksyon nan sistèm irinè, nemoni ak lòt enfeksyon. Jounen jodi a, amoxicilin ranplase anicilin anpil kote.

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini? | Grenn: 250 ak 500 mg Likid: 125 oubyen 250 mg per 5 ml | Ki moun ki pa dwe pran medikaman sa a : |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou klamidya, maladi enflamasyon nan basen oubyen enfeksyon nan tête: Bwè 500 mg 3 fwa pa jou pandan (gade nan paj 277 pou n wè kijan pou n mete medikaman ansannm pou n trete pwoblèm vajen k ap bay vye dio; pou maladi enflamasyon nan basen gade nan paj 278) | Efè segondè: Moun k ap pran medikaman an ka gen dyare, bouton, noze oubyen vomisman. Fanm yo ka gen champion e ti bebe yo ka gen chofi. |
| | | Sa nou dwe konnen: Si, apre 3 jou, nou pa santi n kòmanse refè, se pou n chache konkou doktè; petèt se yon lòt medikaman pou n pran. Se lè n ap manje pou n bwè medikaman an. |
| | | Lòt medikaman ki bon tou Pou enfeksyon nan basen oubyen nan ren: Anpisilin, co-trimoxazole, norfloksasin |

amoksisilin ak klavinat potasyòm (Amoxiclav, Augmentin, Noprilam)

Amoksisilin ak klavinat potasyòm (Augmentin) se yon antibiotik ki nan Fanmi Penisilin. Yo sèvi avè l nan tretman gonore ak lòt enfeksyon. Men nan sèten peyi, gonore reziste, jounen jodi a, devan medikaman sa a. Li konbat sèten enfeksyon pi byen pase amoksisilin ki pa melanje a, men li koute chè epitou nou ka gen difikilte pou n jwenn li nan peyi pòv yo. Malerezman, yo pa vann klavinalat potasyòm poukout li. Si se te konsa, nou t ap ka achte l epi n melanje ak amoksisilin nòmal la.

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Grenn: 125, 200, 250, 400, 500 ak 875 mg Likid: 125, 200, 250 ak 400 mg nan chak 5 ml | Ki moun ki pa dwe pran medikaman an |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou gonore: Bwè 3 gram amoksisilin ak klavinalat potasyòm (Augmentin) plis 1 gram pwobenesid, yon sèl kou, yon sèl fwa. | Lòt medikaman ki bon tou Pou gonore: gade nan paj 266 ak 277, n ap jwenn plizyè gwoup medikaman |

anpisilin (Ampifen, Ampival, Omnipèn, Pentrexyl)

Anpisilin se yon antibiotik ki nan Fanmi Penisilin. Yo trete divès kalte enfeksyon avè l.

| | | |
|---|--|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Grenn ak kapsil: 250 osnon 500 mg Likid: 125 osnon 250 mg nan chak 5 ml Pou nou ka melanje pou n fè piki: 500 mg | Ki moun ki pa dwe pran medikaman an  Pa sèvi ak medikaman sa a, si n fè alèji ak antibiotik ki nan Fanmi Penisilin yo |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  Pou enfeksyon nan tete oubyen maladi Enflamasyon nan Basen: Bwè ant 250 ak 500 mg, 4 fwa pa jou, pandan 7 jou (gade nan paj 278 pou n wè ki gwoup medikaman k ap trete maladi enflamasyon nan basen). | Efè segondè  Anpisilin ka deranje lestomak nou, li ka bann dyare epitou li ka fè yon bann ti bouton leve sou nou. |
| Pou enfeksyon nan vesi: | Si n pa ansest, nou gen dwa pran 3 gram, yon sèl kou. Si n ansest, se pou n bwè 250 mg, 4 fwa pa jou, pandan 7 jou. |  Si, apre 3 jou, nou pa santi n kòmanse refè, se pou n chache konkou doktè; petèt se yon lòt medikaman pou n pran. |
| Pou enfeksyon nan ren: | Bwè 500 mg, 4 fwa pa jou, pandan 14 jou. Si n ap vomi, se pou n pran piki 500 mg nan misk, 4 fwa pa jou, men yon fwa vomisman an sispann, se pou n rekòmanse bwè gress yo. | Avètismen  Pran medikaman an anvan n manje |
| Pou lafyèv pandan gwochès: | Se pou n kontinye pran 500 mg, 4 fwa pa jou, jiskaske n jwenn konkou doktè. | Lòt medikaman ki bon tou Pou enfeksyon nan vesi oubyen nan ren: amoksisilin, ko-trimoksazòl, nòflaksen Pou enfeksyon nan tete: amoksisilin, sefaleksin, dikloksasilin, eritwomisin |

asetaminofèn oswa parasetamòl (Datril, Doliprane, Panadol, Tylenol ak lòt non)

Medikaman sa a ki soulaje doulè epitou ki bese lafyèv rele oubyen Acetaminofèn oubyen parasetamòl. Kidonk Asetaminofèn ak parasetamòl se memm bagay. Se youn nan analjezik ki bay rezilta pi vit. Li pa deranje lestomak moun e moun ki soufri ak ilsè nan lestomak ka itilize l nan plas aspirin. Fanm ansest ka pran l tou. Gade parasetamòl nan paj 509.

| asetat medwokspwojestewòn (Amen, Depo-Provera, Provera) | | Prekosyon  |
|--|---|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Grenn: 2.5, 5 oubyen 10 mg  | Kilès ki pa dwe pran medikaman an  Fanm k ap soufri ak epatit; Fanm ki gen kansè nan tete oubyen nan kòl matris |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Lè règ la vini ak anpil san: Bwè 10 mg, yon fwa pa jou, pandan 10 jou. Si san an pa rete, se pou n kontinye pran medikaman an pandan 10 jou ankò. | Avètismen  Si san an kontinye vini malgre nou gen 20 jou depi n ap suiv tretman an, se pou n kouri al wè yon travayè (z) sante. Pwooblèm nan gen dwa grav. |

asid triklowo-asetik, asid biklowo-asetik

Ni asid triklowo-asetik, ni asid biklowo-asetik ka trete bouton nan pati entim

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini | | Divès kalte likid. Sa k pi fèb yo gen 10 % asid, sa k pi fò yo gen 35 % | | Avètisman Pran prekosyon n, lè n ap sèvi ak medikaman sa a. li ka boule n byen boule, jouk nou pote mak. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | | Mete pwodui a sou bouton yo sèlman, yon fwa pa semèn, pandan 1, 2 oswa 3 semèn, dapre jan n santi enfeksyon an. | | Sa nou dwe konnen Tou dabò, fòk nou pase ti pomad vazlin arebò bouton yo, pou n ka anpeche remèd la gaye. Apre sa, se pou n pase asid triklowo-asetik la sou bouton yo. N ap santi l ap boule n pandan 15-30 minit. Si l gaye kote ki pa gen bouton, se pou n netwaye yo ak dlo ak savon. Nou gen dwa mete poud ti bebe oswa bikabonat tou kote remèd la gaye yo. |
| Efè segondè | | Si aksid triklowo-asetik la gaye sou po n, l ap manje menm kote ki pa malad yo. | | Lòt medikaman ki bon tou Podofilin |

asiklovir (Apo-acyclovir, Zovirax)



Asiklovir se yon medikaman ki konbat viris. Yo sèvi avè l kont maladi èpès ki konn ba moun bouton-maleng nan vajen, nan kòk, nan twou dèyè a kan bouch. Bouton sa yo bay gwo doulè. Asiklovir pa ka anpeche maladi a tounen sou moun nan, men l ap kalme doulè a epitou l ap anpeche maladi a gaye nan tout kò malad la.

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini? | | Grenn: 200, 400 oubyen 800 mg Krèm: 5 % | Sa nou dwe konnen: | Grenn yo bay pi bon rannman pase krèm nan. Se pou n bwè yo ak anpil dlo. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | | Pou enfeksyon èpès jenital: Bwè 200 mg 5 fwa pa jou pandan 7 a 10 jou. Pou bouton lafyèv: Pase krèm sou bouton yo 6 fwa pa jou pandan 7 jou. | Efè segondè: | Maltèt, tètvire, noze, vomisman |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman sa a? | | Moun ki soufri ak maladi ren | Lè dòz nou pran an twò fò: | Nou gen maltèt, pèt memwa, noze difikilte pou n pipi. |

aspirin (asid asetil-salisilik, ASA, Aspegic ak kèk lòt)



Aspirin konbat doulè, enflamasyon ak lafyèv.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini | | Grenn: 300, 500 mg ak lòt kantite tou | Efè segondè: | Medikaman sa a ka deranje lestomak nou. Li ka bann doulè nan lestomak oubyen pwoblèm emoraji. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | | Pou doulè, enflamasyon oubyen lafyèv: Bwè ant 300 ak 600 mg, chak fwa n santi n bezwen remèd, men nan yon jounen, fòk nou pa pran aspirin plis pase 6 fwa. | Sa nou dwe konnen: | Aspirin ka trete sèten maladi tankou atwoz ak pwoblèm kè, men se sitou pou konbat doulè ak lafyèv yo itilize l. Li enpòtan pou n chache konnen ki pwoblèm ki bann doulè oubyen lafyèv la. Fòk nou trete pwoblèm nan. Si doulè a dire plis pase 10 jou, si lafyèv la dire plis pase 3 jou, se pou n chache konkou doktè. |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an | | Fanm pa dwe pran aspirin pandan 3 premye mwa gwosè yo. Moun ki gen ilsè nan lestomak oubyen pwoblèm emoraji pa dwe pran aspirin. Si n pran l fè operasyon, fòk nou pa pran aspirin nonplis. Si n ap bay tete, nou pa dwe pran aspirin toutotan ti bebe a pa gen plis pase yon semèn. Pa ba timoun aspirin pou lafyèv, grip osnon varisèl | Lè dòz nou pran an twò fò: | Zòrèy nou gen dwa kònèn, nou ka gen maltèt, vètij ak latwoublay nan lespri n. Souf nou gen dwa wo tou. |
| | | | Lòt medikaman ki bon tou | Pou doulè oubyen lafyèv: paracetamòl Pou doulè lafyèv, oubyen enflamasyon: ibipwofèn Pou doulè grav: kodeyin |

| azitwomisin (Tromic, Zythromax) | | Prekosyon |
|---|--|---|
| Azitwomisin se yon antibiotik ki nan Fanmi Makwolid yo. Yo trete plizyè MST avè l. Li koute chè epi, anpil fwa, n ap gen difikilte pou n jwenn li. Men lè plizyè lòt antibiotik bat ba, azitwomisin konbat MST yo san twòp pwoblèm. | | |
| Sou ki fòm medikaman an vini? | Kapsil: 250 mg |  |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou fanm ki gen chans pou yo trape MST: Bwè yon gram azitwomisin, yon sèl kou, yon sèl fwa. |  |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an | Moun ki fè alèji ak eritwomisin epitou ak lòt antibiotik ki soti nan Fanmi Makwolid pa dwe pran azitwomisin. |  |
| Efè segondè | Dyare, noze, vomisman, doulè nan vant. |  |
| Sa nou dwe konnen | Pran medikaman an, inèd tan, pou piti, anvan n manje oubyen 2 zèd tan, pou piti, apre n fin manje. |  |
| Lòt medikaman ki bon tou | Azitwomisin konbat san pwoblèm pifò MST ki lakòz vajen fanm bay vye dlo oubyen ki fè fanm gen bouton-maleng nan pati entim. Li bon pou tretman MST ki reziste devan lòt medikaman. | |
| | lè yon MST lakòz vajen fanm ap bay vye dlo: ale nan paj 277 | |
| | pou ilsè nan pati entim: ale nan paj 278 | |

AZT (Azidothymidine, Retrovir, Zidovudine)

AZT se yon medikaman ki bon pou moun ki gen SIDA. Li ka anpeche yon fanm ansezt ki enfekte ak VIH kontamine ti bebe a pandan gwozès oswa pandan akouchman. Moun mal pou pran medikaman sa a poukout yo. An reyalite, se oubyen lopital, oubyen anba kontwòl yon travayè (z) sante konpetan pou n pran AZT. Yon lòt bò, se yon medikaman ki koute anpil kòb e n ap gen difikilte pou n jwenn li nan peyi pòv yo.

| bennzatin penisilin (Bicillin L-A, Penadur L-A, Retapen) | | |
|--|---|---|
| Bennzatin penisilin se yon antibiotik ki pran san l pou l konbat enfeksyon yo, ti pa. Ak medikaman sa a ki soti nan Fanmi Penisilin, yo trete sifilis, maleng nan pati entim ak lòt enfeksyon – ladan yo: malgòj. Yo toujou bay li ak yon piki nan misk. | | |
| Sou ki fòm medikaman an vini | Poud nou ka melanje pou n fe piki: 1,2 oubyen 2,4 milyon inite nan yon anpoul 5 ml |  |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou maleng nan pati entim, sifilis ki fèk parèt oubyen prevansyon kont sifilis apre n fin sibi yon kadejak oswa apre n fin kouche ak yon moun ki gen sifilis: Pran yon piki 2,4 milyon inite nan misk, yon sèl fwa. |  |
| | Pou sifilis ki sou nou depi kèk tan: Pran yon piki 2,4 milyon inite, chak semèn, pandan 3 semèn. | |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an | Moun ki fè alèji ak medikaman nan Fanmi Penisilin yo |  |
| Avètisman | Fòk nou toujou gen medikaman ki rele epinefrin nan tou pare, lè n ap sèvi ak piki penisilin. Siveye pou n wè si moun nan pa p gen pwoblèm alèji oubyen tou si alèji pa p fè l endispoze. Mòd pwoblèm sa yo ka pran 30 minit pou yo parèt. |  |
| Lòt medikaman ki bon tou | Pou sifilis: doksisiklin, tetrasiklin, eritwomisin Fòk nou toujou suiv tretman pou chank tou-gade nan paj 278 | |

bennzilpenisilin (INCG, Novopen, Penicilin G potasyòm oswa sodyòm)

Bennzilpenisilin se yon antibiotik ki soti nan Fanmi Penisilin. Yon trete divès kalte enfeksyon grav avè 1 – ladan yo: enfeksyon apre avòtman.

| | | |
|--|---|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Poud nou ka melanje pou n fè piki: 1 oubyen 5 milyon Inite |  Avètisman Siveye pou n wè si pa p gen pwoblèm alèji osnon siy endispozisyon alèji lakòz. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  Pou enfeksyon grav apre avòtman: Piki 5 milyon Inite nan misk, yon sèl fwa (fòm moun nan pran lòt medikaman tou, gade nan paj 257). | Lòt medikaman ki bon tou Pou enfeksyon grav apre avòtman: anpisilin, sefaleksin, sipwofloksasen, nòflaksen (gade nan paj 256 ak 257 pou n wè gwoup medikaman k ap bay rezulta yo). |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an |  Moun ki fè alèji ak medikaman nan Fanmi Penisilin yo. | |

chabon aktive (Carbolevure, Charbon Activé)

Chabon aktive se yon chabon yo prepare espesyalman pou tretman moun ki entoksike ak medikaman tankou aspirin, asetaminofèn, fenobabitòl osnon lòt medikaman oswa pwodui chimik oswa mòd djondjon ki konn anpwazonnen moun yo. Lè n fin ba yon moun chabon aktive, se pou n mennen l al wè doktè san pèdi tan.

| | | |
|--|--|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Likid: 25 g nan chak 120 ml Poud: 15 g |  Efè segondè Moun gen dwa fè tata ki nwa. Li ka gen vomisman ak dyare tou. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  Bwè ant 30 ak 100 g yon sèl kou |  Avètisman Kouri al chache konkou kay doktè. Si moun nan pran yon dòz medikaman ki twò fò, li gen dwa malad grav. Tretman ak chabon aktive a gen dwa pa sifi. |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an |  Pa pran medikaman sa a, si se yon likid lejè nou te vale, tankou pa egzanp, gazolin, kewozin oubyen lòt pwodui ki fèt ak petwòl. | |

deksametazòn (Decadron, Dexafect)

Deksametazòn se youn nan medikaman ki rele estewoyid yo. Ak medikaman sa a, yo trete moun ki endispoze akòz pwoblèm alèji (gade nan paj 541).

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Grenn: 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2 oubyen 4 mg Likid: 0,5 mg nan chak 5 ml oubyen 1 mg nan chak mililit Pou piki: 4, 8, 10, 16 oubyen 20 mg nan chak mililit |  Efè segondè Si moun nan soufri ak dyabèt, deksametazòn nan ka fè dyabèt la ba l plis pwoblèm pandan dezoutwa zèd tan. Tansyon moun nan ka monte tou. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  Pou endispozisyon alèji lakòz: Piki 20 mg nan misk. Si sentòm yo tounen, se pou moun nan bwè 20 mg Deksametazòn. Li gen dwa rekòmanse, si 1 santi 1 bezwen sa. | Lòt medikaman ki bon tou Pou endispozisyon alèji lakòz: idwokòtizòn |

diazepam (Calmpex, Valium)

Prekosyon



Diazepam se yon kalman. Li trete konvilzyon ak kriz. Li ka anpeche moun gen mòd pwoblèm konsa (prevansyon). Yon lòt bò, li soulaje moun ki sou tansyon (anksyete) epitou li fè moun dòmi.

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Grenn: 5 oubyen 10 mg Pou piki: 5 mg nan chak mililit oubyen 10 mg nan chak 2 ml | Efè segondè Si yon famm sèvi anpil fwa ak diazepam oubyen tou si l pran gwo dòz diazepam, ti bebe a gen dwa fèt ak donmajman. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou konvilzyon: Ak yon sereng san zegwi, vide 20 mg diazepam (pou piki) nan twou dèyè moun nan (gade nan paj 87). Apre chak konvilzyon, rekòmanse ak 15 mg, si sa nesesè. Si n pa jwenn dyazep am pou piki, nou gen dwa melanje gress kraze ak dlo. Pou anpeche moun tonbe kriz, lè yo fèk kite bwè bweson: fè yo bwè 10 mg, pou pi piti, 20 mg, pou pi plis. Si sa nesesè, yo gen dwa rekòmanse, inèd tan apre. Si sentòm yo pa disparèt, se pou n kontinye ba moun nan diazepam, chak 4 oubyen 5èd tan, pandan n ap mennen 1 al wè doktè. Lè n gen pwoblèm anksyete ak lè n pa gen somèy: se pou n bwè ant 2.5 ak 5 mg. | Avètisman Lè n kòmanse pran diazepam, nou gen santi n bezwen pran l toutan (yo rele sa depandans). Se pou n evite sèvi ak medikaman sa a ansam ak lòt medikaman sa a ansam ak lòt medikaman oswa dwòg (sitou bweson) k ap fè n anvi dòmi toutan. |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an | Se sèl nan ka d ijans famn ansent ak fanm k ap bay tete gen dwa pran diazepam | Sa nou dwe konnen Diazepam pa bon pou doule. Se yon medikaman ki bay gwo pwoblèm depandans. |
| | | Lè dòz nou pran an twò fò Nou gen dwa dòmi je klè; kò nou ka twò lou pou nou; epitou nou gen dwa gen latwoublay nan lespri n. |
| | | Lòt medikaman ki bon tou Pou konvilzyon: silfat mayezòm pou pwoblèm somèy: difenidramin Pou anksyete: idwoksizin |

difenidramin (Benadryl, Dramamine)

Prekosyon



Difenidramin se youn nan medikaman sila yo ki rele anti-istaminik. Li trete nen k ap fè rim epitou li fè moun dòmi. Li ka ba moun k ap soufri ak SIDA bonjan soulajman, lè pwoblèm demanjezon ak pwoblèm somèy ap sakaje yo san rete. Yon lòt bò, li ka soulaje moun ki gen pwoblèm aleji ak moun ki endispoze akòz aleji.

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Sou ki fòm medikaman an vinie? | Grenn osnon kapsil: 25 oubyen 50 mg Siwo: 12,5 mg nan chak 5 ml Anpoul pou piki: 10; 30 oubyen 50 mg nan chak mililit | Avètisman Nou pa dwe pran difenidramin, si n vle ret veyatif pandan kèk tan. Yon lòt bò, difenidramin ka fè lòt kalman oubyen bweson aji sou nou ak plis fòs. Gen gwo danje nan sa. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou tout kalte aleji (pa tèlman grav; rav; grav anpil) oswa demanjezon: bwè 25mg, 3 oubyen 4 fwa pa jou, daprè jan n santi n Pou pwoblèm somèy: pran 25 mg, pou pi piti, 50 mg, pou pi plis, lè n pral dòmi Pou endispozisyon aleji lakòz: yon piki 50 mg nan misk. Si sa nesesè, nou gen dwa pran yon lòt piki apre 8èd tan osnon pi bonè. | Sa nou dwe konnen Pou n ba yon moun piki difenidramin, fòk li fè yon aleji ki grav osnon yon aleji ki fè l endispoze. |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an | Fanm ansent ak fanm k ap bay tete pa dwe sèvi ak medikaman sa a pou yo fè tretman pou aleji, lè tretman sa a ap dire lontan. Moun ki soufri ak opresyon pa dwe sèvi avè l nonplis. | Lòt medikaman ki bon tou Pou aleji: idwoksizin Pou pwòblem somèy: dyazepam |
| Sèfè segondè | Nou gen dwa dòmi je klè epitou bouch nou gen dwa sèch. Kèkfwa, medikaman sa a konn ba moun noze ak vomisman tou. Nan sèten ka, olye medikaman an kalme n, se eksite l ap eksite n. Men sa pa rive anpil fwa. | |

dikloksasillin (Coxacilline, Oxacilline)

Dikloksasillin se yon antibiotik ki soti nan Fanmi Penisilin. Li trete enfeksyon nan tete ak enfeksyon po.

| | | |
|--|--|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Kapsil: 125, 250 oubyen 500 mg Likid: 62,5 mg nan chak 5 ml | Efè segondè  Noze, vomisman, dyare |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè?  | Pou enfeksyon nan tete ak enfeksyon po: pran 250 mg, 4 fwa pa jou, pandan 10 jou. | Avètisman  Siveye pou n wè si moun nan pa p gen pwoblèm alèji osnon si l pa p endispoze akòz alèji |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an  | Moun ki fè alèji ak penisilin | Lòt medikaman ki bon tou Pou enfeksyon nan tete oswa enfeksyon po: amoksisilin, sefaleksin, eritwomisin |

doksisiklin (Apo-doxycilline, Dox, Doxicap)



Doksisiklin se yon antibiotik ki soti nan Fanmi Tetrasiklin. Yo trete divès kalte enfeksyon avè l – ladan yo: kèk MST, enfeksyon nan basen, enfeksyon apre avòtman, ak kèk lòt ankò. Yo itilize doksisiklin nan plas tetrasiklin.

| | | |
|---|---|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Grenn: 50 ak 100 mg | Efè segondè  Dyare oubyen lestomak deranje. Ti bouton gen dwa leve tou sou yon seri moun, lè yo fin fè anpil tan nan solèy. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè?  | Lè MST fè n ap bay vye dlo nan vajen: bwè 100 mg, 2 fwa pa jou, pandan 7 jou (fòk nou pran lòt medikaman tou, gade nan paj 266). Pou sifilis ki fèk parèt: bwè 100 mg, 2 fwa pa jou, pandan 15 jou. Pou sifilis ki sou nou depi lontan: bwè 100 mg, 2 fwa pa jou, pandan 28 jou. Pou Maladi Enflamasyon nan Basen oswa enfeksyon apre eksizyon: Bwè 100 mg, 2 fwa pa jou, pandan 10 jou (pou Maladi Enflamasyon nan Basen, fòk nou pran lòt medikaman tou, gade nan paj 278). | Avètisman  Pa pran doksisiklin, lè n ansent ak lè n ap bay tete. Si medikaman an la lontan oubyen tou si dat ekspirasyon l pase, nou pa dwe sèvi avè l. Yon lòt bò, nou pa dwe bwè doksisiklin ak pwodui ki fèt ak lèt, nou pa dwe bwè l ak antasid |
| Pou risk MST anvan avòtman, oswa pou prevansyon kont enfeksyon apre avòtman: 100 mg, 2 fwa pa jou, pandan 5 jou Pou enfeksyon apre avòtman: bwè 100 mg, 2 fwa pa jou, pandan 10 jou (pran lòt medikaman tou, gade nan paj 255, 256, 257) | Sa nou dwe konnen  Fòk nou pa al kouche touswit apre n fin bwè doksisiklin. Si n déjà kouche, se pou n leve chita, lè n ap bwè grenn yo epitou fòk nou bwè yo ak anpil dlo, pou n ka bare wout pwoblèm iritasyon. | Lòt medikaman ki bon tou Pou sifilis: benzatin penisilin Pou gonore: ko-trimoksazol Pou klamidyaz: eritwomisin Pou prevansyon kont enfeksyon apre avòtman: amoksisilin Pou enfeksyon apre avòtman: gade nan paj 255, 256, 257 Pou enfeksyon apre eksizyon: eritwomisin |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman  | Fann ansent, k ap bay tete ak timoun ki pa ko gen 8 an. Doksisiklin ka atake dan ak zo ti bebe oswa dan ak zo timoun ki pi gran yo. | |

| ègometrin maleyat, metilègonovin maleyat | | (Ergonovin, Ergotrate, Methergine) |
|---|---|---|
| <p>ègometrin se yon medikaman ki fè matris nou ak vesò sangen nou yo kontrakte. Yo itilize l pou yo met kontwòl sou gwo pwoblèm emoraji apre akouchman oubyen avòtman. Ègometrin ak metilègovin se menm medikaman an. Lè yon fanm fin pran medikaman sa a, fòk li jwenn konkou doktè touswit.</p> | | |
| Sou ki fòm medikaman an vini |  <p>Gren: 0.2 mg Piki: 0.2, 0.25 ak 0.5 mg nan yon anpoul 1 ml</p> |  <p>Pa itilize medikaman an pou n fè tranche kòmanse osnon pou n fè fanm travay pi vit. Toutotan ti bebe a ak plasennta a pa ko soti, nou pa dwe ba manman an ègometrin.</p> |
| Ki dòz? | Pou gwo emoraji apre akouchman: se pou n ba fanm nan yon piki 0.5 mg nan misk oubyen se pou n fè 1 bwè 1 gress (0.2 mg) ant 4 ak 6 fwa pa jou. Men fanm ègometrin, toutotan plasennta a po ko soti. | Avètisman |
| Konbyen fwa? | | Sa nou dwe konnen |
| Kilè? | |  <p>Pa eseye pran ègometrin pou n ka jete pitit. Anvan avòtman an fèt, nou gen dwa pèdi lavi n. (Pou kesyon avòtman, ale nan chapit 15).</p> |
| Pou gwo emoraji konplikasyon nan avòtman lakòz: Ba fanm nan yon misk. Apre sa, pandan 24 trèd tan, se pou n ba 1 yon gress 0.2 mg oswa yon piki 0.1 mg, chak 4 trèd tan. | | Lòt medikaman ki bon tou |
| Efè segondè |  <p>Noze, vomisman, vètij. Fanm nan ka swe anpil tou.</p> | oksitosen |

| epinefrin oswa adrenalin (Adrenaline, Ephedrine, Epinephrine) | | |
|--|--|---|
| <p>Se menm medikaman an ki gen 2 non: epinefrin ak adrenalin. Li trete pwoblèm endispozisyon alèji lakòz, tankou pa egzanp, lè penisilin fè yon moun endispoze. Li ka soulaje moun ki gen gwo atak opresyon tou.</p> | | |
| Sou ki fòm medikaman an vini |  <p>Anpoul pou piki: 1 mg nan chak mililit</p> |  <p>Pa janm depase dòz la. Evite bay piki a nan dèyè. Se nan bra pou n bay li.</p> |
| Ki dòz? | Pou opresyon, tout kalte alèji (pa tèlman grav; grav anpil) ak endispozisyon alèji lakòz: yon piki $\frac{1}{2}$ mg (1/2 ml) nan bout anwo bra. Se yon piki anba po, se pa yon piki nan misk. Si sa nesesè, moun nan gen dwa pran yon dezyèm dòz nan 20-30 minit ak yon 3 ^{ème} dòz, 20-30 minit apre 2 ^{ème} lòt medikaman tou, gade nan paj 541). | Avètisman |
| Konbyen fwa? | | Sa nou dwe konnen |
| Kilè? | |  <p>Anvan n fè piki a, se pou n kontwole "pou" moun nan. Pa ba 1 plis pase 3 dòz. Si, apre premye piki a, "pou" moun nan fè plis pase 30 batman chak minit, nou pa dwe ba 1 lòt piki yo.</p> |
| Efè segondè |  <p>Malad gen dwa santi 1 pè, li gen dwa ajite, li gen dwa ennève, li gen dwa sou tansyon. Li ka gen maltèt ak vètij tou. Yon lòt bò, kè 1 gen dwa bat pi vit.</p> |  <p>Tansyon nou ap monte, kè n ap bat vit epitou nou ka fè nenpòt aksidan serebral (estomak)</p> |

eritwomisin (Erythrocin, Eriped)

Eritwomisin se yon antibiotik ki soti nan Fanmi Makwolid. Li ka trete anil enfeksyon – ladan yo: kèk MST, enfeksyon respiratwa ak enfeksyon po. Nou ka sèvi avè l san pwoblèm pandan gwochè. N ap jwenn li anpiil kote.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Grenn oubyen kapsil: 250 mg Pomad: 1 % Poud pou n fè melanj: 125 mg nan chak 5 ml | Ki moun ki pa de pran medikaman an |  Moun ki fè alèji ak antibiotik ki nan Fanmi Makwolid yo |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou enfeksyon nan vesi oubyen klamidyaz: bwè 500 mg, 4 fwa pa jou, pandan 7 jou (gade nan paj 277, n ap wè ki medikaman pou n mete ansanm pou n trete pwoblèm vajen k ap bay vye dlo, akòz MST). Pou enfeksyon nan tete, Maladi Enflamasyon nan Basen oswa enfeksyon apre eksizyon: bwè 500 mg, 4 fwa pa jou, pandan 10 jou (gade nan paj 278, n ap wè ki medikaman pou n mete ansanm pou n trete Maladi Enflamasyon nan Basen) Pou chank oswa enfeksyon po: bwè 500 mg, 3 fwa pa jou, pandan 7 jou (fòk nou pran lòt medikaman tou, gade nan paj 269) Nou vle trete bouton-maleng nan pati entim nou, men nou fè alèji ak penisilin: bwè 500 mg, 3 fwa pa jou, pandan 15 jou Pou sifilis ki fèk parèt: bwè 500 mg, 4 fwa pa jou, pandan 15 jou Pou bouton-maleng klamidyaz ban nou nan pati entim: bwè 500 mg, 4 fwa pa jou, pandan 21 jou Pou n pran swen je ti bebe ki fèk fèt: pase pomad eritwomisin 1 %, yon sèl fwa | Efè segondè  Lestomak deranje, noze, vomisman, dyare | |
| | | Sa nou dwe konnen  Eritwomisin ap bay pi bon rezulta si n pran l inèd tan anvan n manje oswa 2 zèd tan apre n fin manje. Si lestomak nou deranje, se pou n pran ti moso manje, lè n ap bwè medikaman an. Pa kraze grenn yo. Anpil grenn kouvri ak yon pwotè ki anpeche likid nan lestomak nou atake yo, anvan yo kòmanse fè travay yo. | |
| | | Lòt medikaman ki bon tou Pou enfeksyon nan tete: amoksilin, sefaleksin, diklokasisilin Pou enfeksyon nan vesi: anpisisilin, ko-trimoksazòl Pou enfeksyon apre eksizyon: doksisiklin Pou MST: gade nan paj 277 ak 278, n ap wè ki medikaman pou n mete ansanm pou n trete MST Pou n pran swen je ti bebe ki fèk fèt: pomad tetrasiklin | |

estreptomisin (Streptomycin)



Estreptomisin se yon antibiotik ki soti nan Fanmi Aminoglikozid yo. Li bon pou tibèkiloz. Se ak piki nan misk sèman yo bay li. Pou fè tretman tibèkiloz, yo mete l ansanm ak lòt medikaman. Gade nan chapit 25.

| | | |
|---|--|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Likid pou piki: 400 mg nan chak mililit | Efè segondè  Estreptomisin ka deranje tande nou. Li ka fè n pèdi ekilib epitou li gen dwa yon bann ti bouton leve sou nou. |
| Ki dòz? Koubyen fwa? Kilè? | Dòz ki trete tibèkiloz nan yon zòn gen dwa pa ka trete l nan yon lòt zòn. Pou plis enfòmasyon, al wè yon travayè (z) sante. (Se pou n pran estreptomisin nan ansanm ak lòt medikaman, gade nan paj 389). | Sa nou dwe konnen  Toujou mete gan, si n sèvi ak estreptomisin anpil fwa. Si se pa sa, li gen dwa atake po nou. Li enpòtan pou malad yo suiv tretman tibèkiloz la nèt. Si se pa sa, y ap toujou ka kontamine lòt moun. |
| Kilès ki pa ka pran medikaman an | Fanm ansent pa dwe pran estreptomisin: li ka fè ti bebe a soud. Moun ki fè alèji ak antibiotik ki nan Fanmi Aminoglikozid yo pa dwe pran l nonplis. Moun ki gen pwoblèm ren dwe pran anpil prekosoyon, lè y ap pran estreptomisin. | |

estwojèn (etinil estradyòl, mestranòl, Premarin, Prempack)



Se estwojèn sou fòm chimik ki nan grenn planin ak piki planin. Estwojèn s a se menm bagay li ye ak òmòn estwojèn kò fanm fè poukont li. Estwojèn ka trete fanm k ap bay san yon jan ki pa nòmal ak fanm ki gen pwoblèm menopoz, sètadi, fanm ki gen pwoblèm, lè yo " arete " (ale nan chapit 8). Pou plis enfòmasyon, ale nan pati sila yo ki detaye kesyon grenn planin ak metòd planin dijans yo (gade chapit 13 ak paj 517, 518, 519, 520).

etanmbitòl (Dexambutol, EMB, Myambutol)

Yo itilize etanmbitòl nan tretman tibèkilòz, sitou nan zòn kote medikaman ki te konn trete TB yo vin twò fèb. Pou yo fè tretman an, yo mete etanmbitòl la ansanm ak lòt medikaman. Ale nan chapit 25.

| | | | |
|---|---|--|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Grenn: 100 oubyen 400 mg vini | Efè segondè  | Anpil fwa, etanmbitòl ka anpeche n wè byen nan youn osnon nan tou 2 je n. nou gen dwa wè gwo tach oswa gwo "twou" nwa. Men alòske, yon fwa n sispann pran medikaman an, sentòm sa yo ap disparèt. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  Dòz ki trete tibèkiloz nan yon zòn gen dwa pa ka trete maladi a nan yon lòt zòn. Nou dwe al wè yon travayè (z) sante, pou n ka konn ki dòz ki bon nan zòn kote n ap viv la. (Fòk nou pran etanmbitòl la ansanm ak lòt medikaman, gade nan paj 389). | Sa nou dwe konnen  | Li empòtan pou n fin suiv tretman tibèkiloz la nèt, menmsi l ap dire yon ane. Si se pa sa, nou gen dwa enfekte lòt moun. |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an |  Moun ki gen pwoblèm grav nan je – ladan yo: katarat – ak moun ki gen pwoblèm grav nan ren. | | |

ibipwofèn (Advil, Doli-stop, Motrin, Nuprin, ak lòt)

prekosyon



Ibipwofèn se yon medikaman ki konbat doulè, enflamasyon ak lafyèv. Li bon anpil pou doulè règ. Moun k ap soufri ak atwoz ak moun k ap soufri ak SIDA ka itilize l tou, lè yo gen pwoblèm doulè.

| | | | |
|---|---|--|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Grenn: 200 mg ak lòt ki gen plis pwa tou Likid: 100 mg nan chak 5 ml | Avètisman  | Pa bwè ibipwofèn, lè n pral fè osnon lè n fèk fin fè operasyon, sètadi, fòk nou pa pran ibipwofèn pandan semèn operasyon an. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  Bwè ant 200 ak 400 mg, 4 fwa pa jou, pou pi piti, 6 fwa pa jou, pou pi plis. Pa bwè plis pase 2400 mg nan yon jounen. | Sa nou dwe konnen  | Ibipwofèn ap bay pi bon rezulta, si n bwè l pandan n ap manje, sitou si se ak pwodui ki fèt ak lèt nou pran l. |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an |  Moun ki soufri ak ilsè nan lestomak, ansanm ak fanm ansezt, pandan 3 dènye mwa gwosès yo. | Lòt medikaman ki bon tou | Pou doulè, enflamasyon ak lafyèv: aspirin Pou doulè ak lafyèv: asetaminofèn Pou gwo gwo doulè: kodeyin, mòfin |
| Efè segondè |  Ibipwofèn gen dwa deranje lestomak nou. Li ka ban n doulè nan lestomak tou. | | |

idwokòtizon oswa kòtozòl (Cortaid, Solu-Cortef, lòt)



Idwokòtizòn se yon krèm (pou po) ki konbat enflamasyon ak demanjezon. Li konbat bouton ak boul ki leve sou po moun epitou li bon pou emowyid. Piki idwokòtizòn ak grenn idwokòtizòn bon anpil pou moun ki endispoze akòz alèji.

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Krèm oswa pomad: 1 % Grenn: 5, 10, ak 20 mg Likid pou piki ak poud nan ka melanje pou n fè piki : gen plizyè kalte e chak gen fòs pa yo |  | Avètismen Lè n fin pase krèm nan, nou pa dwe kouvrì l ak okenn pansman. Fanm ansent ak fanm k ap bay tete dwe reflechi anpil anvan yo bwè grenn yo, men yo gen dwa sèvi ak krèm nan san pwoblèm. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? kilè | Pou bouton (osnon boul) ki leve sou po moun, demanjezon oubyen emowyid: pase krèm nan sou po n, 3 oswwa 4 fwa pa jou. |  | Lè dòz nou pran an twò fò Tansyon n gen dwa monte epitou nou gen dwa pipi pi anpil fwa pase jan n konn abitye pipi. |
| Efè segondè | Pou endispozisyon alèji lakòz: yon piki 500 mg nan misk. Si sa nesesè, moun nan gen dwa pran yon lòt piki nan 4 trèd tan (se pou 1 pran lòt medikaman tou, gade nan paj 541). Si sentòm yo tounen ankò, se pou 1 bwè grenn) ant 500 ak 1000 mg. Li gen dwa bwè grenn yo yon fwa ankò, si sa nesesè. Efè segondè  Si n sèvi ak krèm nan pandan plis pase 10 jou, po nou gen dwa dekale. Nou ka rete ak mak sou po n tou. | | Lòt medikaman ki bon tou Pou endispozisyon alèji lakòz: deksametazòn Pou alèji oswa demanjezon: difenidramin |

idwoksizin (Apo-hydroxyzine)



Idwoksizin se youn nan medikaman ki rele anti-istaminik yo. Li bon pou alèji ak demanjezon. Pafwa tou, yo itilize l pou konbat noze, vomisman ak anksyete.

| | | |
|--|---|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Grenn: 25,50 oswa 100 mg Likid pou piki: 25 oswa 50 mg | Efè segondè  Medikaman an ka fè bouch nou sèch, li ka fè n dòmi je klè epitou li ka fè n pa gen apeti |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou demanjezon: bwè 25 mg, pou pi pití, 50 mg, pou pi plis, 3 osnon 4 fwa pa jou Pou konbat anksyete: bwè 25 mg, pou pi pití, 50 mg, pou pi plis, 4 fwa pa jou. Pou alèji (kit se alèji ki pa twò grav, ki se alèji ki fè moun endispoze): yon piki nan misk, 25 mg pou timoun, 50 mg pou granmoun (se pou moun nan pran lòt medikaman tou, gade nan paj 541). | Lè dòz nou pran an twò fò  Nou gen dwa tonbe dòmi je klè |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an | Fannm ansent pa dwe pran medikaman sa a, pandan 3 premye mwa gwo sès, rive nan moman kote timoun nan sevre, pou yon fannm sèvi ak idwoksizin, se sèl si 1 pa fè lòt jan. Nou pa dwe pran medikaman an nonplis, si n vle rete veyatif pandan yon tan. | Lòt medikaman ki bon tou Pou demanjezon, alèji oswa endispozisyon alèji lakòz: difenidramin, pwometazin Pou anksyete: dyazepam |

izoniyazid (INH, isonicotinic acid hydrazide)

Yo mete Izonyazid ansanm ak lòt medikaman pou yo trete tibèkiloz. Gade nan chapit 25

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  | Grenn: 100 oswa 300 mg Siwo: 50 mg nan chak 5 ml | Efè segondè  | Doulè oswa angoudisman nan bra ak nan janm. Pafwa, malad ki pran Izonyazid gen dwa fè yon epatit ki grav anpil. Sentòm pwoblèm sa a se fatig, mank apeti, noze, vomisman, pipi fonse. Je moun nan gen dwa vin jòn tou. Si sa rive, se pou n sispann pran medikaman an la pou la. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  | Dòz ki trete tibèkiloz nan yon zòn gen dwa pa ka trete l nan yon lòt zòn. Pou n ka konn ki dòz ki bon nan zòn kote n ap viv la, se pou n pale ak yon travayè (z) sante. (Nou dwe pran izonyazid ansanm ak lòt medikaman, gade nan paj 389). | Sa nou dwe konnen  | Pa janm pran 300 mg nan yon jounen. Li enpòtan pou n fin suiv tretman tibèkiloz la nèt, dekwa pou n pa enfekte lòt moun. |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an |  | Moun ki gen epatit, Moun ki soufri ak maladi fwa ak moun ki te déjà fè eksperyans pwoblèm nan fwa, apre yo te fin pran medikaman an yon premye fwa. | Lè dòz nou pran an twò fò  | Nou ka gen noze, vomisman, vètij, difikilte pou n pale klè. Nou gen dwa wè twoub tou. Si sa rive n, se pou n prawn 1 g piridoksin (vitamin B6) |

jenntamisin (Garamycin, Gentamycin)

Prekosyon



| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  | Anpoul pou pik: 10 oubyen 40 mg nan chak mililit | Avètismen  | Si n gen pwoblèm pou n tande osnon tou si zòrèy nou kòmanse kònen, se pou n sèvi ak yon lòt antibiotik. Lè n ap pran jenntamisin, se pou n pran anpil likid tou. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  | Pou gwo enfeksyon apre avòtman: piki nan misk. Se pwa moun nan k ap fè n konnen ki kantite jenntamisin n ap ba li. Fòk nou mete 5 mg pou chak kilo. Si fanm nan peze 60 kg, se pou n ba 1 300 mg, chak jou, pandan 5 jou, pou pi piti, 7 jou pou pi plis. Nou dwe divize dòz la an 3 pati (maten, apremidi, awè). Oubyen tou, nou gen dwa suiv preskripsyon sa a: yon piki 80 mg, 3 fwa pa jou, pandan 5-7 jou (se pou n fè fanm nanpran lòt medikaman tou). | Sa nou dwe konnen  | Akòz efè segondè grav medikaman sa a genyen epitou akòz tout difikilte n ap genyen pou n kalkile dòz ki bon an, nou pa dwe sèvi ak jenntamisin, si n ka jwenn antibiotik ki gen mwens danje yo. |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an |  | Fanm ansent ak moun ki gen pwoblèm ren dwe pran anpil prekosyon, si jamè y ap pran medikaman sa a. Si n fè alèji ak lòt antibiotik ki nan Fanmi Aminoglikozid yo, nou pa dwe pran jenntamisin. | Lè dòz nou pran an twò fò  | Zòrèy nou gen dwa kònen epitou nou ka gen difikilte pou n tande. Nou ka gen pwoblèm nan ren tou. |
| Efè segondè |  | Jenntamisin ka atake ren nou epi li ka fè n soud tou. | Pou gwo enfeksyon: sefiksim, seftriyaksòn, kanamisen Pou enfeksyon nan ren: amoksisilin, anpisilin, nòflaksasen | |

kanamisin (Kantrex)



Kanamisin se yon antibiotik ki fò anpil. Li soti nan Fanmi Aminoglikozid yo. Li trete gonore ak kèk lòt enfeksyon grav. Se sèl si n pa rive jwenn antibiotik ki gen mwens danje, pou n pran kanamisin.

| | | |
|--|--|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Anpoul pou piki: 75, 500 oswa 1000 mg  Poud nou ka melanje pou n fè piki: 1 g nan chak 2 ml Grenn: 500 mg | Avètisman  Se pou n ba malad la yon lòt kalte medikaman pito, si l kòmanse gen difikilte pou 1 tande osnon si zòrèy li kòmanse kònен. Moun dwe bwè anpil likid ak medikaman an. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou enfeksyon grav: Se pwa fanm konnen ki kantite kanamisin n ap ba li. Nou dwe mete 15 mg pou chak kilo moun nan peze. Konsa, si 1 peze 50 kilo, li dwe pran 750 mg. Se pou n ba l mwatye dòz la nan maten epi lòt mwatye dòz la nan maten epi lòt mwatye a nan aswè. Kidonk, piki nan misk, 2 fwa pa jou, pandan 5 a 7 jou. Oubyen tou, nou gen swiv preskrisyon sa a: piki 500 mg nam misk, 2 fwa pa jou, pandan 5 a 7 jou. Pou gonore: piki 2 g nan misk, 2 fwa pa jou, yon sèl kou, yon sèl fwa. | Sa nou dwe konnen  Kòm kanamisin gen efè segondè ki grav epitou kòm nou ka gen difikilte pou n kalkile dòz ki bon an, nou pa dwe ba moun medikaman konsa, si w ka jwenn antibiotik ki gen mwens danje. |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an | Fann ansent ak moun ki gen pwoblèm nan ren.  Moun ki fè alèji ak lòt antibiotik ki nan Fanmi Aminoglikozid yo | Ki moun ki pa dwe pran medikaman  Zòrèy nou gen dwa kònен, epitou nou gen dwa gen difikilte pou n tande. Nou ka gen pwoblèm nan ren tou. |
| Efè segondè |  Medikaman sa a ka atake ren nou epitou li gen dwa fè n soud | Lòt medikaman ki bon tou Pou enfeksyon grav oubyen gonore: sefiksim, sefriyaksòn, nöflaksen. |

ketokonazòl (Mycoster)



Ketokonazòl se yon medikaman ki konbat chanpion. Li fò anpil. Li trete chanklèt ak kèk lòt enfeksyon chanpion bay. Se sèl moun ki gen SIDA ki dwe sèvi ak medikaman sa a, lè yo pa ka jwenn soulajman ak lòt medikaman. Ketokonazòl chè anpil epitou nou ka gen difikilte pou n jwenn li.

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Grenn: 200 mg  Li vini sou fòm krèm (pou po) ak champou tou: 2 % | Avètisman  Fanm ansent ak fann k ap bay tete dwe pran prekosyon yo, lè y ap sèvi ak medikaman an. Ni krèm lan, ni champou a pa fèt pou vajen. Nou dwe bwè medikaman an pandan n ap manje. Grenn yo ka fè lestomak nou cho, si n bwè bweson tou. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou chanpion, alòske: bwè 200 mg, yon fwa pa jou, pandan 10 jou. Pou chanpion nan bouch (chanklèt): bwè 200 mg, 2 fwa pa jou, pandan 14 jou. | Sa nou dwe konnen  Ketokonazòl bay pi bon rezulta, lè malad la pran l ak ji zoranj osnon ji ki fèt ak lòt fwi tankou sitwon, chadèk, mandarin e latriye. |
| Efè segondè |  Noze, vomisman | Lòt medikaman ki bon tou Pou malad ki gen chanpion men ki pa gen okenn MST: nistaten, klotrimazòl. |

kloramfenikòl (Chloramex, Chloromycetin)



Kloramfenikòl se yon antibiotik ki fò anpil. Yo itilize l nan tretman enfeksyon grav apre akouchman, fos kouch oubyen avòtman. Se sèl lè antibiotik ki gen mwens danje yo pa bay rezulta osnon lè mòd antibiotik sa yo ka bay pwoblèm, pou moun pran kloramfenikòl. Lè ti bebe yo malad nou je, nou gen dwa sèvi ak pomad kloramfenikòl pou n trete yo, si n pa jwenn pomad tetrasiklin oubyen pomad eritwomisin.

| | | | |
|--|--|--|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini | <p>Kapsil : 250 mg Likid : 150 mg nan chak 5 ml Poud nou ka melanje pou n fè piki : 1 gram Pomad : 1 % Likid pou je : 0,5</p> | | <p>Avètisman Si n kapab, se pou n pran lòt antibiotik pito. Gen danje pou malad ki pran kloramfenikòl gen pwoblèm san. Sèten malad ka menm pèdi lavi yo.</p> |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | <p>Pou enfeksyon apre akouchman: bwè 1 gram, yon sèl kou, yon sèl fwa. Apre sa, n ap gen pou n bwè 500 mg, 4 fwa pa jou, pandan 7 jou (sèvi ak lòt medikaman tou, gade nan paj 97).</p> <p>Pou enfeksyon apre avòtman: Piki 1 gram nan venn, 4 fwa pa jou (sèvi ak lòt medikaman tou, gade nan paj 257)</p> <p>Pou je ti bebe: mete yon tikras pomad nan je a, lè timoun nan fèt.</p> | | <p>Sa nou dwe konnen Lè enfeksyon an grav. Nou dwe pran kloramfenikòl ansannm ak 10 milyon Inite benzil penisilin</p> |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an | <p>Efè segondè Kloramfenikòl ka deranje lestomak moun. Nou ka gen difikilte pou n wè nan je n, lè n sèvi avè l.</p> | | <p>Lè dòz nou pran an twò fò Ti krik, ti krak, nou gen dwa bay san; nenpòt ti zòbòy nou pran, san nou gen dwa kaye; epitou nou ka gen difikilte pou n wè byen.</p> |
| Lòt medikaman ki bon tou | <p>Pou enfeksyon grav: apre akouchman, gade nan paj 97 apre avòtman, gde nan paj 257</p> <p>pou n trete ti bebe ki malad nan je: pomad tetrasiklin ak pomad eritwomisin pi bon pase kloramfenikòl</p> | | |

klotrimazòl (Canesten, Lotrimin)

Ak klotrimazòl, yo trete pwoblèm chanpiyon nan vajen, nan bouch oswa nan göj.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini | <p>Ovil: 100 oubyen 500 mg Krèm: 1 % Pastiy (menm fòm ak valda: 10 mg)</p> | | <p>Efè segondè Medikaman an gen dwa (yon ti jan) boule n osnon tou li ka ban n demanjezon. Nou ka gen noze oubyen vomisman, si se nan bouch nou pran l</p> |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | <p>Pou chanpiyon nan vajen: Ovil: Mete yon oivil 5000 mg nan vajen nou, lè n pral dòmi. Fè sa yon sèl fwa, oubyen, mete yon oivil 100 mg nan vajen nou, chak swa, pandan 3 jou.</p> <p>Krèm: Mete 5 gram krèm nan vajen nou, chak swa, pandan 7 jou, pou piti, 14 jou, pou pi plis. Fè sa, lè n pral dòmi.</p> <p>Pou chanpiyon nan bouck ak nan göj: souse yon pastiy 10 mg, 5 fwa pa jou, pandan 14 jou.</p> | | <p>Avètisman Si n santi vajen nou boule n, lè n sèvi ak klotrimazòl, nou pa dwe kontinye mete l. Fè 3-4 jou san n pa al nan rapò seksyèl, pou n pa kontamine patnè a.</p> |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman a | <p>Sa nou dwe konnen Dòz ki pi gwo a, sètadi dòz nou pran yon sèl fwa a pi bon pou fanm ansent</p> | | <p>Lòt medikaman ki bon tou Pou chanpiyon: nistaten, mikonazòl, vyolèt jennsan oubyen vinèg. Pou moun ki gen SIDA yo: ketakonazòl</p> |

kodeyin (Tussex)



Kodeyin se yon medikaman pou doulè soti nan fanmi Opyase yo (sonje opyòm). Se yon kalman (li fè moun kalma, li fè moun dòmi). Li konbat tous tou. Men se sèl si n gen yon tous ki grav anpil pou n pran kodeyin. Lè sa a tou, fòk nou trete pwoblèm ki ban n tous la. Se sèl lè medikaman ki mwen fò yo pa bay rezulta pou n pran kodeyin.

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Likid: 15 mg nan chak ml Grenn: 15, 30 oswa 60 mg | Lè dòz nou pran an twò fò | Nou gen dwa dòmi je klè; nou gen dwa santi laperèz anvayi n; nou gen dwa antre nan konsa |
| Ki dòz? | Pou tous: 7 mg, pou pi piti, 15 mg, pou pi plis, 4 fwa pa Konbyen fwa? jou. Se sèl lè n santi n bezwen remèd, pou n pran 1. | Tretman pou n suiv, lè dòz la twò fò | Nou ka pran yon piki Nalokson (Narcan). Men fòk nou kouri al wè doktè tou. |
| Kilè? | Pou gwo doulè: 30 mg, pou pi piti, 60 mg, pou pi plis, 4 a 6 fwa pa jou. Se pou n pran remèd la, lè n santi n bezwen l. | | |
| Efè segondè | Konstipasyon (difilikte pou n fè tata). Pandan yon tan, nou ka gen difilikte pou n fè pipi tou. Nou ka gen noze, vomisman, demanjezon ak maltèt tou. | Lòt medikaman ki bon tou | Pou doulè: asetaminofén, aspirin, ibipwofén Pou gwo doulè: mòfin Pou tous: bwè anpil dlo, sèvi ak ti siwo nou fè poukont nou (gade nan paj 303) |
| Sa nou dwe konnen | Lè n kòmanse pran kodeyin, nou gen dwa santi n bezwen pran l toutan (yo rele sa depandans). Si n kontinye bwè l san rete pandan yon bon ti tan (plis pase dezoutwa jou), n ap oblige ogmante dòz la chak fwa, pou n ka jwenn rezulta. | | |

ko-trimoksazòl = trimetwopim + silfametwoksazòl

Prekosyon



(Bactrim, Nopril, Septra, Sulfatrim, TMP/SMX, lòt)

Pou yo fè ko-trimoksazòl, se 2 antibiotik yo mete ansanm (gen youn ladan yo ki soti nan Fanmi Silfa). Medikaman sa a trete enfeksyon nan vesi ak enfeksyon nan ren plis pwoblèm fanm k ap bay vye dlo nan vajen paske yo gen gonore oswa chank. Yon lòt bò, li ka anpeche moun k ap soufri ak SIDA yo gen dyare ak nemoni.

| | | | |
|--|--|--|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Grenn: 120 mg (20 mg trimetoprin + 100 mg silfametoksazòl) 480 mg (80 mg trimetoprim + 400 mg silfametoksazòl), ak 960 mg (160 mg trimetoprim + 800 mg silfametoksazòl) Likid: 240 mg (40 mg trim. + 200 mg silfametoksazòl) nan chak 5 ml | Ki moun ki pa dwe pran medikaman a | Fanm ansent, pandan 3 dènye mwa gwochè yo. Nou pa dwe pran medikaman an nonplis, si n fè alèji ak antibiotik nan Fanmi Silfa yo |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou enfeksyon nan vesi: bwè 4 grenn 480 mg, yon sèl kou, yon sèl fwa. Pou enfeksyon nan ren: bwè 2 grenn 480 mg, 2 fwa pa jou, pandan 10 jou. Lè MST lakòz n ap bay vye dlo nan vajen: bwè 10 grenn 480 mg, yon fwa pa jou, pandan 3 jou (gade nan paj 266 pou n wè ki medikaman pou n mete ansanm, pou n trete MST). | Effè segondè | Sispann pran ko-trimoksazòl, si n gen pwoblèm alèji, tankou pa egzanp, demanjezon oubyen ti bouton. Medikaman sa a ka ban n noze ak vomisman tou. |
| Pou ampeche moun k ap soufri ak SIDA yo gen dyare ak nemoni: se pou n fè yo bwè yon grenn 480 mg chak jou osnon 2 grenn 480 mg, 2 fwa pa semèn. | Lè dòz nou pran an twò fò | Avètisman | Bwè anpil dlo. |
| Lè moun k ap soufri ak SIDA yo gen dyare ak tras san oubyen nemoni: se pou n fè yo bwè 2 grenn 480 mg, 2 fwa pa jou, pandan 10 jou. | Pou enfeksyon nan vesi ak nan ren: medikaman ki amoksisilin, nitwofirantoin, nòffloksasen bon tou Pou gonore: seftriyaksòn, kanamisen, nòffloksasen | Noze, vomisman, dyare, latwoublay nan lespri n. | Nou gen dwa swe anpil tou. |
| Pou Maladi Enflamasyon nan Basen osnon chank: Bwè 5 grenn 480 mg, 2 fwa pa jou, pandan 3 jou; si dòz sa a ban n noze, se pou n fè 2 grenn 480 mg, 2 fwa pa jou pandan 7 jou (gade nan paj 278 pou n wè ki medikaman pou n mete ansanm pou n trete MST). | Pou Maladi Enflamasyon nan Basen: gade gwoup medikaman yo nan paj 278 Lè moun k ap soufri ak SIDA yo gen dyare: nòffloksasen, metwonidazòl | | |

metil ègonovin (Methergine)

Prekosyon

Metil ègonovin se yon medikaman ki ede matris nou ak vesò sangen yo kontrakte. Li bon pou fanm ki gen gwo emoraji apre akouchman. Metil ègonovin, ègometrin ak ègonovin se menm medikaman an. Gade ègometrin, paj 497.

metwonidazòl (Amizol, Flagyl, Metrogyl)

Prekosyon



Metwonidazòl trete enfeksyon champion oswa trikomonas ba fanm nan vajen. Li konbat kèk bakteri ak disantri amibyèn tou (pou plis enfòmasyon, ale nan liv ki rele "kote ki pa gen doktè" a).

| | | | |
|---|---|--|--|
| Sou ki fòm medikaman an vin | Grenn: 200, 250, 400 oswa 500 mg Ovil: 500 mg Pou piki nan venn: 500 mg nan chak 100 ml | Ki moun ki pa dwe pran medikaman an | Moun ki gen pwoblèm nan fwa, tankou pa egzanz, lajònus |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou Maladi Enflamasyon nan Basen oswa enfeksyon apre akouchman: Bwè 500 mg, 2 fwa pa jou, pandan 10 jou (pran 1 ansanm ak lòt medikaman tou; pou maladi enflamasyon nan basen, gade nan paj 273 ak 278; pou enfeksyon apre akouchman, gade nan paj 97). | Efè segondè | Pipi fonse, lestomak deranje oswa noze, epi malèt. Malad la ka gen yon vye gou feray nan bouch li tou. |
| | Pou ti enfeksyon nan vajen: Mete yon ovil 500 mg nan vajen nan, 2 fwa pa jou, pandan 10 jou. | Avètisman | Nou dwe sispann pran medikaman an san pèdi tan, si n santi kò nou ap angoudi. Nou pa dwe pran metwonidazòl, padnan 3 premye mwa gwo-sès nou. Si n oblige sèvi ak gwo-sès la, nou pa dwe pran gwo dòz yon sèl kou a. Men se dòz sa a k ap pi bon pou nou, si n ap bay tete. |
| Pou trikomonaz, champion ak vajinoz bakteryèn: | si n pa ansent, se pou n bwè 1 g yon sèl kou. Men si n ansent, nou dwe bwè 400 mg, 2 fwa pa jou, pandan 7 jou (gade nan paj 266 ak 277, n ap wè ki medikaman pou n mete ansanm pou n trete tèt nou, lè n ap bay vye dlo nan vajen, kit nou gen MST, kit nou gen MST, kit nou pa gen MST). | Sa nou dwe konnen | Mari nou oubyen mennaj nou dwe suiv tretman tou. Lè n ap pran metwonidazòl, nou pa dwe bwè bweson. Atò byè nou pa dwe bwè. Si se pa sa, n ap gen gwo noze. |
| Pou gwo enfeksyon apre avòtman: | Bwè 500 mg, 4 fwa pa jou oubyen pran yon piki (1 g) nan venn, 2 fwa pa jou (ale nan paj 256 ak 257, n ap wè ki medikaman yo konseye n mete ansanm pou tretman an). | Lòt medikaman ki bon tou | pou champion ak trikomonas: tinidazòl pou moun ki gen SIDA, lè yo gen pwoblèm dyare: ko-trimoksazòl, nòflaksen |
| Pou dyare ak tras san avèk oswa san lafyèv: | 500 mg, 3 fwa pa jou, pandan 7 jou. | | |

mifepristòn (RU 486)

Mifepristòn se yon medikaman ki pèmèt fanm fè avòtman, lè yo mete 1 ansanm ak mizopwostòl osnon ak lòt medikaman. Se sèl nan kèk pwogram espesyal ki eggiste nan sèten peyi, moun ka jwenn Mifepristòn. Yo ba fanm medikaman sa a nan klinik oswa lopital kote travayè (z) sante ka voye je sou yo epi ba yo laswenyay, sizoka konplikasyon mete pye.

| | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini | | Grenn: 200 mg | Sa nou dwe konnen | Yon fwa fanm nan fin gen latrapn nan vant ak gwo emoraji, avòtman an ap fin fèt nèt, anvan manmzèl gen plis pase 48 èd tan depi 1 pran dezyèm medikaman an. |
| Sou ki fòm medikaman an vini | | Pou avòtman (ak medikaman): 600 mg anvan fanm nan rive sou dezyèm mwa gwo-sès li. Apre 48 èd tan, fòk manmzèl pran yon lòt medikaman, tankou pa egzanz, mizopwostòl (400 mcg). Mizopwostòl la dwe rantre byen fon nan vajen fanm nan. | Lòt medikaman ki bon tou | Si avòtman an pa fèt, y ap oblige fè l ak metòd aspirasyon an osnon ak dilatasyon plis kitaj (gade "Avòtman" nan chapit). |
| Kilès ki pa dwe pran medikaman an | | Fam ki gen plis pase 9 semèn depi yo te gen règ yo pou dènye fwa. | | mizopwostòl |

| mikonazòl (Daktarin, Nizoral) | | Prekosyon |
|---|--|--|
| Mikonazòl se yon medikaman medikaman ki bon pou champion. Li konbat champion nan vajen ak lòt enfeksyon champion lakòz. | | |
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Krèm: 2 % Ovil: 100 ak 200 mg | Efè segondè  Iritasyon |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou champion nan vajen: Krèm: pase 5 g krèm nan vajen nan chak swa, pandan 7 jou. Ovil 100 mg: Mete yon oivil nan vajen nan chak swa, pandan 7 jou. Ovil 200 mg: Mete yon oivil nan vajen nan chak swa, pandan 3 jou. | Avètisman  Si mikonazòl ban n pwoblèm iritasyon, se pou n sispann sèvi avè l la pou la. Eseye fè 3-4 jou san n pa al nan rapò seksyèl, pou n pa kontamine patnè a. Pa kite medikaman an jwenn ak je nou. |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman |  Fann ansent, pandan 3 premye mwa gwosès yo. | Lòt medikaman ki bon tou Pou champion: nistaten, klotrimazòl, Vyolèt Jennsy an oswa ketakonazòl |


| mizopwostòl (Cytotec) | |
|--|--|
| Mizopwostòl se yon medikaman ki bon pou ilsè nan lestimak. Li ka pèmèt fanm fè avòtman tou. Lè fanm ansent pran l, matris yo kontrakte, li bay san epi l pouse pitit la deyò. | |
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Grenn: 100 oswa 200 mcg |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou avòtman ak medikaman: Antre 400 mcg mizopwostòl byen fon nan vajen nou. Si, apre 12 zèd tan, nou pa kòmanse bay san, se pou n repran medikaman an. Si san an pa vini, se pour tann 2 semèn anvan n rekòmanse. |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an |  Fann ki gen plis pase 3 mwa gwosès. Mizopwostòl gen dwa fann matris yo. |
| Efè segondè |  Noze, vomisman, dyare ak maltèt. Si fanm nan ap bay tête, ti bebe a ka gen dyare tou. |
| Avètisman (Atansyon pa kapon)  Pa pran plis pase 400 mcg yon sèl kou, pa repran medikaman an toutotan 12 zèd tan pa ko pase. Si se pa sa, matris nou gen dwa fann. | |
| Sa nou dwe konnen |  Avòtman ki fèt ak mizopwostòl gen dwa dire plizyè èd tan, si se pa plizyè jou memm. Alòske, avòtman an pa jam fin fèt nèt. Yon fwa san an vini, se pou n al wè yon travayè (z) sante ki ka debarase matris nou nèt. |
| Lè dòz nou pran an twò fò |  Nou ka gen gwo doulè amba ti vant ak gwo emoraji. Nou dwe cheche konkou dokte san pèdi tan. |

nistaten (Dermodex, Mysostatin, Nilstat, Nystat)

Nistaten se yon medikaman ki konbat chanpion. Li bon pou enfeksyon chanpion bay moun nan bouch (chanklèt), nan vajen oubyen sou po.

| | | | |
|--|--|---|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Ovil: 100,000 Inite Pastiy: 100,000 Inite Krèm: 100,000 Inite nan chak gram Likid: 100,000 Inite nan chak mililit |  | Avètisman (Atansyon pa kapon) Si nistaten ban nou iritasyon, se pou n sispann sèvi avè l. Pandan 3-4 jou, nou dwe evite al nan rapò seksyèl pou n pa kontamine patnè a. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou chanpion nan bouch oswa nan gòj: souke yon mililit likid byen souke nan bouch la (ni adwat, ni agoch) pandan 1 minit epi vale 1. Fè sa 3 osnon 4 fwa pa jou, pandan 5 jou.  Pou chanpion sou po: Netwaye po a, seche 1 byen seche epi pase krèm nan sou li 3 fwa pa jou. |  | Sa nou dwe konnen Se sèl chanpion ki rele kandida a nistaten konbat, alòske mikonazòl konbat lòt kalte chanpion tou. Kotrimoksazòl koute pi bon mache epitou n ap ka sèvi avè l pi fasil. |
| Pou chanpion nan vajen: | Mete krèm nan vajen nan, 2 fwa pa jou, pandan 10-14 jou; oubyen antre yon ovil 100 000 Inite nan vajen nan, lè n pral dòmi. Fè sa pandan 10-14 jou. | | Lòt medikaman ki bon tou Pou chanpion: mikonazòl, ketokonazòl, klotrimazòl, vinèg oubyen Vyolèt Jennisyan. |
| Lè vajen nou ap bay dlo, alòske nou pa gen MST: | Mete yon ovil 100 000 Inite nan vajen nan chak swa, lè n pral dòmi. Fè sa pandan 7 jou. | | |

nitwofirantwen (Furantoina)



Nitwofirantwoin se yon antibiotik ki trete enfeksyon nan ren ak enfeksyon nan vesi.

| | | | |
|--|---|---|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini? |  Grenn: 25, 50 oswa 100 mg | Efè secondè  | Noze oswa vomisman, epitou maltèt. Yon lòt bò, malad la gen dwa fè anpil van (gaz, pete) |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou enfeksyon nan vesi: 50 mg, 4 fwa pa jou, pandan 7 jou  Pou enfeksyon nan ren: 100 mg, 4 fwa pa jou, pandan 7 jou | Lè dòz nou pran an twò fò:  | N ap gen vomisman ak doulè nan pwatrin. |
| Ki moum ki pa dwe pran medikaman an | Moun ki te deja gen pwoblèm nan ren, anvan yo te trape enfeksyon an. Fanm ki nan dènye mwa gwosè yo. | Lòt medikaman ki bon tou: | Pou enfeksyon nan vesi oswa nan ren: ampisilin, amoksilin, ko-trimoksazòl, eritwomisin, nöfloksasen |

nòflaksasen (Floxy)



Nòflaksasen se yon antibiotik ki soti nan Fanmi kinolòn yo. Li trete gonore, enfeksyon nan vesi oswa nan ren ak gwo pwoblèm dyare.

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Grenn: 400 mg | Efè segondè | Nòfloksasen ka bay moun vètij epitou li gen dwa agrave pwoblèm kafeyin konn bay |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou enfeksyon nan vesi: 1 grenn, 2 fwa pa jou, pandan 3 jou, swa inèd tan anvan n manje, swa 2 zèd tan tan apre n fin manje. Pou enfeksyon nan ren: 1 grenn, 2 fwa pa jou, pandan 10 jou, swa inè d tan fin manje. | | Nou dwe bwè medikaman an ak anpil dlo. Nou pa dwe bwè l, lè n ap pran antasid oswa vitamin ki gen Fè oubyen Zen. Si n santi sentòm alèji, fòk nou sispann pran nòflaksen. |
| Pou maladi enflamasyon nan basen, gonore ak MST lakòz vajen nou ap bay vye dlo: 800 mg, yon sèl kou, yon sèl fwa (gade nan paj 277 ak 278, n ap wè ki medikaman pou n mete ansann pou n trete MST). Lè moun k ap soufri ak SIDA yo gen dyare: Se pou yo pran 400 mg, 2 fwa pa jou, pandan 5 jou. | | Avètisman (Atansyon pa kapon) | Pou enfeksyon nan vesi oswa nan ren: anpisilin, amoksisilin, nitwofirantoyin, ko-trimoksazòl, eritwomisin Pou gonore: sipwofloksasen, seftryaksòn, sefiksim, kanamisin Lè moun k ap soufri ak SIDA yo gen dyare: metwonidazòl ko-trimoksazòl |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an | Fanm ansent, fanm k ap bay tete ak ti demwazèl ki pa ko gen 16 zan. Moun ki fè alèji ak antibiotik ki nan Fanmi Kindòm yo. | | |

oksitosin (Pitocin)

Yo itilize oksitosen pou yo ede matris nou ak vesò sangen nou yo kontrakte. Se konsa yo ka rive met kontwòl sou gwo emoraji apre akouchman. Yo konn fanm medikaman sa a tou, lè plasennnta pran plis pase inè d tan pou l soti.

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Pou piki: 10 Inite nan chak mililit | Efè segondè | Nou pa dwe bay fanm oksitosen pou n fè yo jete pitit. Oksitosen gen dwa touye fanm nan, anvan pitit la tonbe (gade "Avòtman", nan chapit 15). |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Yon piki 10 Inite nan misk, lè ti bebe a fin soti. Nan 10 minit, nou gen dwa rekòmanse, si sa nesesè. | Avètisman (Atansyon pa kapon) | Si n sèvi ak oksitosen pou n fè tranche vanse oswa pou n bay fanm k ap akouche fòs, n ap mete ni manman, ni pitit an danje. Nou pa dwe bay fanm ansent oksitosen, toutotan ti bebe a pa soti. |
| Efè segondè | Oksitosen ka fè matris la kontrakte twòp. Konsa, matris la gen dwa refize lache kò l apre. Li gen dwa menm dechire. Oksitosen ka fè tansyon moun monte tou. | Lòt medikaman ki bon tou | Pou gwo emoraji apre akouchman: ègometrin. |

parasetamol, asetaminofèn (Datril, Doliprane, Panadol, Tylenol, Winasorb ak kèk lòt)

Se menm medikaman an ki gen tou 2 non sa yo: parasetamol oubyen asetaminofèn. Li bon pou doulè ak lafyèv. Se youn nan analjezik (medikaman pou doulè) ki gen mwens danje. Li pa deranje lestomak. Kidonk, malad k ap soufri ak ilsè nan lestomak gen dwa pran l nan plas aspirin oswa nan plas ibipwofèn. Fanm ansent ka bwè l san pwoblèm. Timoun tou, si se ti dòz piti nou ba yo.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Grenn: 100, 325 ak 500 mg Likid: 120 oubyen 160 mg nan chak 5 ml Sipozitwa: 300 mg Gout: 80 mg nan chak 0.8 ml |  | Sa nou dwe konnen  Asetaminofèn pa ka geri maladi ki ban n doulè oubyen lafyèv la. Se sentòm sa yo sèlman li ka konbat. Li enpòtan pou n chache konnen ki maladi n genyen, pou n ka trete l. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  Bwè 500 –1000 mg, pou pi piti 4 fwa pa jou, pou pi plis 6 fwa pa jou. | Lè dòz nou pran an twò fò  Noze Vomisman Doulè nan lestomak | |
| Ki moun ki dwe pran medikaman an |  Moun ki gen pwoblèm nan fwa osnon nan ren | Lòt medikaman ki bon tou | Pou doulè, lafyèv oswa enflamasyon: aspirin, ibipwofèn (pa pran ni youn, ni lòt, si n ansent) Pou gwo gwo doulè: kodeyin |
| Avètisman (Atansyon pa kapon) |  Si lafyèv la oswa doulè a fè plis pase 3 jou sou nou, se pou n kouri al wè doktè. Asetaminofèn ka donmajé fwa n, si n bwè l twòp oswa si n pran l ak bweson osnon lè n fin bwè bweson. | | |

penisilin (PNVK, Pen Vee K, phenoxymethyl penicillin)

Penisilin se yon antibiotik ki trete enfeksyon bouch, enfeksyon dan, enfeksyon po, enfeksyon matris ak anpil lòt enfeksyon.

| | | |
|---|--|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Grenn: 250, 500 mg Likid: 125 oubyen 250 mg nan chak 5 ml | Efè segondè  Bouton-chalè |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  Pou enfeksyon nan matris apre akouchman: Bwè 250 mg (ki se menm bagay ak 400 000 inite), 4 fwa pa jou, pandan 7 jou (se pou n pran lòt medikaman ki bon pou enfeksyon nan matris tou, gade nan paj 97). |  Siveye pou n wè si malad ki pran penisilin nan pa p fè alèji osnon si l pa p endispoze akòz pwoblèm alèji (gade nan paj 541). |
| Pou enfeksyon po: | Bwè 250 mg, 4 fwa pa jou, pandan 10 jou. | Lòt medikaman ki bon tou Pou enfeksyon po: anpisilin, amoksisilin, eritwomisin Pou enfeksyon apre akouchman: pwokayin penisilin, amoksisilin, metwonidazòl |
| Kilès ki pa ka pran medikaman an |  Moun ki fè alèji ak antibiotik ki nan fanmi penisilin yo. | |

| pirazinamid (PZA) | | |
|--|--|---|
| Yo itilize pirazinamid nan tretman tibèkiloz (TB) (gade nan chapit 25) | | |
| Sou ki fòm medikaman an vini | Grenn: 500 mg | Efè segondè |
| Ki dòz? Koubyen fwa? Kilè? | Dòz ki trete tibèkiloz nan yon zòn gen dwa pa ka trete l nan yon lòt zòn. Pou plis enfòmasyon, se pou n al wè yon travayè (z) sante. (Nou dwe pran lòt medikaman tou, gade nan paj 389). | Lajònus (po nou ak je nou vin tou jòn), lafyèv, fatig. Yon lòt bò, nou ka pèdi apeti, fwa nou ka vin sansib anpil epitou nou ka gen lagout oswa atwoz. Si n gen nenpòt nan pwoblèm sa yo, se pou n kouri al wè doktè. |
| Kilès ki pa ka pran medikaman an | | Avètisman Kòm, jouk jounen jodi a, pèsonn pa ko konnen kijan medikaman sa a ka aji sou ti bebe, fanm assent ak fanm k ap bay tete pa dwe pran l. Li enpòtan pou moun ki tebe yo fin suiv tretmana nèt. Si se pa sa y ap toujou ka kontamine lòt moun. |

| podofilin (Aminophylline, Neusil) | | |
|--|---|--|
| Podofilin se yon likid ki ka seche bouton moun genyen nan pati entim yo. Se sou bouton yo menm nou dwe pase podofilin nan. | | |
| Sou ki fòm medikaman an vini | Likid: 10-25 % | Avètisman (Atansyon pa kapon) |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pran yon aplikatè osnon pwent yon moso twal ki pwòp pou n pase likid la. Apre 4 trèd tan, se pou n lave bouton yo ak savon epi n rense yo ak dlo. Nou dwe fè sa 1 fwa pa semèn, pandan 4 semèn. | Si bouton yo ap fè san, nou pa dwe pase podofilin sou yo. Si n gen gwo iritasyon tou, se pou n sispann pase podofilin. |
| Kilès ki pa ka pran medikaman an | Fanm assent ak fanm k ap bay tete | Sa nou dwe konnen |
| Efè segondè | Podofilin ka irite po nou | Sa nou dwe konnen Podofilin ka irite kote ki pa malad yo trapde. Anvan n mete medikaman an, se pou n pase yon ti vazlin arebò bouton yo. |
| | | Lè dòz nou pran an twò fò |
| | | Nou ka gen noze, vomisman, doulè nan vant ak dyare. Po nou gen dwa dekale, fann oswa blese. |
| | | Lòt medikaman ki bon tou Pou bouton nan pati entim: asid triklowo-asetik, asid biklowo-asetik |

| pwobenesid (Benemid, Probenecid) | | Prekosyon |
|---|---|--|
| Pwobenesid se yon medikaman yo konn ba moun k ap pran antibiotik kinan Fanmi Penisilin yo. Pwobenesid ogmante dòz penisilin ki nan san malad la epitou li pèmèt penisilin nan rete nan san an pi lontan. Konsa, tretman an fèt pi byen. | | |
| Sou ki fòm medikaman an vini | Grenn: 500 mg | Efè segondè Pafwa, nou ka gen maltèt, noze oswa vomisman |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Bwè pou pi piti 500 mg, pou pi plis 1 g, lè n ap pran yon antibiotik ki soti nan Fanmi Penisilin. | Avètisman Nou dwe pran anpil prekosyon ak pwobenesid, lè n ansent, lè n ap bay tete ak lè n gen pwoblèm ilsè nan lestomak. |
| Kilès ki pa ka pran medikaman an | Timoun ki pa ko gen 2 zan | Lè dòz nou pran an twò fò Nou ka gen vomisman |

| pwojestewòn, pwojestin (Progesta, Progestin) | |
|--|--|
| Pwojestin se yon pwodui chimik ki nan grenn planin ak piki planin. Se menm bagay li ye ak òmòn pwojestewòn kò fanm fabrike. Yo konn ba medam yo pwojestin tou, lè règ yo ap vini an dezòd paske kantite òmòn ki nan kò yo chanje. Pou plis enfòmasyon sou grenn planin, piki planin ak metòd d ijans, gade nan chapit 13, epitou nan paj 517, 518, 519 ak 520. | |

| pwokayin penisilin (penicillin procaine) | | |
|--|---|---|
| Pwokayin penisilin se yon antibiotik ki trete enfeksyon nan matris ak kèk lòt enfeksyon. | | |
| Sou ki fòm medikaman an vini | Pou piki: anpoul 300 000, 400 000 oswa 600 000 inite | Avètisman Si n soufri opresyon, nou dwe pran anpil prekosyon, lè n ap pran pwokayon penisilin. Pa pran tetrasiklin ansanm avè l. Pa janm pran I nan venn. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou enfeksyon nan matris apre akouchman: Piki 800 000 Inite nan misk, 2 fwa pa jou, pandan 7 jou (se pou n pran lòt medikaman tou, gade nan paj 97). | Sa nou dwe konnen Lè n pran medikaman sa a ansanm ak pwobenesid, kantite penisilin ki rete nan san nou ogmante epitou li dire plis tan. Konsa, tretman fèt pi byen. |
| Kilès ki pa ka pran medikaman an | Pou lafyèv pandan gwosès: Yon piki 1.2 milyon Inite chak 12 zèd tan, padan n ap mennen fanm nan al wè doktè. | Lòt medikaman ki bon tou Pou lafyèv pandan gwosès: anpisilin Pou enfeksyon nan matris apre akouchman: amoksisilin, metwonidazòl, penisilin. |

| pwometazin (Phenergan, Promaz) | | Prekosyon |
|---|---|--|
| Pwometazin se youn nan medikaman ki rele anti-istaminik yo. Li seche flenm epitou li fè moun dòmi. Li bon pou moun ki gen pwoblèm alèji, moun ki pa ka dòmi lannwit ak moun k ap vomi san rete. | | |
| Sou ki fòm medikaman an vini | Grenn: 10, 12.5 oswa 25 mg Siwo: 5mg nan chak 5 ml Anpoul pou piki: 25 mg nan chak ml Sipozitwa: 12.5, 25 oswa 50 mg | Kilès ki pa ka pran medikaman an  Fanm ansent ak fanm k ap bay tete, si tretman an ap dire. Nou pa ka pran medikaman an nonplis, si n vle rete je klè. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? | Pou pwoblèm alèji ki pa twò grav: Bwè 25 mg osnon pran yon piki 25 mg nan misk. Rekòmansan nan 8 èd tan oswa pi bonè, si sa nesesè.  Pou pwoblèm alèji ki pa twò grav: Yon piki 50 mg nan misk. Yon lòt piki apre 8 èd tan oswa pi bonè, si sa nesesè. (Pou plis enfòmasyon sou tretman alèji ak endispozisyon alèji lakòz, gade nan paj 541) Pou vomisman: yon piki 25mg pou pi piti, 50 mg, pou pi plis, chak 6 zèd tan, si sa nesesè. Pou pwoblèm somèy: Bwè 25-50 mg, lè n pral kouche. | Efè segondè  Anpil fwa, bouch nou ap sèch epitou n ap wè twoub. Pafwa tou – men sa pa rive anpil fwa-, nou ka fè mouvman san n pa konnen ak kò nou, figi nou oubyen je nou. |
| | | Avètisman  Fanm ansent ak fanm k ap bay tete dwe pran anpil prekosyon, lè y ap pran pwometazin. Nou pa dwe ni kondi machin, ni sèvi ak aparèy ki lou, lè n ap pran medikaman sa a. |
| | | Lè dòz nou pran an twò fò  Nou ka pèdi konesans epitou nou ka gen kriz |
| | | Lòt medikaman ki bon tou Pou alèji oswa endispozisyon alèji lakòz: difenidramin, idroksizin |

| rifanmpisin (Rifampen) | | Prekosyon |
|---|--|--|
| Rifanmpisin se yon antibiotik ki trete tibèkiloz ak lòt kalte enfeksyon – ladan yo: maladi lèp (maladi Hansen). | | |
| Sou ki fòm medikaman an vini | Grenn: 150 oswa 300 mg Likid: 50 mg nan chak 5 ml Anpoul pou piki: 600 mg | Efè segondè  Noze, vomisman; malad la gen dwa pèdi apeti epitou li ka gen dyare ak lakranc nan lestimak Demanjezon, bouton; malad gen dwa santi chalè ap leve nan figi l. Maltèt, lafayèv, frison, doulè nan zo Lajònisis (po malad la ak je li ka vin tou jòn). Anwotan pwoblèm lajònisis lan, tout sentòm sa yo parèt, alòske 2 oubyen 3 zèd d tan apre malad la fin pran medikaman an. Pafwa, l ap ka evite pwoblèm sa yo, si l pran rifanmpisin nan ak manje. |
| Ki dòz? Koubyen fwa? Kilè? | Dòz ki trete tibèkiloz nan yon zòn gen dwa pa ka trete l nan yon lòt zòn. Pou plis enfòmasyon, al wè yon travayè (z) sante. (Se pou n pran rifanmpisin nan ansann ak lòt medikaman, gade nan paj 389). | Sa nou dwe konnen  Lè n pran rifanmpisin, pipi nou, tata n, dlo k ap sot nan je n, swè k ap koule sou nou ak krache k ap sot nan bouch nou gen dwa vin jòn fonse. Li enpòtan pou malad yo fin suiv tretman tibèkiloz la nèt pou yo pa kontamine lòt moun. |
| Kilès ki pa ka pran medikaman an |  Moun ki gen deranjman oubyen maladi nan fwa | |

sefaleksin (Cephalex, Keflex)

Sefaleksin se yon antibiotik ki soti nan Fanmi Sefaloporin ak medikaman sa a, yo trete, enfeksyon vesi, maladi bwonch ak kèk enfeksyon po.

| | | |
|--|---|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Grenn: 250 oubyen 500 mg Likid: 125 oubyen 250 mg nan chak 5 ml |  Avètisman Siveye aleji |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  Pou enfeksyon tete ak enfeksyon ves: bwè 250 mg, 4 fwa pa jou, pandan 7 jou. |  Sa nou dwe konnen Si moun nan kòmanse gen dyare ak tras san plis lafyèv, se pou n sispann ba 1 sefaleksin. Trete l ak metwonidazòl (gade nan paj 507) |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an |  Moun ki fè aleji ak antibiotik nan Fanmi Sefalosporin yo. |  Lòt medikaman ki bon tou Pou enfeksyon tete oubyen enfeksyon po: eritwomisin, dikloksasilin, amoksisilin Pou enfeksyon ves: amoksisilin, ko-trimoksazòl, eritwomisin, nòflaksen |
| Efè segondè |  Noze, vomisman ak dyare. Nan dezoutwa ka, malad la gen dwa kòmanse gen dyare ak tras san plis lafyèv. | |

sefiksim (Oroken)

Prekosyon



Sefiksim se yon antibiotik ki soti nan Fanmi Sefalosprin. Yo trete plizyè enfeksyon avè l – ladan yo: gonore, maladi enflamasyon nan basen ak kèk lòt ankò.

| | | |
|--|---|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Grenn: 200 oubyen 400 mg Likid: 100 mg nan chak 5 ml |  Efè segondè Noze, dyare, maltèt |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  Pou gonore oswa Maladi Enflamasyon nan Basen: bwè 400 mg, yon sèl kou, yon sèl fwa (ale nan paj 277 pou n wè gwoup medikaman ki ka trete fanm k ap bay yye dlo nan vajen akòz MST yo genyen; pou maladi Enflamasyon nan Basen, gade nan paj 278). |  Avètisman Siveye pou n wè si moun nan pa p gen pwoblèm aleji. Si malad la gen pwoblèm fwa, fòk nou siveye l san rete. |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an |  Moun ki fè aleji ak antibiotik nan Fanmi Sefalosprin yo. |  Lòt medikaman ki bon tou Pou gonore: seftriyaksòn, sipwofloksasen, ko-trimoksazòl, kanamisen, nòfloksasen Pou maladi Enflamasyon nan Basen: seftriyaksòn, nòfloksasen |

seftriyaksòn (Rocephin, Tricefi)

Prekosyon



Seftriyaksòn se yon antibiotik ki fò anpil. Li soti nan fammi sefalosporin. Yo bay li ak yon piki nan misk. Yo trete divès kalte enfeksyon avè l – ladan yo: gonore, maladi Enflamasyon nan Basen, enfeksyon nan ren ak enfeksyon grav apre avòtman, akouchman oswa fos kouch.

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Anpoul pou piki: 250, 500 mg epitou 1 gram, 2 gram ak 10 gram |  Ki moun ki pa dwe pran medikaman an  Moun ki fè aleji ak antibiotik nan Fammi Sefalosporin yo. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  Pou enfeksyon grav apre avòtman oswa akouchman: piki 1 gram nan misk, yon fwa pa jou, pandan 10 jou. Pou gonore, chank oswa Maladi Enflamasyon nan Basen: piki 250 mg nan misk, yon sèl fwa (gade nan paj 277 ak 278 pou n wè gwoup medikaman ki trete MST yo). |  Avètisman Siveye pou n wè si moun nan pa p gen pwoblèm aleji. Lè n ap bay piki antibiotik, fòk nou toujou pare pou n trete pwoblèm aleji ak pwoblèm endispozisyon aleji lakòz. |
| Lòt medikaman ki bon tou | | Pou enfeksyon grav: amoksisilin ak klavilanat potasòm (Augmentin) Pou gonore, chank oubyen Maladi Enflamasyon nan Basen: kanamisen |

silfat mayezyòm (sulfate de magnesie)

Pami medikaman ki ka anpeche fanm ansent ki gen toksemi fè kriz (konvilzyon), se silfat manyezyòm ki pi bon.

| | | | |
|---|---|----------------------------------|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Likid pou piki: 10 %, 12,5 %, 25 % oubyen 50 % | Sa nou dwe konnen | Si n ap ba malad la yon gwo dòz, yon sèl kou, n ap bezwen yon sereng ki gen gwo zegwi. Epitou, sa ka pa fasil. Se poutèt sa, nou gen dwa prefere ba fanm nan mwatye dòz la nan yon bò dèyè epi lòt mwatye a nan lòt bò dèyè a. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  Pou konvilzyon: piki 10 g nan misk | Lè dòz nou pran an twò fò |  Fanm ki pran yon twò gwo dòz swe anpil; tansyon yo bese; feblès anvayi yo epitou yo gen difikile pou yo respire. |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman an |  Fanm ki gen pwoblèm nan ren | Lòt medikaman ki bon tou |  Pou konvilzyon: dyazepam |
| Avètisman |  Si tansyon yon fanm pa pi wo pase 160/110, nou pa dwe ba l silfat manyezyòm. Lè n fin ba yon fanm medikaman an, se pou n kontinye tyeke tansyon l. Si manmzèl pran yon twò gwo dòz, respirasyon l gen dwa ralanti oubyen tou li ka sispann respire! | | |

silfisoksazòl (Sulfathiazol)

Prekosyon 

Silfisoksazòl se yon antibiotik ki soti nan Fanmi Silfonamid yo. Li trete enfeksyon nan vesi.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Grenn: 500 mg Likid: 500 mg nan chak 5 ml | Kilès ki pa ka pran medikaman an | Fanm ansent, nan 3 dènye mwa gwo sèl yo; Moun ki fè alèji ak antibiotik ki nan Fanmi Silfonamid yo; Moun ki gen pwoblèm ren. |
| Ki dòz? Koubyen fwa? Kilè? |  Pou enfeksyon nan vesi: bwè 1000 mg, 4 fwa pa jou, pandan 10 jou | Sa nou dwe konnen |  Lè n ap pran silfisoksazòl, fòk nou bwè, pou pi piti, 2 lit dlo, chak jou. |
| Efè segondè |  Noze, vomisman, dyare, bouton, maltèt | Lòt medikaman ki bon tou |  Pou enfeksyon nan vesi: amoksisilin, anpisilin, ko-trimoksazòl. |

sipwofloksasin (Cetraxal, Ciprox, Ciprooxina)



Sipwofloksasen se yon antibiotik ki fò. Li soti nan Fanmi Kinolòn. Ak medikaman sa a, yo trete enfeksyon po ak enfeksyon ren. Yo itilize l tou nan tretman kèk MST, tankou pa egzanp, gonore, chank ak Maladi Enflamasyon nan Basen.

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini |  Grenn: 250, 500 oswa 750 mg | Efè segondè |  Noze, dyare, vomisman, maltèt |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè? |  Pou gonore, Maladi Enflamasyon nan basen osnon chank: Bwè 500 mg, yon sèl kou, yon sèl fwa (gade nan paj 277 ak 278 pou n wè gwoup medikaman ki trete MST yo) | Avètisman | Medikaman sa a fè move reyakson, lè l rankontre ak kafeyin (yon pwodui nou jwenn nan kafe, chokola, kola, eks.). Li fè kafeyin nan vin pi fò. |
| Ki moun ki pa dwe pran medikaman a |  Fann ansent, fann k ap bay tete ak timoun ki pa ko gen 16 zan. | Sa nou dwe konnen | Se pou n bwè anpil dlo ak medikaman an. Nou gen dwa manje pandan n ap bwè sipwofloksasen. Sèl bagay pou n evite, se pwodui ki fèt ak lèt yo. |
| | | Lòt medikaman ki bon tou | Pou gonore: seftryaksò, kanamisen, nòflaksen Pou chank: eritwomisin, ko-trimoksazòl Pou maladi Enflamasyon nan Basen: nòflaksen, doksisiklin, metwonidazòl Pou enfeksyon nan ren: amoksisilin, ko-trimoksazòl |

tetrasiklin (Tetracycline)



Tetrasiklin se yon antibiotik ki soti nan Fanmi ki gen menm non an: Fanmi Tetrasiklin. Li trete plizyè kalte enfeksyon – ladan yo: klamidyaz, sifilis, maladi enflamasyon nan basen, enfeksyon nan ren ak nan vesi, enfeksyon respiratwa, dyare ak plizyè lòt enfeksyon. Doksisiklin trete tout enfeksyon sa yo tou epi li koute pi bon mache pase tetrasiklin. Yon lòt bò, n ap ka sèvi avè l pi fasil (gade nan paj 499).

| | | | |
|---|---|--|--|
| Sou ki fòm medikaman an vini | Kapsil: 100, 250 oswa 500 mg Pomad: 1 % | | Avètisman Toutotan nou pa ko gen plis pase inè d tan depi n fin bwè lèt, pwodui ki fèt ak lèt oubyen antasid, nou pa dwe pran tetrasiklin. Si dat ekspirasyon tetrasiklin nan pase, nou pa dwe pran l ditou. |
| Ki dòz? Koubyen fwa? Kilè? | Pou klamidyaz: 500 mg 4 fwa pa jou, pandan 7 jou (se pou n pran lòt medikaman tou, gade nan paj 277) Pou sifilis: 500 mg, 4 fwa pa jou, pandan 15 jou (se pou n pran lòt medikaman tou, gade nan paj 278). Pou maladi Enflamasyon nan Basen: 500 mg, 4 fwa pa jou, pandan 10 jou (pran lòt medikaman tou, gade nan paj 278). | | Sa nou dwe konnen Tetrasiklin pa ka konbat grip epitou li pa ka anpeche n trape MST. |
| Kilès ki pa ka pran medikaman an | Fann ansent ak fanm k ap bay tete; Timoun ki pa ko gen 9 ane, sof pou kesyon je ti bebe ki fèk fèt yo; Moun ki fè alèji ak antibiotik ki nan Fanmi Tetrasiklin. | | Efè segondè Lè n pran tetrasiklin, si n fè anpil tan nan solèy, bouton gen dwa leve sou po n. Yon lòt bò, tetrasiklin ka ban n dyare oubyen tou li ka deranje lestomak nou. |
| Lòt medikaman ki bon tou | Pou klamidyaz: amoksisilin, eritwomisin Pou sifilis: bennzatin penisilin Pou maladi enflamasyon nan basen: amoksisilin Pou je ti bebe: pomad eritwomisin | | |

toksoyid pou tetanòs (vaksen, Anatoxalte)

Toksoyid pou tetanòs se yon vaksen ki anpeche moun trape tetanòs. Nou ka pran l pandan gwosè, apre gwosè oswa apre avòtman. Lè yon fanm ansent pran 2 vaksen (3 vaksen pi bon ankò), ti bebe a ap jwenn pwoteksyon tou kont maladi petefyèl ki rele tetanòs la.

| | | | |
|---|--|--|---|
| Sou ki fòm medikaman an vini | | Likid pou piki: 4, 5 oswa 10 inite nan chak ½ mililit | Sa nou dwe konnen Tout moun dwe kòmanse pran vaksen tetanòs, depi lè yo tou piti. Anpil fwa, yo konn ba timoun yon vaksen ki rele DPT ki pwoteje yo kont 3 maladi (Difteri, Polyo ak teTetanòs). Konsa, nan 3 DPT, timoun yo pran 2 premye dòz vaksen tetanòs yo. Men yon kalandriye k ap montre n ki pi piti tan yon granmoun ka tann anvan 1 pran chak vaksen tetanòs. |
| Ki dòz? Koubyen fwa? Kilè? | | Pou chak vaksen: yon piki 0.5 ml nan misk nan bout anwo bra moun nan. | Premye Pi bonè se granm maten! Dezyèm nan 4 semèn apre premye a Twazyèm nan 6 mwa apre dezyèm nan Katriyèm nan yon ane apre twazyèm nan Senkyèm nan yon ane apre katriyèm nan |
| Efè segondè | | Doulè, ti fyèv ak ti enflamasyon. Kote n pran vaksen an ka vin tou wouj tou. | |

| tyasetazòn (Thiazina) | | Prekosyon |
|--|---|--|
| Tyasetazòn se yon medikaman ki trete tibèkiloz, lè yo mete l ansanm ak izonyazid. Moun ki gen viris SIDA pa dwe pran tyasetazòn! Gade nan chapit 25. | | |
| Sou ki fòm medikaman an vini  Grenn: 50 mg + izonyasid | Kilès ki pa ka pran medikaman an  | Moun ki gen VIH. Tyasetazòn gen dwa ba yo gwo pwoblèm alèji ki ka memm rive fè yo pèdi lavi yo. Medikaman an ka dekale po yo tou. Moun ki gen pwoblèm nan fwa oswa nan ren. |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè?  | Dòz ki trete tibèkiloz nan yon zòn gen dwa pa ka trete l nan yon lòt zòn. Pou plis enfòmasyon, al wè yon travayè (z) sante. (Se pou n pran tyasetazòn nan ansanm ak lòt medikaman, gade nan paj 389). | Efè segondè  Tyazetazòn ka ba malad la bouton, vomisman ak vètij. Li ka fè moun pèdi apeti tou. Pafwa tou, li ka fè malad la ri san rete tankou yon moun ki pa tèm. |

| vaksen kont epatit B (Engerix-B, Recombivax HB) | | |
|---|---|--|
| Se yon vaksen ki pwoteje moun kont Epatit B | | |
| Sou ki fòm medikaman an vini  Likid pou pikti: 5, 10, 20 oubyen 40 mg nan chak mililit | Efè segondè  Pafwa: lafyèv, maltèt, feblès, ak fatig | |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè?  | Toujou bay vaksen an nan bout anwo bara a oubyen nan kwis. se 3 dòz pou moun nan pran. Li dwe pran dezyèm dòz la 1-2 mwa apre premye a. Li dwe pran twazyèm dòz la, 4-12 mwa apre dezyèm nan. | Sa nou dwe konnen  Si n pa konsève vaksen sa a nan frijidè (nan yon tanperati ki pa dwe ni pi ba pase 2 degre, ni pi wo pase 8 degre, ni pi wo pase 8 degre), l ap pèdi fòs li. Se nan bout anwo bra oubyen nan kwis pou n bay vaksen an. |
| Men 2 mak vaksen. Dòz ki bon pou premye a pa bon pou dezyèm nan: Engerix-B Rekombivax HB Grammoun: 20 µcg 10 µcg Timoun Soti nan 0 rive Nan 11 zan: 10 µcg 2.5 µcg Soti nan 11 rive Nan 19 van: 20 µcg 5 µcg | | Lòt medikaman ki bay rezulta Imina globilin pou Epatit B (Hepatitis B immune globulin) |

| Vyolèt Jenneyan (Violet de Gentiane, methylrosanilinium chloride) | | |
|--|---|---|
| Vyolèt Jenneyan se yon dezenfektan. Yo itilize l pou yo konbat enfeksyon po, enfeksyon nan bouch ak enfeksyon nan vajen. | | |
| Sou ki fòm medikaman an vini  Likid: 0.5 %, 1 %, 2 % Tenti: 0.5 % Kristal (ti grenn): 1 ti kiyè nan yon demi lit dlo ap bay yon likid 2 % | Avètisman  Lè n ap sèvi ak Vyolèt Jenneyan pou n trete enfeksyon nan vajen, fòk nou sispann al nan rapò seksyel, pou n pa kontamine patnè a. | |
| Ki dòz? Konbyen fwa? Kilè?  | Pou champion nan vajen: pandan 3 jou, se pou n mete, nan vajen nou, chak swa, yon boul koton ki fin tranpe nan yon likid vyolèt Jenneyan 1 %. Pa blyi wotire boul koton chak maten. | Sa nou dwe konnen Si n gen pwoblèm iritasyon, se pou n sispann sèvi ak Vyolèt Jenneyan nan. |
| Pou enfeksyon po: Tou dabò, se pou n lave po n ak dlo ak savon. Apre n fin seche l, se pou n pase Vyolèt Jenneyan. Nou dwe fè sa 3 fwa pa jou, pandan 5 jou, kit se sou po, sou bouch osnon nan vajen. | Lòt medikaman ki bon tou Lè n fin mete Vyolèt Jenneyan nan bouch yon ti bebe, se pou n mete l kouche sou vant, pou l pa vale twòp ladan. | Vyolèt Jenneyan ka fè tach vyolèt sou po nou ak rad nou. |
| Efè segondè  Si n sèvi ak Vyolèt Jenneyan twò anpil fwa nou ka gen pwoblèm iritasyon. Yon lòt bò, lè n mete medikaman sa a sou bouton-maleng oswa blese, yo gen dwa rete ak yon tach vyolèt lè yo fin geri. | Pou enfeksyon po: pomad antibiotik, tentidyòd Pou chanklèt nan bouch: sitwon (ti bebe pa ladan), nistaten Pou champion nan vajen: nistaten, mikonazòl, klotrimazòl | |

GREN PLANIN

Pifò gress planin gen 2 òmòn ladan yo. Òmòn sa yo ki rele estwojèn ak pwojestewòn (pwojestin) se menm bagay yo ye ak òmòn kò fanm fabrike poukont li. Kòm nou konnen, se òmòn sa yo ki kontwole règ medam yo. Nan famasi n ap jwenn plizyè mak gress planin. Yo tout pa gen menm fòs; yo tout pa gen menm kantite estwojèn ak pwojestin. Pi ba n ap wè kèk nan mak sa yo. Alòske, li pi bon pou n sèvi ak mak gress ki gen mwens òmòn. Yon bò, yo gen mwens danje; yon lòt bò, yo bay pi bon rezulta. Se nan Gwoup 1, Gwoup 2 ak Gwoup 3 nou pral jwenn gress planin “ak fèb doz” sa yo.

Gwoup 1- Gress planin trifazik (twa faz).

Yo gen yon ti kantite estwojèn, yon ti kantite pwojestin. Gen yon gress pou chak jou nan mwa a. Tout gress yo pa gen ni menm kantite estwojèn ni menm kantite pwojestin. Se pou tèt sa, li enpòtan pou n pran gress yo youn dèye lòt.

Men kèk mak gress nou ka jwenn nan famasi:

| | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| Logynon | Tricyclen | Trinovum | Triphasil |
| Synophase | Trinordiol | Triquilar | |

Gwoup 2 - Gress planin fèb doz.

Yo gen yon ti kantite estwojèn (35 mcg. “etinil estradyòl” ki se yon kalte estwojèn, oubyen 50 mcg. “mestranol” ki se yon lòt kalte estwojèn) ak yon ti kantite pwojestin. Tout gress yo gen menm kantite òmòn.

Men kèk mak gress nou ka jwenn nan famasi:

| | | | |
|-----------------|------------------------|--------------|---------|
| Brevicon 1 + 35 | Norinyl 1 + 35, 1 + 50 | 50 | Neocon |
| Noriday 1 + 50 | Ortho-Novum 1/35, 1/50 | Ovysmen 1/35 | Norimin |
| <u>Perle</u> | | | |

Gwoup 3 - Gress planin fèb doz.

Gress sa yo chaje ak pwojestin, men yo pa gen anpil estwojèn (30 oubyen 35 mcg. etinil estradyòl).

Men kèk mak gress nou ka jwenn nan famasi:

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| Lo- Femenal | Lo-Ovral | Microvlar | Mycrogynon 30 |
| Nordette | Minigynon | | |

Li enpòtan pou n pran gress planin lan chak jou nan menm lè a, sitou si se gress ki pa gen anpil òmòn n ap pran. Konsa nap jwenn pi bon rezulta epi n ap gen mwens chans pou n bay san (fanm k ap pran gress planin konn bay ti san tanzantan, san se pa règ yo genyen). Si apre 3 oubyen 4 mwa nou kontinye bay san, se pou n eseye sèvi ak yon mak nan Gwoup 3 a. Si 3 mwa apre sa, nou kontinye bay san eseye sèvi ak yon mak nan Gwoup 4 la.

Lè yo gen règ, fanm k ap pran gress planin bay mwens san passe lòt famm. Se petèt pa yon move bagay, sitou pou medam ki fè anemi yo. Men si yon fanm pa wè règ li pandan plizyè mwa oubyen tou si li santi l gen pwoblèm poutèt se yon ti kras san sèlman li bay, lè l resi gen règ, li gen dwa pran yon mak nan Gwoup 4 la. Mak sa yo gen plis estwojèn.

Men yon fanm ki bay anpil san, lè l gen règ li, oubyen ki konn gen doulè nan tete, lè règ li kòmanse, ta dwe pran yon mak ki pa gen anpil estwojèn, men ki gen anpil pwojestin. Nous jwenn mak sa yo nan Gwoup 3.

Grenn planin Gwoup 3 yo ki gen plis pwojestin konn lakòz bouton leve nan figi fanm. An menm tan, yo konn fè plis plim pouse sou bra medanm yo e menm moustach sou po bouch yo. Si n gen pwoblèm akòz yon sitiyasyon konsa, pito nou eseye pran grenn planin ki pa gen anpil pwojestewòn.

Fanm ki kontinye bay san san rete, fanm ki pa wè règ yo, pandan y ap sèvi ak yon mak nan gwoup 3 a ta dwe pran yon mak ki gen yon ti kras plis estwojèn. Fanm ki rive ansent malgre y ap pran grenn ta dwe fè menm bagay la tou. Nou jwenn mòd grennn planin sa yo nan Gwoup 4.

Gwoup 4 - Grenn planin gwo doz.

Grenn planin sa yo gen plis estwojèn (50 mcg. etinil estradyòl). Pi fò ladan yo gen plis pwojestin tou.

Men kèk mak grenn nou ka jwenn nan famasi:

| | | | |
|-----------|------------|----------|-----------|
| Eugynon | Norlestrin | Femenal | Minovlar |
| Ovcon 5.0 | Ovral | Neogynon | Primovlar |
| Nordiol | | | |

Alòske, mak Ovulen ak mak Devulen ap ba nou bon rezilta, si nou kontinye bay san, malgre n ap sèvi ak yon mak nan Gwoup 4 la. Men grenn planin sa yo chaje anpil ak estwojèn. Se poutèt sa doktè pa preskri yo anpil fwa. Pafwa, yo bon anpil pou fanm ki gen gwo akne.

Fanm ki kontinye gen kè plen oswa tou lòt pwoblèm grenn planin lakòz apre 2 oubyen 3 mwa ta dwe eseye sèvi ak gress planin trifazik yo ki gen ni anpil estwojèn ni anpil pwojestin. Gress planin sa yo bon tou pou fanm ki gen plis chans pou yo bay boul san nan règ. Nou jwenn yo nan Gwoup 1.

Fanm k ap bay tete ak fanm ki pa ka pran gress planin nòmal yo akòz pwoblèm maltèt oubyen tansyon ki yon ti jan wo gen dwa pran gress planin ki gen yon sèl òmòn: pwojestin. Gress sa yo, nou jwenn nan Gwoup 5 lan rele "mini pilil".

Gwoup 5 - Gress ki gen pwojestin sèlman.

Gress sa yo tou ki rele tou "mini pilil" gen yon sèl òmòn: pwojestin.

Men kèk mak gress nou ka jwenn nan famasi:

| | | | |
|---------|------------|----------|----------|
| Femulen | Micronovum | Microval | Microlut |
| Nor-QD | Micronor | Ovrette | |

Nou dwe pran mòd gress sa yo nan menm lè a, chak jou, menm si nou gen règ. Anpil fwa, règ la pa vini lè pou l vini. Lè se mòd gress sa yo n ap pran, n ap gen plis chans pou n ansent, menm lè se yon sèl gress nou bliye pran.

METÒD PLANIN DIJANS

Se dòz grenn espesyal yon fanm pran pou 1 pa ansent, lè 1 sot nan kontak seksyèl san pwoteksyon. Pa gen danje nan sa, menm pou fanm ki pa ka pran grenn planin tout tan.

Dòz yo:

Lè nou soti nan kontak seksyèl san poteksyon, plis nou pran doz la vit, se plis n ap gen chans evite yon gwosès. Nou dwe respekte dòz yo san manke yon vigil.

*Pa kite 3 jou pase anvan nou pran 2 grenn planin "gwo dòz" nan Gwoup 4 la.
12 èd tan apre, se pou n pran 2 grenn anko nan menm gwoup lan.*

oubyen

Pa kite 3 jou pase anvan nou pran 4 grenn planin "fèb doz"nan Gwoup 2 oswa nan Gwoup 3. 12 èd tan apre, se pou n pran 4 lòt grenn nan youn oswa lòt gwoup lan.

oubyen

Pa kite 3 jou pase anvan nou pran 25 "mini pilil", sa vle di gress planin ki gen pwojestin sèlman, nan Gwoup 5 (Microval oubyen Ovette). 12 èd tan apre, se pou n pran 25 lòt gress nan menm gwoup lan.

Jounen jodi a, n ap jwenn kèk gress planin ki bon espesyalman pou ijans. Nou kapab byen jwenn yo nan zòn kote n ap viv la. Pami mak sa yo, nou jwenn PC4, Postinor-2 ak Tetracycline. Postinor-2, pa egzanp, gen yon sèl òmòn: Si se avè 1 n ap sèvi, fòk nou pa kite 3 jou pase anvan n pran 1 gress. 12 èd tan apre fòk nou pran 1 lòt.

Efè Segondè:

Nan medam k ap pran gress planin yo, plis pase lamwatye konn gen kè plen ak vòmisman. Si, apre nou fin bwè gress, nou tonbe vomi san 3 èd tan pa ko pase, se pou n pran yon lòt dòz. Si vomisman an ban nou pwoblèm, nou gen dwa bwè 25 mg. pwometazin 2 fwa pa jou (*ale nan paj 513 - PAJ V ÈT YO*). Olye nou bwè gress planin dijans yo, nou gen dwa foure yo tou byen fon nan kannal vajen nou. Metòd sa a bay egzakteman menm rezilta a. Sa pap anpeche n gen ni kè plen ak ni vòmisman, men sa ap rejte gress yo.

Gress ki gen pwojestin sèlman yo bay mwens pwoblèm kè plen ak vòmisman, men fòk nou pa kite 3 jou pase anvan n pran yo.

PIKI PLANIN

Fanm k ap suiv metòd sa a pran yon piki chak 1, 2 oubyen 3 mwa, selon mak y ap itilize a. Metòd sa a bon anpil.

Nan piki sa yo, gen 2 mak, Depo Provera (DMPA) ak Noristerat (Net-En) ki fèt ak pwojestin sèlman. Tankou "mini pilil" ak Enplant, piki sa yo ka bon pou fanm ki pa ka pran gress planin nòmal yo poutèt danje ak efè segondè yo jwenn ladan yo. Fanm k ap sèvi ak Depo Provera dwe pran yon piki 150 mg. chak 3 mwa. Fanm k ap sèvi ak Noristerat (Net-En) dwe pran yon piki 200 mg. chak 2 mwa. Pafwa piki sa yo konn bay doulè nan tete, kè plen oswa gwo fatig. Piki sa yo bay kèk fanm mal tèt, depresyon oubyen vètij. Gen fanm ki konn santi yo eksite tou. Tout efè segondè sa yo disparèt, lè yo sispann pran piki planin. Nan mitan fanm ki sispann sèvi ak metòd sa a, gen ladan yo ki ansent apre 3 oubyen 4 mwa yo; gen lòt ki ka tann jiska 18 mwa anvan yo reyisi ansent.

Pa itilize piki planin, si n pa konn si nou pa deja ansent. Pa pran piki planin si san an koule sou nou san n pa konn pou ki rezon. Pa sèvi ak metòd sa a nonplis, si nou gen maladi fwa, kansè nan tete oubyen si san kaye nan janm nou, nan poumon nou oswa nan je nou. Gen 2 lòt mak piki, Cyclofem ak Mesigyna, ki gen tou 2 ômòn yo: ni pwojestin, ni estwojèn. Kòm nou konnen, fanmm ki pran piki ki gen pwojestin sèlman konn bay san, menm lè yo pa gen règ. Fanm ki sèvi ak Cyclofem oubyen Mesigyna pa gen pwoblèm sa a. Men fanm ki pa ka bwè gress planin poutèt danje ak efè segondè pa ka pran piki sa yo nonplis.

Dòz *Cyclofem* nan se 25 mg. DMPA ak 5 mg estradyòl sipyonat yon fwa chak mwa. Fanm k ap pran *Mesigyna* dwe pran 50 mg. Net-En ak 5 mg. estradyòl valerat yon fwa chak mwa.

Tout piki planin ka anpeche règ yon fanm vini nòmalman. Règ la ka vini ak yon ti kras san. Li ka menm sispann nèt apre premye ane a. Pa gen danje, men gen fanm ki ka santi yo deranje. Medam ki pi granmoun yo gen dwa panse se rete yo rete (menopoz). Konsa, yo ka deside sispann piki a epi, trapde, yo vin ansent. Si yon fanm ki pran piki planin gen emoraji, fòk li chache konkou doktè san pèdi tan.

ENPLAN (NOPLAN)

Se yon metòd planin ki bay bon rannman san l pa bay twòp pwoblèm. Kòm se pwojestin sèlman li genyen, li bon pou fanm ki gen maltèt ak tansyon wo, è yo pran gress planin nòmal yo.

Se 6 tib tou piti yon travayè sante konpetan foure anba po bra fanm nan. Metòd sa a pwoteje fanm kont gwochès pandan 5 lane. Men depi yon fanm vle fè pitit, li ka retire enplan an la pou la. Nòmalman, medam yo dwe kòmanse ak metòd la 5 - 7 jou apre règ yo.

ESPÈMISID

Metòd sa a vini sou fòm mous (tankou yon kim savon ki pwès), krèm oubyen gress. Se foure yo foure l nan vajen fanm. Li pwoteje fanm kont gwochès paske l touye jèm gason (espèmatozoyid). Kèk espèmisdid gen ladan yo yon pwodui ki rele nonoksinol 9 ki ka pwoteje moun kont MST tou. Men se pa tout mak yo ki gen pwodui sa a. Pa blyi, okenn espèmisdid pa ka pwoteje moun kont VIH, viris ki bay maladi SIDA a. Sèvi ak kapòt.

Pomad ak krèm (Conceptrol, Koromex, Ortho Gynol)

Pomad ak krèm bay pi bon rezulta, lè n sèvi ak yo ansam ak dyafram. Yo pa plen vajen nan tankou mous ak gress. Fanm lan dwe mete yo ak aplikatè. Yo touye jèm yo, pou piti, pandan 1 èd tan. Lè n mete yo ansam ak dyafram, yo ka pwoteje n pandan 6 - 8 èd tan. Pou plis pwoteksyon kont gwochès, enfeksyon MST ak VIH, sèvi ak kapòt tou.

Mous lan (Delfen, Emko Koromex)

Yo mete l nan vajen ak yon aplikatè espesyal. Mous lan touye jèm yo pandan 1 - 2 èd tan. Nou dwe remete l chak fwa n ap rekòmanse. Espèmisdid sou fòm mous la bay pi bon pwoteksyon pase espèmisdid sou fòm gress, pòmad ak krèm. Li bon anpil, lè nou itilize l ansam ak kapòt.

Gress nan (Encare, Koromex, Neo Sampoon)

Se yon tablèt ki genyen espèmisdid. Fanm nan fèt pou foure l byen fon nan vajen li, tou pre kòl matris la. Li dwe mete l 10 - 15 minit anvan l antre nan kontak seksyèl. Gress nan ap bay rezulta pandan 1 èd tan konsa. Poukout li, se yon bon metòd planin, men li pi bon ankò si nou sèvi avè l ak kapòt. Nou dwe mete yon gress espèmisdid chak fwa n ap rekòmanse.