



વિષયસૂચિ :

- | | |
|-------------------------------|--|
| ૧.૦ માસિકની સમસ્યાઓ | ૨.૦ લોહી પડવાની બીજી સમસ્યાઓ |
| ૧.૧ ખૂબ લોહી જવું | ૨.૧ સગર્ભાવસ્થામાં લોહી પડવું. |
| ૧.૨ ઓછું માસિક આવે | ૨.૨ ગર્ભપાત કે કસુવાવડ પછી લોહી પડવું. |
| ૧.૩ વારંવાર માસિક આવવું | ૨.૩ શરીર સંબંધ પછી લોહી પડવું. |
| ૧.૪ બે માસિક વચ્ચે લાંબો ગાળો | ૨.૪ રજોનિવૃત્તિ પછી લોહી પડવું. |
| | ૩.૦ પરિવર્તન માટે પ્રચાસ |

આ પ્રકરણમાં તમારી સમસ્યા ઉપર જણાવી છે તે મુજબ વિભાગ નંબરથી શોધો. જો તમારી સમસ્યા અહીં જણાવેલ માહિતીમાં બંધબેસતી ના હોય તો ત્રી રોગના તબીબનો સંપર્ક કરો.

થોનિમાર્ગે લોહી પડવું.

સ્ત્રીઓને કેટલીકવાર સામાન્ય કરતાં જુદું માસિક આવતું હોય છે. ખાસ કરીને માંદગી, માનસિક તાણા, ધાવણ આપતી સ્ત્રીઓને, લાંબી મુસાફરી અથવા પોષણસ્તરમાં ફેરફાર વગેરે સંજોગોથી માસિક વખતે પડતું લોહી થોડી થોડી જુદી રીતે આવતું હોય એમ લાગે છે. પણ જે ફેરફાર એકદમ જ દેખાય, મહિનાઓ સુધી ચાલુ જ રહે કે તેની સાથે બીજી સમસ્યાઓ પણ થાય, તો એ ગંભીર નિશાની છે.

ભયજનક ચિહ્નો :

નીચે દર્શાવેલામાંથી કોઈ પણ ચિહ્ન હોય તો તાત્કાલિક તબીબી સારવાર લેવી.

- નિયમિત સમયે માસિક નથી આવ્યું અને હવે ખૂબ દુઃખાવા સાથે લોહી પડે છે.
- સગર્ભાવસ્થાના છેલ્લા ઉ મહિનાઓ દરમ્યાન લોહી પડે છે.
- બાળજન્મ, કસુવાવડ કે ગર્ભપાત પછી સખત લોહી પડવું.



૧.૦ માસિકની સમસ્યાઓ

૧.૧ ખૂબ લોહી જવું, ધણું વધારે માસિક આવે (લોહી પડે) કે માસિક વધુ દિવસો સુધી રહે.

- * એક કલાકથી પણ ઓછા સમયમાં માસિક પેડ બદલવું પડે (અથવા માસિકનું લૂગડું દિવસમાં ત્રણ-ચાર વાર આખ્યું ભીજાય અને બદલવું પડે) તો તેને ધણું વધારે લોહી પડે છે એમ કહેવાય.
- * જે માસિક ૮ દિવસથી વધુ ચાલે તો તેને લાંબો સમય માસિક આવ્યું એમ કહેવાય.
- * પોચા, ગાઢા લાલ ચમકતા ગઠા જેવું લોહી પડે તો તેને વધુ લોહી પડચું કહેવાય.
- * વધારે લોહી પડવાની ફરિયાદ જે લાંબો સમય (મહિનાઓ સુધી) ચાલુ રહે તો પાંડુરોગ (શરીરમાં લોહીની કમી પેદા થાય) થઈ જય.
- * છોકરીની ઉભર નાની હોય - ૧૦ વર્ષથી ઓછી હોય અને જે માસિક શરૂ થાય તો સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાત પાસે બતાવવું.
- * મોટી ઉભરે સ્ત્રીઓને રજે નિવૃત્તિ બાદ ૧ વર્ષ કે તેથી વધુ સમય બાદ ફરીથી થોનિમાર્ગે લોહી પડવા માંડે તો તે ગંભીર સમસ્યા છે. સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાતનો જ મત જરૂર લેવો.



અચાનક માસિકમાં ફેરફાર (માસિક બંધ થાય) થાય તો તે સગર્ભાવસ્થા હોઈ શકે છે. ગર્ભનિરોધ વાપરતા હોવા છતાં મહિના રહી ગયા હશે એમ માનવું.

વધુ માસિકની ફરિયાદ માટે આરોગ્ય કેન્દ્રમાં જાઓ. શક્ય હોય તો સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાતને બતાવો. નીચેના સંજેગોમાં જરૂર સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાતની સગવડવાળી હોસ્પિટલમાં જવ.

- * પોનિ વાટે લોહી વહ્યા જ કરતું હોય *
- * છેલ્લા ઉ માસથી માસિકમાં વધુ લોહી પડે છે.
- * સગર્ભાવસ્થા દરમ્યાન લોહી પડે * લોહી પડવા સાથે સખત દુઃખાવો થાય.

વધુ માસિકના કારણો :

- * શરીરમાં જરતા અંતઃક્રાવોનું સમતુલન ખોરવાઈ જવાથી બીજાં શીર્ષક છૂટું પડતું નથી. આવું 20 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની છોકરીઓને અને 40 વર્ષથી મોટી બેનોને થાય છે.
- * ગર્ભાશયમાં મૂકાવેલ કોપર દીને લીધે માસિક વધુ આવે છે.
- * પેટુમાં દુઃખાવો અને થોડું ઘણું લોહી પડે તો ગર્ભ રહ્યો હોઈ શકે. તરત જ હોસ્પિટલ જાઓ.
- * થાઈરોઇડની સમસ્યાને કારણે પણ વધુ માસિક આવે છે.
- * ગર્ભાશયની આંતરૂત્વચાનો સોઝે
- * ગર્ભાશયમાં ગાંઠ (Fibroid) કે (Polyp) મસા થયા હોય અથવા કેન્સર થયું હોય તો પણ માસિક વધુ આવે.



- * તમે સગર્ભ છો એવું તમને ના લાગતું હોય છતાં કસુવાડ થઈ જય.

૧.૨ ઓછું માસિક આવે :

નિયમિત દર માસે ઓછું જ લોહી પડે તો તે બિમારી નથી.

કારણો :

- * કેટલીક ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિ દા.ત. ગોળી, ડિજેક્શન કે ઈમ્પ્લાન્ટ વાપરતા હોય.
- * બીજાં શીર્ષક છૂટું પડતું નથી.

થોળિમાર્ગ લોહી પડવું.

૧.૩ વારંવાર માસિક આવવું :

જે દર ત અઠવાડિયાથી ઓછા સમયે માસિક આવી જતું હોય તો તે બરાબર નથી. નિયમિત ચક્કને બદલે ગમે ત્યારે લોહી પડવા માંડે તો તે પણ બરાબર નથી.

કારણો :

- * બીજશયમાંથી બીજ છુટું પડતું નથી.
- * અનિયમિત માસિક હોય તો ગર્ભશયમાં ગાંઠ, મસા કે કેન્સર હોઈ શકે છે તેની તપાસ કરાવો.
- * રજે નિવૃત્તિ (માસિક કાયમ માટે બંધ થવું) પછી ઇસ્ટ્રોજનવાળી દવા લેતા હોય.
- * ગર્ભનિરોધક ગોળી, ઈંજેક્શન કે ઇમ્પ્લાન્ટને કારણે પણ આવું થાય છે.


૧.૪ બે માસિક વચ્ચે ઘણો લાંબો ગાળો પડે કે માસિક બંધ થઈ જય :

સામાન્ય રીતે માસિક ૨૧ થી ૩૫ દિવસના ગાળામાં આવે છે. કોઈક સ્વીને નિયમિત રીતે વધુ ગાળો રહેતો હોય તો પણ તે બરાબર છે. પરંતુ જે તે તદ્દન બંધ થઈ જય તો સગર્ભાવસ્થા હોઈ શકે.

કારણો :

- * તમે સગર્ભ છો.
- * સગર્ભ છો અને હવે કસુવાવડ થઈ રહી છે.
- * બીજશયમાંથી બીજ છુટું પડ્યું નથી.
- * તમને ટીબી, એઇઝ્ઝ જેવી કોઈ ગંભીર બિમારી હોય.
- * જે તમે ૪૦-૪૫ વર્ષથી મોટાં હોય તો હવે માસિક કાયમ માટે બંધ થશો.
- * ઈંજેક્શન કે ઇમ્પ્લાન્ટ જેવી ગર્ભનિરોધક પદ્ધતિઓથી માસિકનો ગાળો વધુ રહે છે.

જે તમે ૧૮ વર્ષથી મોટાં હો અને હજુ સુધી માસિક આવ્યું જ નથી તો ડૉક્ટરને જરૂર મળો.





કુંબ નિયોજનની હોરમોનવાળી પદ્ધતિઓથી માસિક ની નિયમિતતામાં ફેરફાર આવે છે.



જ્યારે સ્વીની ઉંમર વધે છે ત્યારે માસિક ચક્કમાં ફેરફાર આવે છે.

૨.૦ લોહી પડવાના બીજા કારણો

૨.૧ સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કે બાળકના જન્મ પછી લોહી પડે છે.

સમસ્યા	કારણ	શું કરશો ?
સગર્ભાવસ્થાના પ્રથમ તુ માસમાં લોહી પડે છે. સાથે સતત દુઃખાવો રહે કે દુઃખે અને મટે, વળી દુઃખે વળી મટે છે.	બીજનળીમાં ગર્ભ રહ્યો છે. 	તાત્કાલિક દ્વારા જાઓ. 
સગર્ભાવસ્થાના છેલ્લા તુ માસ દરમિયાન લોહી પડે છે.	ગર્ભસ્થ શિશુને પોષણ પહોંચાડતી મેલી (Placenta) ગર્ભાશયમાંથી બહાર આવી રહી છે. ગર્ભદ્વાર ઉપર મેલી આવી ગઈ છે. 	તાત્કાલિક દ્વારા જાઓ. 
બાળકના જન્મ વખતે કે જન્મ પછી ખૂબ વધારે લોહી વહે છે.	મેલીના ટૂકડા ગર્ભાશયમાં રહી ગયા છે. ગર્ભાશયના સ્નાયુ મૂળ સ્થિતિમાં પાછા આવી શકતા નથી. 	તાત્કાલિક દ્વારા જાઓ. 
સામાન્ય માસિક કરતાં ઓછું લોહી પડે છે કે ખાતી ટીપા જ પડે છે. (Spotting)	ગર્ભાશયમાં ગર્ભ સ્થિર થવા માટે ગર્ભાશયની દિવાલ પર ચોંટી રહ્યો છે. આ સામાન્ય છે. ચિંતાનું કારણ નથી. 	“સગર્ભાવસ્થા અને પ્રસૂતિ” પ્રકરણ જુઓ.

થોળિમાર્ગ લોહી પડવું.

સમસ્યા	કારણ	શું કરશો ?
સગર્ભાવસ્થાના પ્રથમ છ માસ દરમિયાન લોહી પડે છે.	કદ્દાચ કસુવાવડ થઈ રહી છે. (આસ કરીને સાથે જે તમને સુવાવડનું દરદ હોય તેવો દુઃખાવો પણ થતો હોય તો)	ધ્યાન રાખો. જે લોહી વધારે પડતું પડે તો હોસ્પિટલમાં જાઓ. શક્ય તેટલો આરામ કરો.
હલકા ગુલાબી રંગનું પ્રવાહી સગર્ભાવસ્થાના પ્રથમ ત્રણ માસ દરમિયાન પડે અને સાથે કોઈ દુઃખાવો ના થતો હોય.	આ સામાન્ય પણ હોઈ શકે છે અથવા કસુવાવડ થવાની તૈયારી છે. એમ સૂચિત કરે છે.	ધ્યાન રાખો. જે લોહી વધારે પડતું પડે તો હોસ્પિટલમાં જાઓ. શક્ય તેટલો આરામ કરો.
યાદ રાખો : સગર્ભાવસ્થાના કોઈ પણ સમયમાં જે લોહી પડે તો તે એક ગંભીર લક્ષણ છે. તેની બરાબર કાળજી/સારવાર લેવાવી જોઈએ.		


૨.૨ ગર્ભપાત કે કસુવાવડ પછી લોહી પડે છે.

સમસ્યા	કારણ	શું કરશો ?
વધારે લોહી પડે કે ૧૫ દિવસથી લાંબું ચાલે અથવા દુઃખાવા અને તાવ સાથે લોહી પડે છે.	મેલીના ટૂકડા હજ ગર્ભાશયમાં રહી ગયા છે.	દ્વારાને-સ્વી રોગ નિષ્ણાતને ત્યાં જાઓ.
સામાન્ય માસિકની જેમ લોહી પડે છે. ૫-૧૫ દિવસ સુધીમાં ઓછુંને ઓછું થતું જય છે.	આ સામાન્ય છે. ચિંતા કરવી નહિ	ગર્ભપાત અને કસુવાવડ પ્રકરણ જુઓ.

૨.૩ શરીર સંબંધ (સમાગમ) પછી લોહી પડે છે.

સમસ્યા	કારણ	શું કરશો ?
જતીય સંબંધ પછી લોહી પડે છે.	<p>પોતીપ (ગર્ભાશયમાં કે ગર્ભદ્વાર પાસે પ્રવાહી ભરેલી પોચી પોટલી જેવું થયેલ છે.)</p> <p>જતીય રોગ (STD - જતીય સંબંધ દ્વારા ફેલાતો રોગ થયો છે.)</p> <p>પેદુમાં સોને છે. (PID)</p> <p>જબરદસ્તીથી સંબંધ કરવામાં આવ્યો છે.</p> <p>ગર્ભદ્વારનું કેન્સર કે ગર્ભાશયમાં ગાંઠો છે.</p>	<p>દ્વારાને-સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાતને પાસે જાઓ. (કેન્સર અને ગાંઠો પ્રકરણ જુઓ)</p> <p>ગોનોરિયા કે કલેમાઈડીયા વિશે વાંચો “પ્રજનન અંગોના ચેપ” પ્રકરણ વાંચો. “પ્રજનન અંગોના ચેપ” પ્રકરણ વાંચો. “બળાત્કાર અને જતીય હિંસા” પ્રકરણ જુઓ.</p> <p>કેન્સર અને ગાંઠો પ્રકરણ જુઓ સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાતની મદદ મેળવો.</p>

૨.૪ રજે નિવૃત્તિ પછી લોહી પડે છે.

સમસ્યા	કારણ	શું કરશો ?
રજે નિવૃત્તિ પછી કોઈપણ પ્રકારનું લોહી પડવું ભયજનક લક્ષણ છે. (આથું હોથ કે ખાલી ટીપાડ્ઝે જ લોહી પડતું હોથ તો પણ ગંભીર છે.)	<p>ગર્ભાશયની અંદર કેન્સર અથવા ગાંઠો હોઇ શકે છે.</p> <p>ગર્ભદ્વાર પર ગાંઠ થઈ છે જે કેન્સર પણ હોઇ શકે છે.</p> 	<p>આરોગ્ય કેન્દ્રમાં જાઓ યોનિ પરિક્ષા કરાવો અને સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાતની સલાહ લો. તમારે પેપ ટેસ્ટ કરાવવો જેઠાં કે કોથળી સાફ કરાવવી પડે. સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાત પાસે જાઓ.</p>

થોળિમાર્ગે લોહી પડવું.

૩.૦ પરિવર્તન માટે પ્રયાસ :

- ❖ મોટા ભાગે સ્ત્રીઓ પોતાના માસિક વિશે જાણતી હોવા છતાં વધારે કે ઓછું લોહી પડે તે માટે ફરિયાદ કરતાં અચકાય છે. દર મહિને “હવે આવતા મહિને જરૂર બરાબર થઈ જશે” એવા આશાવાદને કારણે અસામાન્ય ફેરફાર અંગે કહેતાં પહેલા જ ઘણો સમય નીકળી ગયો હોય છે. જ્યારે તેઓ તબીબોને ફરિયાદ કરે છે ત્યારે ડૉક્ટરની પાસે રોગની ગંભીરતા જાણવા માટે બેજ માપદંડ છે. પાંડુરોગનું પ્રમાણા, કેટલા સમયથી આવું થાય છે તે. જો તમે આરોગ્ય કાર્યકર હો તો તમારે સ્ત્રીઓને આ અંગે જાગ્રત કરવી જોઈએ અને પ્રથમ કે બીજા મહિને વધારે પડતું લોહી પડે (એક દિવસમાં બેથી વધુ વાર કાપડ બદલવું પડે) તો બનતી ત્વરાએ સારવાર આપવી જોઈએ. તમે આરોગ્ય કાર્યકર પાસેથી લોહતત્પની ગોળીઓ તો મેળવી જ લો અને તે ચાલુ કરી દઈ શકો છો.
- ❖ આ તકલીફ માટે ડૉક્ટરને ગંભીરતાપૂર્વક ફરિયાદ કરો અને સારવાર મેળવવાની કોશિશ કરો. બને ત્યાં સુધી સીધું લોહી ચડાવવાનું કહે તો તે ટાળી દો. આ રોગ માટે પ્રકરણમાં આપ્યા મુજબ તબક્કાવાર સારવાર લેવાની કોશિશ કરો.
- ❖ લોહી પડવું એક લક્ષણ છે માટે તે ક્યા રોગને કારણો થાય છે તે તપાસવું જરૂરી છે. તેને માટે સ્ત્રીઓને પેપેટેસ્ટ નિયમિત કરાવી શકાય તેની વ્યવસ્થા ગોઠવી કાઢો.
- ❖ સમયાંતરે પેપેટેસ્ટની સગવડ માટે સામૂદ્રાચિક સ્તરે કેમ્પ ગોઠવી બેનોને આ સુવિદા મળી રહે તે માટે પ્રયત્ન કરો. તમારી અથવા અન્ય સંસ્થાનો સહયોગ લેવો જરૂરી છે. કેન્સર સોસાયટી કે અમદાવાદની કેન્સર હોસ્પિટલના સહયોગથી પેપેટેસ્ટ માટેના કેમ્પ ગોઠવી શકાય છે.

