



ຍ້ອນຫຍັງເດັກຈຶ່ງສູນເສຍການໄດ້ຍິນ

ມີເດັກນ້ອຍນັບເປັນລ້ານໆຄົນໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ຫຼຸໜວກ ແລະ ມີບັນຫາໃນການໄດ້ຍິນ, ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ເກືອບທັງໝົດແມ່ນມີຖານະຍາກຈົນ. ໃນເດັກ 3 ຄົນທີ່ມີບັນຫາໃນການໄດ້ຍິນນັ້ນ, ປະມານ 2 ຄົນແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນປະເທດທີ່ທຸກຍາກ. ການທີ່ພວກເຂົາຫຼຸໜວກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ. ສຳລັບເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ ຄວາມຫຼຸໜວກຂອງພວກເຂົາສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານເຊັ່ນ: ອາຫານທີ່ດີ, ນ້ຳດື່ມສະອາດ, ສະຖານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ, ການເຂົ້າເຖິງການດູແລທາງສາທາລະນະສຸກ.

ໃນພາກນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສາເຫດ ແລະ ວິທີປິ່ນປົວ ສຳລັບບັນຫາໃນການໄດ້ຍິນບາງຊະນິດ. ເພື່ອປ້ອງກັນການຫຼຸໜວກ, ຊຸມຊົນຕ້ອງຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂສາເຫດທາງ ສັງຄົມ ທີ່ຍຸກຍາບໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້.

ສຸຂະພາບ ແລະ ການໄດ້ຍິນຂອງເດັກຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເມື່ອຊຸມຊົນມີອາກາດທີ່ບໍລິສຸດ (ປາສະຈາກຄວັນ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນ) ແລະ ການມີສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ, ປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ. ການສາທາລະນະສຸກທີ່ດີລວມໄປເຖິງການສຶກສາທາງດ້ານສະທາລະນະສຸກ, ການບໍ່ມີໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ, ການປິ່ນປົວພະຍາດຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກະແຈໄປສູ່ການປົກປ້ອງຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຍິນຂອງເດັກ.



ລາວມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງຫຼຸຫຼາຍຊະນິດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.



ລາວບໍ່ໄດ້ຮັບສານໄອໂອດີນພຽງພໍໃນນ້ຳ ແລະ ອາຫານ.



ແມ່ຂອງເຂົາບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານ ຢ່າງພຽງພໍເມື່ອລາວຕັ້ງຄັນ.



ລາວຕິດພະຍາດໝາກແດງ

ຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດ

ບາງຄົນມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ເດັກຫຼຸໜວກຍ້ອນ ພໍ່ແມ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຜິດ, ອີກຈຳນວນໜຶ່ງເຊື່ອວ່າເດັກຫຼຸໜວກຍ້ອນມີຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເຮັດໄສຍະສາດໃສ່ແມ່ຂອງເດັກ ແລະ ເດັກກໍຕ້ອງຄຳສາບເວດມິນຄາຖາ. ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກຫຼຸໜວກ.

ຫູເຮັດວຽກແນວໃດ

ຫູປະກອບມີ 3 ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຄື: ຫູພາກສ່ວນນອກ, ຫູພາກສ່ວນກາງ ແລະ ຫູພາກສ່ວນໃນ. ຫູພາກສ່ວນນອກ: ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້. ຫູພາກສ່ວນກາງ: ແລະ ພາກສ່ວນໃນແມ່ນ: ຢູ່ພາຍໃນຫົວ ແລະ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້. ທັງສາມພາກສ່ວນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກສາດມາດໄດ້ຍິນ.



ຫູພາກສ່ວນນອກຮັບສຽງ.

ສຽງເຄື່ອນໄປຕາມຮູຫູ ແລະ ແກ້ວຫູໄປສູ່ພາກສ່ວນກາງ.

ຈາກນັ້ນຫູພາກສ່ວນໃນຈຶ່ງສົ່ງສຽງດັ່ງກ່າວໄປຫາສະໝອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຍິນ.

ສະໝອງຊ່ວຍໃຫ້ເດັກເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງສຽງ


ບັນຫາໃນພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຫູສາມາດເປັນສາເຫດຂອງຫູໝວກ

ບັນຫາໃນຫູພາກສ່ວນນອກ ແລະ ພາກສ່ວນກາງ:

- ຫູຕິດເຊື້ອ
- ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງກົດຂວາງບໍ່ໃຫ້ສຽງເຄື່ອນຜ່ານຫູ
- ການບາດເຈັບ

ບັນຫາໃນຫູພາກສ່ວນໃນ ແລະ ເສັ້ນປະສາດສາດນຳໄປສູ່ສະໝອງ:

- ການຕິດເຊື້ອໃນໄລຍະຕັ້ງຄັນ
- ສະໝອງຂອງເດັກຖືກທຳລາຍ ໃນໄລຍະການປະສູດ ຫຼື ເກີດ.
- ຄວາມເຈັບປວດໃນໄວເດັກເຊັ່ນ: ເຫຍື້ອສະໝອງ ອັກເສບ
- ການຂາດສານໄອໂອດິນໃນອາຫານຂອງແມ່ໃນໄລຍະຕັ້ງຄັນ
- ຢ່າຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ທຳລາຍການໄດ້ຍິນ
- ຄວາມຫູໝວກທີ່ສືບທອດພາຍໃນຄອບຄົວ (ກຳມະພັນ)
- ຖືກທຳລາຍຈາກສຽງດັງ



ຫຼຸຕິດເຊື້ອ

ຫຼຸຕິດເຊື້ອແມ່ນພະຍາດທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍໆໃນເດັກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ມັນເປັນສາເຫດຂອງການ ສູນເສຍການໄດ້ຍິນຢ່າງຖາວອນ. ຫຼຸຕິດເຊື້ອສ່ວນ ຫຼາຍແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຕິດເຊື້ອຢູ່ດັງ ແລະ ຄໍ. ການຕິດເຊື້ອຈຶ່ງຂະຫຍາຍຈາກຄໍລົງໄປຫາຮູຫູໃນຫູ ພາກສ່ວນກາງ, ເດັກຕິດເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຮູທີ່ເຊື້ອມຈາກຄໍໄປຫາຫູແມ່ນສັ້ນກວ່າ ຂອງຜູ້ໃຫຍ່. ເມື່ອຫູຖືກຕິດເຊື້ອ, ຂອງແຫຼວ ແລະ ເຊື້ອ ພະຍາດຈະບໍ່ສາມາດລະບາຍອອກຈາກຫູພາກສ່ວນ ກາງ ແລະ ເມື່ອເດັກເປັນໄຂ້, ຮູຈາກຄໍທີ່ພາໄປສູ່ຫູພາກ ສ່ວນກາງແມ່ນຈະຖືກກັ້ນໄວ້. ແຕ່ເມື່ອເດັກໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ແຂງແຮງຂຶ້ນແລ້ວ ພວກເຂົາຈະພັດທະນາພູມ ຕ້ານທານ ແລະ ເປັນໄຂ້, ມີຄໍຕິດເຊື້ອໜ້ອຍລົງ.



ຫຼຸຕິດເຊື້ອຢ່າງກະທັນຫັນ (ຮຸນແຮງ)

ການຕິດເຊື້ອທີ່ຫຼຸຢ່າງກະທັນຫັນໃນຫູພາກສ່ວນ ກາງ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນທຸກໄລຍະອາຍຸ ແລະ ມັນ ເປັນເລື່ອງບົກກະຕິໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກອ່ອນ. ເດັກອາດຈະຮ້ອງໄຫ້, ຮູສຶກລະຄາຍເຄືອງ ແລະ ມີໄຂ້. ໂດຍພົບເຫັນເລື້ອຍໆແມ່ນການຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວຈະ ເຊົາພາຍໃນ 1 ຫຼື 2 ມື້ ໂດຍບາສະຈາກການປິ່ນປົວ. ຢາແກ້ປວດອາດຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ ປິ່ນປົວ ການຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄວາມຈຳ ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ ເພື່ອປິ່ນປົວການຕິດ ເຊື້ອ. ເຫຍື່ອແກ້ວຫູ ອາດໂພງຂຶ້ນ ແລະ ມີນ້ຳໜອງໄຫຼ ອອກມາຈາກຮູນ້ອຍໆ. ແຕ່ຮູເຫຼົ່ານີ້ຈະດີຂຶ້ນຢ່າງ ໄວວາ.

ຫຼຸຕິດເຊື້ອແບບຍາວນານ (ຊຳເຮື້ອ)

ຖ້າຫາກເດັກບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ເມື່ອມີຫຼຸຕິດເຊື້ອ ຢ່າງກະທັນຫັນ ຊຳໆຫຼາຍຄັ້ງ. ຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດ ເຊື້ອແກ່ຍາວຊຳເຮື້ອ. ຫຼຸຕິດເຊື້ອຈະແກ່ຍາວຊຳເຮື້ອ ຖ້າຫາກມີນ້ຳໜອງໄຫຼອອກມາຈາກຫູ ແລະ ແກ່ຍາວ ເປັນເວລາ 14 ວັນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ເຊິ່ງນີ້ ມັນຈະທຳ ລາຍເຍື່ອແກ້ວຫູ. ເຍື່ອແກ້ວຫູອາດຖືກດຶງເລິກເຂົ້າໄປ ໃນ ຫຼື ມີຮູນ້ອຍທີ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາໄດ້. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ອາດນຳໄປສູ່ການຕິດເຊື້ອ.

ຖ້າບາສະຈາກການປິ່ນປົວທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ທັນ ເວລາ, ເດັກອາດຈະສູນເສຍການໄດ້ຍິນ, ທໍລະມານ ກັບອາການມືນ, ການເຈັບປວດຂອງໃບໜ້າຂ້າງໃດ ຂ້າງໜຶ່ງ ຫຼື ມີຜິທີ່ມີນ້ຳໜອງໄຫຼອອກມາຢູ່ລຸ່ມ ແລະ ຫຼັງຫູ ບາງຄັ້ງ ຫຼຸຕິດເຊື້ອອາດເປັນສາເຫດໃຫ້ການ ເຈັບເປັນທີ່ຮ້າຍແຮງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ສະໝອງໂພງ ຫຼື ເຫຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ.

ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຖານະຍາກຈົນຫຼາຍຄົນສູນເສຍການ ໄດ້ຍິນ ຍ້ອນການຕິດເຊື້ອຂອງຫູຫຼາຍກວ່າຈາກສາ ເຫດອື່ນ. ການສູນເສຍການໄດ້ຍິນອັນເນື່ອງມາຈາກຫູ ຕິດເຊື້ອນີ້ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ໂດຍການປັບປຸງເງື່ອນ ໄຂທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ໂດຍການເຂົ້າຫາລະບົບສາທາລະນະສຸກ. ຊຸມຊົນທຸກ ແຫ່ງຄວນມີບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກເພື່ອກວດເບິ່ງອາ ການຫຼຸຕິດເຊື້ອຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ມີຄືນກູ ຫຼື ໂຮງໝໍທີ່ ສາມາດເຂົ້າໄປປິ່ນປົວໄດ້ໃນລາຄາຖືກ ແລະ ສະດວກ ສະບາຍ.



ຂີ້ຫູ (Glue ear)

ບາງຄັ້ງ ຫຼັງຈາກການຕິດເຊື້ອຢູ່ຫູຢ່າງກະທັນຫັນ ແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຂອງແຫຼວທີ່ໜຽວ ແລະ ແຂງລວມກັນຢູ່ທີ່ຫູພາກສ່ວນກາງ (ນີ້ເອີ້ນວ່າ: ຂີ້ຫູກາວ (Glue ear). ໂດຍທົ່ວໄປ ຂີ້ຫູຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດ ແລະ ບໍ່ໄຫຼລົງໄປທາງຮູທີ່ເຊື້ອມເຖິງດັງ ຫຼັງຈາກ 2-3 ອາທິດ. ແຕ່ບາງຄັ້ງມັນກໍ່ກິນເວລາເປັນປົງ. ຍິ່ງດົນຂີ້ຫູຍິ່ງສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ຫູທັງສອງຂ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກຫູໜວກບາງສ່ວນ. ກໍ່ລະນີຂອງອາການມີຂີ້ຫູເກືອບທັງໝົດຈະດີໄປເອງ ໂດຍປາສະຈາກການປິ່ວປົວ. ແຕ່ຖ້າຫາກມີອາການເຈັບ, ໃຫ້ກິນຢາຕ້ານເຊື້ອ ເໝືອນກັບການຕິດເຊື້ອແບບກະທັນຫັນ.

ສັນຍານຂອງຫູຕິດເຊື້ອ:


- ອາການເຈັບ ເດັກນ້ອຍອາດຮ້ອງໄຫ້, ລະຄາຍເຄືອງ ຫົວຂ້າງນັ້ນ ຫຼື ດົງຫູຕົນເອງ.
- ເປັນໄຂ້ ອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 38° ແລະ 40°.
- ຂີ້ມູກໄຫຼ, ເຈັບຄໍ ແລະ ໄອ.
- ມີຂອງແຫຼວໄຫຼອອກມາຈາກຫູ, ອາດຈະມີສີເຫຼືອງ, ສີຂາວ, ໃສ ຫຼື ຂຸ້ນໜຽວ. ໃນຂອງແຫຼວດັ່ງກ່າວອາດມີເລືອດຕິດມາພ້ອມ. ຂອງແຫຼວທີ່ໃສ ແລະ ໜຽວທີ່ໄຫຼອອກມາຫຼາຍ ອາດຈະມາຈາກຮູໃນເທຍື່ອແກ້ວຫູ. ຂອງແຫຼວເຫຼົ່ານີ້ອາດຢຸດເມື່ອກິນຢາ ແຕ່ຈະເກີດຂຶ້ນທຸກໆຄັ້ງທີ່ເດັກໄຂ້ ຫຼື ເມື່ອຫູຂອງເຂົາຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ ຫຼື ເມື່ອລອຍນ້ຳ.
- ຂອງແຫຼວທີ່ມີກິ່ນ ສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີຂຽວທີ່ໄຫຼອອກ

ມາບໍ່ຫຼາຍແມ່ນອາດມາຈາກການທີ່ເທຍື່ອ ແກ້ວຫູຖືກທໍາລາຍ. ອາດຈະຕ້ອງມີການຜ່າຕັດ ເພື່ອປິ່ວປົວເທຍື່ອແກ້ວຫູ.

- ການສູນເສຍການໄດ້ຍິນຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນໃນຫູຂ້າງໃດໜຶ່ງ.
- ບາງຄັ້ງກໍ່ມີອາການວິນຫົວ ປວດຮາກ ແລະ ຮາກ.
- ບາງຄັ້ງການຕິດເຊື້ອແຜ່ລາມໄປຮອດກະດູກດ້ານຫຼັງຫູ (mastoiditis). ຖ້າເປັນແບບນີ້ມັນຈະເຈັບປວດຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ກິນຢາຕ້ານເຊື້ອ (antibiotics). ໄປໂຮງໝໍ!

ສັນຍານທີ່ແຕກຕ່າງອາດສະແດງໃຫ້ຮູ້ໃນເວລາຕ່າງກັນ ຕົວຢ່າງ: ອາການເຈັບປວດອາດຈະເຊົາ ເມື່ອມີຂອງແຫຼວເລີ່ມໄຫຼອອກຈາກຫູ.

ກວດກາເບິ່ງຫູໃນໄລຍະ 3 ຫາ 4 ເດືອນ ຫຼັງຈາກຫູຕິດເຊື້ອ, ເຖິງວ່າມັນບໍ່ມີອາການເຈັບປວດກໍ່ຕາມ ແລະກວດກາເບິ່ງການໄດ້ຍິນຂອງເດັກ.



ການປ້ອງກັນຫຼຸດຕິດເຊື້ອ

ເພື່ອປ້ອງກັນຫຼຸດຕິດເຊື້ອ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຈົ່ງໃຫ້ເດັກກິນນົມແມ່ເປັນເວລາ 2 ປີ. ນົມແມ່ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຕ້ານທານກັບການຕິດເຊື້ອໄດ້. ການກິນນົມແມ່ຍັງຊ່ວຍເຄັ່ງກ້າມຊີ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູລະຫວ່າງຄໍ ແລະ ຫູພາກສ່ວນກາງເປີດ.



ວິທີອື່ນໆເພື່ອປ້ອງກັນຫຼຸດຕິດເຊື້ອ

- ຖ້າເດັກຖືກປ້ອນດ້ວຍແກ້ວ ຫຼື ຈອກ, ຈົ່ງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຫົວຂອງເດັກຢູ່ສູງກວ່າທ້ອງຂອງເຂົາເມື່ອທ່ານປ້ອນນົມເດັກ ຖ້າເດັກນອນລົງເມື່ອຖືກປ້ອນ, ນົມສາມາດໄຫຼຈາກຄໍຂອງເດັກໄປຫາຮູທີ່

ເຊື້ອມເຂົ້າຫາຫູພາກສ່ວນກາງ ແລະ ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອໄດ້.

- ສອນໃຫ້ເດັກເຊັດດັງ ເມື່ອມີນ້ຳມູກແທນທີ່ຈະສັ່ງມັນອອກ. ຖ້າຈະສັ່ງກໍ່ໃຫ້ເຮັດຢ່າງຄ່ອຍໆລະມັດລະວັງ.
- ພະຍາຍາມໃຫ້ເດັກຢູ່ຫ່າງຈາກຄວັນ ລວມທັງຄວັນຈາກເຕົາໄຟ ແລະ ຄວັນໄຟຈາກການແຕ່ງກິນ. ຄວັນອາດເຮັດໃຫ້ຊ່ອງທີ່ເຊື້ອມລະຫວ່າງຄໍ ແລະ ຫູພາກສ່ວນກາງໂພງຂຶ້ນ ແລະ ອັດ. ຈາກນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ຂອງແຫຼວກໍ່ຕົວຂຶ້ນໃນຫູພາກສ່ວນກາງ ແລະ ມັນສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້.
- ເມື່ອເດັກເປັນໄຂ້, ຈົ່ງກວດເບິ່ງວ່າເຂົາເຈັບຫູນຳບໍ່. ຈົ່ງພະຍາຍາມໃຫ້ເດັກຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນທີ່ເປັນໄຂ້ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.

ບາງສິ່ງກົດຂວາງບໍ່ໃຫ້ສຽງເຄື່ອນຜ່ານຫູ

ເດັກອາດສູນເສຍການໄດ້ຍິນແບບຊົ່ວຄາວໄດ້ ຖ້າຫາກມີສິ່ງໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ຂີ້ຫູທີ່ແຂງ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນມາກົດຂວາງສຽງບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນຜ່ານຫູ.

ກ້ອນຂີ້ຫູ

ຂີ້ຫູສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຂັ້ນປົກປ້ອງຜິວໜັງທີ່ບອບບາງພາຍໃນຫູ, ຮັກສາໃຫ້ຫູສະອາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງກັນນ້ຳ. ໂດຍປົກກະຕິມັນຈະຄ່ອຍໆເຄື່ອນອອກມາຈາກຫູ ແລະ ພາເອົາຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນຕິດອອກນຳ. ແຕ່ບາງຄັ້ງຂີ້ຫູກໍ່ແຂງຂຶ້ນ ແລະ ຕິດກັບຫູ. ເຊິ່ງນີ້ອາດເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການທຳຄວາມສະອາດຫູ ໂດຍໃຊ້ສຳລິແຍ່ຫູ (ໄມ້ນ້ອຍໆ ທີ່ຕິດສຳລິຢູ່ປາຍ) ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆ ຊຸກໃຫ້ຂີ້ຫູເຂົ້າໄປເລິກໃນຮູຫູ, ຂີ້ຫູທີ່ຕິດກັນເປັນກ້ອນນີ້ ເຮັດໃຫ້ສຽງບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອ.

ສັນຍານ:

- ເດັກໄດ້ຍິນບໍ່ດີຄືປົກກະຕິ.

- ບາງຄັ້ງທ່ານສາມາດສັງເກດເຫັນກ້ອນຂີ້ຫູຢູ່ໃນຫູ.
- ບາງຄັ້ງຂີ້ຫູ ຫຼື ການຕິດເຊື້ອບໍລິເວນດັ່ງກ່າວອາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເດັກມີອາການ ເຈັບຫູ ແລະ ມີນ້ຳໜອງໄຫຼອອກມາ.

ການມີຂີ້ຫູໜ້ອຍໜຶ່ງ ແມ່ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ຄວນຈັບຕ້ອງມັນ.

ຈົ່ງຊອກຫາຄຳແນະນຳທາງແພດສຳລັບກ້ອນຂີ້ຫູທີ່ແຂງ ແລະ ບໍ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຈະຂັດຂວາງການໄດ້ຍິນຂອງເດັກ.



ແນງໄມ້ເຂົ້າຫູ

ສັນຍານ:

- ເດັກອາດເວົ້າວ່າເຂົາຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຍິນສຽງຂູດ, ໄຕ່ ຫຼື ເຄື່ອນເໜັງ ຢູ່ໃນຫູ.
- ຂອງແຫຼວ ຫຼື ນ້ຳໜອງອາດໄຫຼອອກຈາກຫູ.
- ເດັກອາດບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນດີເໝືອນປົກກະຕິໃນຫູຂ້າງທີ່ໄດ້ ຮັບ ຜົນກະທົບ.



ເນື້ອນິແນງໄມ້ເຂົ້າຫູ

ໃຫ້ເອົານ້ຳແຮ່ ຫຼື ນ້ຳມັນພືດໃສ່ຫູ. ແນງໄມ້ອາດຈົມລົງ ແລະ ໄຫຼອອກມາ.

ການຂາດທາດໄອໂອດິນ (Iodine) ໃນຮ່າງກາຍໃນໄລຍະຖືພາ

ທາດໄອໂອດິນ ແມ່ນທາດແຮ່ຈຳນອນທີ່ພົບໃນດິນ, ນ້ຳ ແລະ ໃນອາຫານເຊັ່ນ: ຕັບ, ຜັກປົວ, ໄຂ່ແດງ, ອາຫານທະເລ ແລະ ພືດຈາກທະເລ. ເມື່ອແມ່ຍິງ ຜູ້ທີ່ຖືພານັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບສານໄອໂອດິນ ທີ່ພຽງພໍແລ້ວ. ລູກຂອງເຂົາ ອາດຈະເກີດມາພ້ອມກັບການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ຊ້າ ຫຼື ອາດມີບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງອື່ນໆ ລວມທັງຄວາມພິການທາງຫູນຳ.

ພະຍາດຄໍໜຽງ



ໃນບາງເຂດຂອງໂລກ ດິນບັນຈຸສານອີອີດ ຢູ່ໃນທຳມະຊາດໜ້ອຍຫຼາຍ, ສະນັ້ນ ບັນດາປະເພດຜັກ ແລະ ພືດພັນຕ່າງໆທີ່ປູກໃນດິນ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍ່ບັນຈຸສານໄອໂອດິນໜ້ອຍເຊັ່ນກັນ. ໃນບັນດາສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ ການທີ່ມີຕອມຄໍໜ້ອຍ ຢູ່ໃນຄໍນັ້ນ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງ ທຳມະດາ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ເອີ້ນວ່າ: ພະຍາດຄໍໜຽງ. ຖ້າຫາກ ຫຼາຍໆຄົນທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນນັ້ນ ຫາກມີສິ່ງດັ່ງກ່າວ

ນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ທຸກໆຄົນແມ່ນຕ້ອງການ ທາດໄອໂອດິນ ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການປ້ອງກັນ:

ພະຍາດຄໍໜຽງ ແລະ ການຂາດທາດໄອໂອດິນ ແມ່ນງ່າຍດາຍ ແລະ ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍໃນການປ້ອງກັນ. ແມ່ຍິງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບສານໄອໂອດິນ ທີ່ພຽງພໍກ່ອນການຖືພາ. ການທີ່ໄດ້ຮັບສານໄອໂອດິນ ຫຼັງຈາກສອງສາມເດືອນທຳອິດຂອງການຖືພານັ້ນ ແມ່ນ ຊ້າເກີນໄປເສຍແລ້ວ.

ວິທີການທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສານໄອໂອດິນ ທີ່ພຽງພໍນັ້ນ ແມ່ນການໃຊ້ສານໄອໂອດິນແທນເກືອຈາກທຳມະຊາດ ຫຼື ເກືອທີ່ມາຈາກຫີນ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຊອກຫາຊື້ເກືອໄອໂອດິນໄດ້ໃນເກືອບທຸກບ່ອນ.



ອາຫານທະເລຈາກມະຫາສະໝຸດ, ຕັບ, ໄຂ່ແດງ ແລະ ຜັກປົວ ທີ່ບັນຈຸສານໄອໂອດິນ ຫຼາຍ.

ການຖືກບາດເຈັບ

ເດັກສາມາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ທູຂອງເຂົາ ມີການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຖືກແທງເປັນບາດແຜໄດ້. ຖ້າຫາກ ເຂົາໄດ້ນຳເອົາວັດຖຸທີ່ແຫຼມຄົມ (ເຊັ່ນ: ໄມ້ຂິດໄຟ, ຂົນສັດ ຫຼື ສີ່) ເຂົ້າໄປໃນທູຂອງເຂົາ. ຫາກບາດແຜດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຫາກຈືກໜ້ອຍ, ແຜ່ນເຈ້ຍຫຼືສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ ແລະ ການໄດ້ຍິນຂອງເດັກກໍ່ຈະກັບຄືນມາສູ່ສະພາບປົກກະຕິ. ແຕ່ຖ້າຫາກເຈ້ຍຫຼືຖືກທຳລາຍຫຼາຍ, ມັນອາດຈະບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຟັງຂອງເດັກກໍ່ຈະສູນເສຍໄປ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ຢູ່ໃນທູເບື້ອງນັ້ນ.

ການຕົບໜ້າ ຫຼື ການຊຸກຫົວ ເບື້ອງກົງກັນຂ້າມກັບທູ ສາມາດກະທົບຕໍ່ເຈ້ຍທູຂອງເຂົາໄດ້ ແລະ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ພິການທາງທູໄດ້.

ການທີ່ຫົວຖືກບາດເຈັບ ແລະ ຫົວແຕກຈາກການກະທົບນັ້ນ ສາມາດເປັນສາເຫດທີ່ຮ້າຍແຮງ ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍການຟັງໄປໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ ສຽງລະເບີດ ແຕກ ແລະ ສຽງດັງອື່ນທີ່ດັງຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນ ສາມາດ



ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ເຈ້ຍທູໄດ້.

ການປ້ອງກັນ:

- ສອນໃຫ້ເດັກບໍ່ໃຫ້ເອົາວັດຖຸສິ່ງຂອງເຂົ້າໄປໃນທູຂອງພວກເຂົາ.
- ບໍ່ໃຫ້ຕີຫົວຂອງເດັກ ຫຼື ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວລົງ.

ການສູນເສຍການຟັງນັ້ນ ແມ່ນພິການສືບທອດພາຍໃນຄອບຄົວ

ທູຂອງເດັກບາງຄົນບໍ່ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງເຕັມທີ່. ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳເນີດນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການສືບທອດມາພາຍໃນຄອບຄົວ, ການສືບທອດມາຈາກສະມາຊິກຄອບຄົວ ຈາກຮຸ່ນຕໍ່ຮຸ່ນກັນມາ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີໃຜອີກແລ້ວ ທີ່ມີອາການພິການທາງທູແລ້ວກໍ່ຕາມ.

ການປ້ອງກັນ:

ຫຼືກລ່ຽງການແຕ່ງງານລະຫວ່າງສາຍເລືອດ ພີ່ນ້ອງດຽວກັນເຊັ່ນ: ລູກອ້າຍລູກນ້ອງ. ປົກສາ ກ່ຽວກັບການເກີດ (ຜູ້ທີ່ຮູ້ດີກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດທີ່ແມ່ນອນໃດໜຶ່ງທີ່ຖືກຖ່າຍທອດຈາກ ພໍ່ແມ່ ຂອງພວກເຂົາມາສູ່ເດັກ.) ແມ່ນມີຢູ່ໃນບາງຕົວເມືອງ. ຈຶ່ງ

ພະຍາຍາມປົກສາກັບພະນັກງານແພດໝໍ ຖ້າທ່ານຫາກມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍການຟັງຢູ່ພາຍໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ.



ເລື່ອງຂອງ ຮຸກ

ເມື່ອ ຮຸກ ເກີດຢູ່ໃນບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນປະເທດ ເນປານ, ແມ່ຂອງລາວໃຊ້ເວລາດົນພໍສົມຄວນໃນການໃຫ້ກຳເນີດນັ້ນ, ຕອນທຳອິດ ນາງຄິດວ່າ ລູກຂອງນາງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ແລ້ວ. ຮຸກ ຈະຮ້ອງໄຫ້ໃນຕອນກາງຄືນ ແລະ ເຂົ້າຄ້າຍຄືວ່າ ໜາວ ຫຼື ເປັນໄຂ້



ຫວັດສະເໝີ.
ຮຸກ ຫລິ້ນ
ໃນພື້ນທີ່
ເປື້ອນເປີ ແລະ

ຂ້າງນອກເຮືອນບ່ອນທີ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາຕາກເຂົ້າຝ້າງ, ສາລີ ແລະ ແຍກເມັດເຂົ້າອອກຈາກເພື່ອງເຂົ້າ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນ. ໄກ່, ແບ້ ແລະ ໝາຂອງພວກເຂົາແມ່ນອາໄສຢູ່ສະຖານທີ່ແຄບໆອັນດຽວກັນ. ຮຸກ ມັກນັ່ງເບິ່ງແມ່ ຂອງລາວແຕ່ງົນຢູ່ເຕົາໄຟ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວັນໄຟຈະເຮັດໃຫ້ຕາຂອງລາວແສບ ແລະ ຂີ້ມູກ ໄຫຼກໍ່ຕາມ.

ເມື່ອ ຮຸກ ເຕີບໃຫ່ຍຂຶ້ນມາລາວຄ້າຍຄືວ່າມີຂີ້ມູກຍ້ອຍຢູ່ຕະຫຼອດ, ບາງຄັ້ງເຂົາກໍ່ມີອາການເຈັບບວດຫຼືທັງສອງເບື້ອງນັ້ນຢ່າງຮຸນແຮງພ້ອມກັບໄດ້ມີນ້ຳໜອງ

ໄຫຼອອກມາສະເໝີ. ເຂົາມັກທີ່ຈະລອຍນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳນ້ອຍສາຍໜຶ່ງທີ່ຢູ່ກ້ອງບ້ານຂອງເຂົາ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜອງໃນຫູໄຫຼອອກມາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເມື່ອ ຮຸກ ເລີ່ມເຂົ້າໂຮງຮຽນລາວມີການຮຽນຮູ້ທີ່ຊ້າ ແລະ ການອ່ານຂອງລາວ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍດີພໍປານໃດ ຄູສອນຂອງລາວຢາກຮ້າຍ ເພາະວ່າ ເຂົາຄິດວ່າ ຮຸກ ກຳລັງປະຕິເສດ ຫຼື ບໍ່ຟັງໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເວົ້າ. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວມັນເປັນການຍາກສຳລັບ ຮຸກ ທີ່ຈະໄດ້ຍິນ ຄູຂອງລາວເວົ້າ. ສະນັ້ນ ເພື່ອເປັນການຫຼີກລ່ຽງບັນຫາທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ. ຮຸກ ໄດ້ຍ້າຍບ່ອນໄປນັ່ງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງສຸດຂອງຫ້ອງຮຽນ, ເດັກຄົນອື່ນຍຸແຫຍ່ ຢອກເຂົາ ແລະ ເຂົາກໍ່ເວົ້າແບບເປັນຕາຢາກຫົວ ແລະ ກໍ່ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້.

ສຸດທ້າຍແມ່ຂອງ ຮຸກ ກໍ່ຕັດສິນໃຈວ່າ: ມັນບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດເລີຍທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນຊື້ຊຸດນັກຮຽນ, ປຶ້ມ ແລະ ບິກຂອງລາວ, ຖ້າລາວບໍ່ຮຽນ. ຮຸກ ຈຶ່ງອອກຈາກໂຮງຮຽນ ມາຊ່ວຍແມ່ຂອງລາວຊອກຫາພື້ນມາດັ່ງໄຟ ໃຫ້ອາຫານສັດ ແລະ ຜັດໝໍ້.

ຍ້ອນຫຍັງ ຮຸກ ຈຶ່ງອອກຈາກໂຮງຮຽນ?

ຮຸກ ສຸດທີ່ຢາກໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ໄດ້ຄືກັນກັບເດັກຄົນອື່ນ, ເດັກຜູ້ທີ່ສູນເສຍການຟັງໄປນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນຄົນທີ່ຂາດຄວາມສາມາດ, ເມື່ອຄູ, ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນບໍ່ຮູ້ວິທີຈະສື່ສານກັບພວກເຂົາ. ຖ້າຫາກໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູຮູ້ວ່າ ບໍ່ສາມາດຮັບຟັງໄດ້ດີ ພວກເຂົາອາດ ຈະພະຍາຍາມສື່ສານກັບລາວ ໃນວິທີຕ່າງໆ ແລະ ພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກຄົນອື່ນໆ ເຂົ້າໃຈເຖິງການຕິດເຊື້ອທາງຫູ ແລະ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເດັກສູນເສຍການຟັງຂອງພວກເຂົາໄດ້. ຖ້າຫາກໂຮງຮຽນໄດ້ຍອມຮັບ ຮຸກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລາວໃນການຮຽນຮູ້ ລາວກໍ່ຈະມີໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ດີກວ່າ.

ມື້ໜຶ່ງ ຮຸກ ໄດ້ມີອາການເຈັບຫູຢ່າງຮຸນແຮງ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ຫຼາຍມື້ຕໍ່ມາ ຫູຂອງລາວ ກໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳໜອງ ແລະ ໄດ້ມີອາການບວມຢູ່ທາງເບື້ອງຫຼັງຫູຂອງລາວ, ສຸດທ້າຍໄດ້ນຳເອົາລາວໄປຫາໝໍຢາພື້ນເມືອງ ແຕ່ຢາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອາການບວມຂຶ້ນນັ້ນຫາຍໄປໄດ້. ພໍ່ຂອງລາວຈຳຕ້ອງໄດ້ນຳເອົາລູກໄປສຸກສາລາທີ່ຢູ່ໃນບ້ານອື່ນ. ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃນຖິ່ນນັ້ນ ໄດ້ບົບຕຸ່ມຜິທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງກົກຫູຂອງ ຮຸກ ແລະ ໄດ້ສັກຢາໃຫ້ລາວ ພ້ອມທັງໄດ້ໃຫ້ຢາປະຕິຊີວະນະນ້ຳເມືອກ ເປັນເວລາ 1 ອາທິດ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄລຍະໜຶ່ງ, ຮຸກ ກໍ່ມີອາການເຈັບທີ່ຮຸນແຮງອີກ, ຫູທັງສອງຂ້າງຂອງລາວໄດ້ມີກິ່ນເໝັນ ແລະ ມີນ້ຳໜອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ໄຫຼອອກມາຈາກຫູທັງສອງຂ້າງນັ້ນ. ຄໍຂອງລາວໄດ້ໂພງຂຶ້ນ ແລະ ລາວກໍ່ມີໄຂ້ສູງ. ພະນັກງານທີ່ປະຈຳຢູ່ສຸກສາລານັ້ນ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພວກເຂົານຳເອົາລູກໄປໂຮງໝໍທີ່ຢູ່ໃນເມືອງພຸ້ນ. ພໍ່ແມ່ຂອງ ຮຸກ ມີເງິນໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາຈະພັກຢູ່ໃສເມື່ອເຂົ້າໄປໃນເມືອງ. ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງພະນັກງານສຸກສາລານັ້ນ.

ຮຸກ ເກືອບເສຍຊີວິດ ເພາະການຕິດເຊື້ອໄດ້ເຂົ້າໄປສູ່ມັນສະໝອງ ແລະ ກະແສເລືອດຂອງລາວ ແລ້ວ, ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍນັ້ນ ພວກເຂົາໄດ້ວາງຢາໃຫ້ຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ລາວກໍ່ຍັງເປັນໄຂ້ຫຼາຍຢູ່. ໂຊກດີທີ່ໄດ້ມີທ່ານໝໍທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບຫູຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ລະບາຍນ້ຳໜອງອອກຈາກອາການໃຄ່ບວມນັ້ນ ແລະ ໄດ້ນຳເອົາຊາກທີ່ຕິດເຊື້ອອອກ ແລະ ສ້ອມແຊມແກ້ວຫູຂອງລາວຄືນ,

ທ່ານໝໍຄົນດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງວິ
ທີການດູແລ
ແລະ ຮັກສາຫູ
ຂອງລູກ ແລະ
ເວົ້າວ່າ ລູກຂອງ
ພວກເຂົາຄວນ
ໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍ
ໃນການຟັງ. ພໍ່ແມ່ຂອງ ຮຸກ ແນມໄປທີ່ໃບໜ້າຂອງ
ທ່ານໝໍ ແລ້ວກໍ່ຖືກຫົວຕົກລົງ.



ຂ້ອຍພະນັນວ່າ: ຄວັນ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ຂີ້ ມູກຂອງລາວໄຫຼ ແລະ ຕາຂອງລາວເຈັບ.

ບາງເທື່ອ ລາວອາດຈະສູນເສຍ ການຟັງຂອງລາວ ຕອນທີ່ມີ ຄວາມ ຫຍັງ ຍາກໃນການເກີດນັ້ນ.

ລາວເປັນໄຂ້ ແລະ ຮູ້ສຶກໜາວ ຫຼາຍ ແລະ ຄອບຄົວລາວກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າ: ຫູທີ່ ຕິດເຊື້ອນັ້ນ ສາມາດ ທຳລາຍການຟັງຂອງລາວໄດ້.

ຄຳຊາຍ, ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງ ຄິດວ່າ ຮຸກ ໄດ້ສູນເສຍການ ຟັງຂອງລາວໄປແລ້ວ?

ບໍ່ມີພະນັກງານສຸກສາ ລາ ທີ່ຢູ່ໃກ້ນີ້ຈັກຄົນ ເລີຍ! ເພື່ອບອກ ພວກ ເຂົາວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດ?



ພໍ່ແມ່ຂອງ ຮຸກ ຄວນຈະໄປຫາ
ພະນັກງານ ສຸກສາລາ ກ່ອນທີ່
ລາວຈະສູນເສຍການຟັງໄປ.

ແມ່ນແລ້ວ! ແຕ່ຖ້າຫາກພະນັກງານສຸກສາລາມາທີ່ບ້ານ
ແລະ ສອນໃຫ້ທຸກຄົນ ກູ່ວກັບ ບັນດາສາເຫດຂອງການພິ
ການທາງຫູ, ພວກປະຊາຊົນ ກໍ່ຈະຮູ້ວ່າຄວນເຮັດແນວໃດ.

ຖ້າພວກເຮົາສາມາດປູກ
ຜັກ ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອການ
ບໍລິໂພກ ແລະ ເດັກກໍ່ຈະ
ບໍ່ເປັນໄຂ້ ຫຼາຍ.

ແລະຖ້າຄ່າຢາຖືກກວ່າ
ເກົ່າ ພວກເຂົາກໍ່ອາດ
ຈະໄດ້ຮັບມັນໄວກວ່າ.

ບາງເທື່ອ ບ້ານຂອງພວກເຮົາກໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງວິທີທີ່ຈະນຳເອົາເດັກໄປ
ໂຮງໝໍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເມື່ອພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການ.

ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອເດັກສູນເສຍການໄດ້ຍິນ?

ມີຄວາມສາມັກຄີໃນຊຸມຊົນ, ເຮັດວຽກເພື່ອການ
ພັດທະນາ. ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນພຽງບາງຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:

- ຄົນເຮົາສາມາດທີ່ຈະຈັດຕັ້ງ ການເຜີຍແຜ່ການ
ສ້າງຄວາມຕ້ານທານໃນລະດັບຊາດ ຫຼື ລະດັບ
ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຕ້ານກັບການເຈັບປ່ວຍຂອງເດັກ
ທົ່ວໄປ. ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກສາມາດ
ສອນວິທີການໃຊ້ອຸປະກອນການສຶກສາທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ຂອງເດັກ, ຄູອາຈານ ແລະ
ກັບຄົນອື່ນໆໄດ້.
- ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, ຄູອາຈານ ແລະຜູ້ທີ່
ດູແລຮັກສາເດັກສາມາດໄດ້ຮັບການ ເຝິກອົບຮົມ
ໃຫ້ຮູ້ຈັກຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອທາງຫູ
ແບບຊໍາເຮື້ອ ແລະ ບັນດາສາເຫດ ອື່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີ
ການສູນເສຍການຟັງໃນກຸ່ມ ຂອງເດັກ.
- ຄົນເຮົາສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ພົມແດນການສື່ສານທີ່ເປັນການເຮັດໃຫ້ເດັກພິ

ການທາງຫູບໍ່ມີຄວາມສາມາດນັ້ນອອກໄປ ແລະ
ພວກເຂົາສາມາດເຮັດວຽກ ເພື່ອຊອກຫາໂອກາດ
ການສຶກສາສໍາລັບເດັກຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບຟັງໄດ້ດີ
ນັ້ນ.

ການປັບປຸງຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງທັງໝົດຊຸມຊົນ
ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາ ໄດ້ຫຼາຍໆບັນຫາທີ່
ເປັນສາເຫດຂອງການສູນເສຍການຟັງນັ້ນ. ເມື່ອໃດທີ່
ສັບສົນຂອງປະເທດໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນໃຫ້ບັນດາປະ
ຊາຊົນຂອງປະເທດ ເຊິ່ງທຸກໆຄົນເຊັ່ນ: ຜູ້ຊາຍ ແລະ
ຜູ້ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ສາມາດຮັບການດູແລທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ຖ້າມີຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ
ມີການສື່ສານທີ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການເອົາ
ໃຈໃສ່ທາງດ້ານການແພດຫຼາຍຂຶ້ນ, ເມື່ອຍາມທີ່ຕ້ອງ
ການຄວາມພ້ອມທັງມີອາຫານການກິນທີ່ພຽງພໍ ແລະ
ນ້ຳດື່ມທີ່ສະອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ ເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງ
ແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ.