

ຄຳສັບ

ຄຳສັບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈັດລຽງຕາມລຳດັບຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

ຄຳສັບທີ່ໝາຍດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍດາວ (*) ຢູ່ດ້ານໜ້າຕາມທຳມະດາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນປຶ້ມ ທົນນີ້ແຕ່ວ່າມັນມັກຖືກນຳໃຊ້ໂດຍ ແພດໝໍ ຫຼື ມັກຈະພົບເຫັນນຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາ.

ຢູ່ໃນຄຳສັບຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ໄດ້ປະກອບດ້ວຍຊື່ຂອງບັນດາພະຍາດທັງໝົດທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນປຶ້ມທົນນີ້. ສະນັ້ນທ່ານສາມາດ ອ່ານຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕ່າງໆໃນດັດສະນີ (ໜ້າສີເຫຼືອງ) ແລະ ສາມາດ ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນບົດຮຽນຕ່າງໆໃນປຶ້ມໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

Abdomen (ທ້ອງ) ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍທີ່ປະກອບ ດ້ວຍກະເພາະອາຫານ, ຕັບ, ລຳໂສ້, ມ້າມ.

Abnormal (ຜິດປົກກະຕິ) ຜິດແປກແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ ເຄີຍເປັນມາ, ຜິດຈາກທຳມະຊາດ, ບໍ່ຄືເກົ່າ, ບໍ່ປົກກະຕິ.

Abscess (ຝີ) ຖືກເປັນໜອງທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອແບກທີ່ເລັຍ ຫຼື ການຕິດເຊື້ອອື່ນໆ ຕົວຢ່າງ ບາດແຜອັກເສບມີໜອງ.

Acne (pimples) (ສິວ) ບັນຫາກ່ຽວກັບຜິວໜັງ, ຜິວໜັງ ຫຼື ຈຸດທີ່ມັກເກີດຢູ່ຕາມໜ້າ, ເອິກ ຫຼື ຫຼັງ ເປັນຫົວນ້ອຍໆມີໜອງໂສ້ງ ຫຼື ເປັນຫົວດາແຂງ ມັກເປັນຫຼາຍກັບຊາວໜຸ່ມ.

Acute (ກະທັນຫັນ) ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ. ຄົນເຈັບ ກະທັນຫັນແມ່ນຄົນເຈັບທີ່ເຈັບຂຶ້ນໃນທັນທີທັນໃດ ແລະ ຢູ່ໃນເວລາສັ້ນໆ. ຄຳກົງກັນຂ້າມແມ່ນ : ຊຳເຮື້ອ.

Actue abdomen (ການເຈັບທ້ອງກະທັນຫັນ) ແມ່ນ ສະພາບສູກເສີນຂອງການເຈັບທ້ອງຢ່າງແຮງ ແລະ ເປັນ ຢ່າງກະທັນຫັນຊຶ່ງມັກຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ການຜາຕັດເຂົ້າຊ່ວຍ. ການເຈັບທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງພ້ອມກັບຮາກ ແລະ ບຸຸຖອກ ທ້ອງໝາຍເຖິງອາການເຈັບທ້ອງກະທັນຫັນ.

Adolescent (ໄວໜຸ່ມ) ໄລຍະເວລາທີ່ເດັກນ້ອຍພວມຈະ ກາຍມາເປັນຜູ້ບາວ-ຜູ້ສາວລະຫວ່າງ 13 ຫາ 19 ປີ.

Afterbirth (ພາຍຫລັງເກີດລູກ) ເບິ່ງແທໃນທ້ອງ (Placenta).

Alcoholism (ພະຍາດຕິດເຫຼົ້າ) ອາການຢາກດື່ມເຫຼົ້າເລື້ອຍໆ. ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ບໍ່ ສາມາດຄວບຄຸມໂຕເອງໄດ້ໃນເວລາດື່ມສິ່ງຂອງມື້ນເມົາ ເຊັ່ນ: ເບີຍ, ເຫຼົ້າທຸກໆຊະນິດ.

Allergy, Allergic reaction (ແພ້, ອາການແພ້) ມີອາການສະແດງອອກເຊັ່ນ: ມີຕຸ່ມຄົນເປັນແຜ່ນ, ມຸ່ນມ່ານ, ຈາມ ຫຼື ບາງຄັ້ງທາຍໃຈຝືດ ຫຼື ຊຶ້ອກຊຶ້ງບາງຄົນເປັນ ເວລາທາຍໃຈເອົາສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງເຂົ້າໄປ, ກິນອາຫານຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ, ສັກຢາໃດຢ່າງໜຶ່ງ ຫຼື ສຳພັດ ແຕະຕ້ອງກັບສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮ່າງກາຍແພ້ຕໍ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ.

Amebas (also amoebas) (ເຊື້ອອາມິບາ) ສັດນ້ອຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນນ້ຳ ຫຼື ຢູ່ໃນລຳໂສ້ທີ່ສາມາດເບິ່ງ ເຫັນໄດ້ດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດເທົ່ານັ້ນ. ເຊື້ອນີ້ເປັນສາເຫດ ຂອງພະຍາດຖອກທ້ອງ, ບັນທ້ອງ ແລະ ຕັບອັກເສບ.

Amputation ການຕັດ/ຕອນ

Analgesic (ຢາແກ້ປວດ) ຢາໃຊ້ເພື່ອລະບົບການເຈັບປວດ.

Anemia (ພະຍາດເລືອດຈາງ) ພະຍາດເລືອດທີ່ຂາດເມັດເລືອດແດງ ມີອາການເມືອຍອ່ອນ, ຜິວໜັງເປັນສີເຫຼືອງ ແລະ ອ່ອນເພັງ. ໃຫ້ເບິ່ງພະຍາດເລືອດຈາງຮ້າຍແຮງ (Pernicious anemia).

Antacid (ຢາຕ້ານກົດໃນກະເພາະອາຫານ) ຢາທີ່ໃຊ້ ສຳລັບຄວບຄຸມການທີ່ມີກົດຫຼາຍໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ເພື່ອລະບົບອາການແຜ່ນທ້ອງ.

Antibiotic (ຢາຕ້ານເຊື້ອ) ຢາທີ່ໃຊ້ບັນທຶບພະຍາດທີ່ຕິດ ເຊື້ອຈາກແບກທີ່ເລັຍ.

*Antienetic (ຢາຫ້າມຮາກ) ຢາສຳລັບຄວບຄຸມອາການຮາກ. ເປັນຢາທີ່ໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍ ໃຫ້ຄົນທີ່ກຳລັງຮາກ ແລະ ຮູ້ສຶກປວດຮາກ.

Antihistamine (ຢາແກ້ການແພ້) ຢາໃຊ້ສຳລັບບັນທຶບອາການແພ້ເຊັ່ນ: ອາການແພ້ຝຸ່ນ ແລະ ອາການຄົນ, ຊ່ວຍໃນການຄວມຄຸມຮາກໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຢາກນອນ.

Antiseptic (ຢາຂ້າເຊື້ອ) ເປັນສະບູ ຫຼື ນ້ຳລ້າງໃຊ້ເພື່ອ ບ້ອງກິນການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊື້ອແບກທີ່ເລັຍ.

Antispasmodic (ຢາຫ້າມບັນ) ຢາໃຊ້ສຳລັບລຳໂສ້ບັນ.

Antitoxin (ຢາແກ້ພິດ) ຢາທີ່ມີຜົນຕ້ານ ຫຼື ຫຳລາຍພິດຂອງທາດເບື້ອ. ສ່ວນຫຼາຍເຮັດມາຈາກເຊຣອມຂອງມ້າ.

Antivenon (anti-venin) (ຢາແກ້ພິດງູ) ແມ່ນຢາແກ້ພິດ ໃຊ້ສຳລັບບັນທຶບທຳມາຈາກສັດ, ເຊັ່ນ: ງູ.


Anus (ຮູທະວານ) ສິ້ນສຸດຂອງລຳໂສ້ໃຫຍ່ (ຮູທະວານ).

Aorta (ເສັ້ນເລືອດແດງໃຫຍ່) ເສັ້ນເລືອດແດງໃຫຍ່ທີ່ອອກຈາກຫົວໃຈ ແລະ ໄປລໍລ້ຽງຮ່າງກາຍ.

Apoplexy (ໂລກເສັ້ນເລືອດແຕກໃນສະໝອງ) ແມ່ນຄຳສັບເກົ່າຂອງ (Stroke) ພະຍາດທີ່ຂາດເລືອດໃນ ສະໝອງຢ່າງກະທັນຫັນເຊັ່ນ: ເສັ້ນເລືອດແຕກໃນສະໝອງ.

Appendix (ໄລ່ຕິງ) ສ່ວນໜຶ່ງຂອງລຳໂສ້ເປັນຖົງໜັງຄືນີ້ວ່າ ມີທີ່ຕິດຢູ່ກັບໄລ່ໃຫຍ່.

Appropriate (ເໝາະສົມ) ສິ່ງທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ, ປອດໄພທີ່ສຸດ, ຖືກກັບ ແລະ ເໝາະສົມກັບທຸກສະພາບການ ແລະ ທຸກເງື່ອນໄຂ.



Artery (ເສັ້ນເລືອດແດງ) ເສັ້ນເລືອດແດງທີ່ມາຈາກເສັ້ນເລືອດແດງໃຫຍ່ຈາກຫົວໃຈສູ່ຮ່າງກາຍ ແມ່ນເສັ້ນເລືອດແດງທີ່ມີກຳມະຈອນເຕັ້ນ. ເສັ້ນເລືອດດຳຊຶ່ງສົ່ງເລືອດກັບຄືນສູ່ຫົວໃຈບໍ່ມີກຳມະຈອນເຕັ້ນ.

Ascaris (roundworm) (ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ) ແມ່ທ້ອງໂຕໃຫຍ່ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລຳໄສ້ຂອງຄົນ ແລະ ພາໃຫ້ຢູ່ບໍ່ສະບາຍ, ຍ້ອຍອາຫານຍາກ, ຈ້ອຍ ແລະ ບາງເທື່ອກໍເຮັດໃຫ້ເປັນໄສ້ຕັນ (ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ).

B (ບີ)

Bacteria (ເຊື້ອແບກທີເລີຍ) ເຊື້ອນ້ອຍໆທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດຕິດເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດ.

Bag of water (ຖົງນ້ຳຄາວປາ) ຖົງນ້ຳທີ່ຫຸ້ຫຼຸມແອນໂອຍໃນມົດລູກ. ເມື່ອຖົງນ້ຳແຕກ, ນ້ຳຄາວປາກໍຈະໄຫຼອອກມາຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມັນໝາຍເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເກີດລູກ.

Bedsores (ແຜຕງ) ບາດເປື້ອຍເໜົາຊຳເຮື້ອຊຶ່ງມັກພົບໃນຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ເຈັບໜັກບໍ່ສາມາດພັກໂຕໄດ້ ຫຼື ບໍ່ສາມາດປ່ຽນທ່ານອນໄດ້.

Bewitchment (ອຳນາດມົນສະກົດ) ການທີ່ຖືກມົນສະກົດຈາກແມ່ມົດ, ບາງຄົນເຊື່ອວ່າພວກເຂົາເກີດອາການເຈັບປ່ວຍເນື່ອງຈາກວ່າຖືກມົນ ຫຼື ເຄາະຮ້າຍຈາກເວດມົນຕ່າງໆ.

Bile (ນ້ຳບີ) ນ້ຳແຫຼວສີຂຽວທີ່ຕັບເປັນຜູ້ຜະລິດອອກມາເກັບມຸ້ງໄວ້ໃນຖົງນ້ຳບີ. ມັນຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານປະເພດໄຂມັນ.

Blackhead (ສິວຫົວດຳ) ຈຸດນ້ອຍໆ ຫຼື ຫົວສິວອັດຮູຂົນຕາມໜ້າ, ເອິກ ຫຼື ຫຼັງ. ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິວ.

Birth defects (ການເກີດລູກທີ່ຜິດປົກກະຕິ) ເບິ່ງ deffects (ການເກີດລູກບໍ່ສົມບູນ).

Bladder stones (ຫົວໃນພິກຍ່ຽວ) ເບິ່ງຫົວໝາກໄຂ່ຫຼັງ (Kidney stone).

Blood pressure (ຄວມດັນເລືອດ) ແຮງດັນ ຫຼື ຄວາມດັນຂອງເລືອດຢູ່ເສັ້ນເລືອດ (ທັງເສັ້ນເລືອດແດງ ແລະ ເສັ້ນເລືອດດຳໃຫຍ່); ຄວມແຮງຂອງມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບອາຍຸ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນ.

Boil (ຜີ) ຜິວໜັງທີ່ໂຕ່ແດງຂຶ້ນມາ ແລະ ເຈັບປວດທາງໃນມີໜອງ. ມັນແມ່ນອັບແຊຊະນິດໜຶ່ງ.

Booster (ການສັກຢາກັນພະຍາດຊຳຕື່ມ) ການສັກຢາກັນພະຍາດຊຳຕື່ມອີກເທື່ອ ໄໝ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນຂອງຢາທີ່ສັກເທື່ອແລ້ວນີ້ມີປະສິດຕິຜົນສົມບູນຂຶ້ນຕາມກຳນົດ.

Bowel movement (ການເໜັງຕີງຂອງລຳໄສ້) ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລຳໄສ້ເພື່ອຂັບຖາຍສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນກ້ອນ(ຕ່ອນ)ອອກຈາກຮ່າງກາຍ.

Brand name (ຊື່ການຄ້າ) ຊື່ທາງການຄ້າທີ່ທາງບໍລິສັດເປັນຜູ້ຕັ້ງຂຶ້ນ. ຢາທີ່ມີຊື່ການຄ້າພິເສດມັກຈະຂາຍໃນລາຄາທີ່ແພງກວ່າຢາຊະນິດດຽວກັນແຕ່ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດ (ຊື່ທົ່ວໄປ).

Breast abscess (ຜີທີ່ເຕົ້ານົມ) ເບິ່ງຫົວຂໍ້ເຕົ້ານົມອັກເສບ (Mastitis).

Breech delivery (ການເກີດລູກຜິດທ່າ) ການເກີດລູກທີ່ແອນໂອຍເອົາກັນ ຫຼື ຂາອອກກ່ອນ.

Broad-spectrum antibiotic (ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ມີປະສິດ ຕໍ່ທັງຜົນກວ້າງ) ຢາທີ່ຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ຊຶ່ງບໍ່ ຄື ກັບຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ມີປະສິດຕິຜົນສະເພາະທີ່ຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ບໍ່ເທົ່າໃດຊະນິດ.

Bronchi (ຫຼອດລົມ) ທ່ອກາດທີ່ຕໍ່ໄປຮອດປອດໃນເວລາຫາຍໃຈ.

Bronchitis (ຫຼອດລົມອັກເສບ) ພະຍາດຕິດເຊື້ອຫຼອດລົມ.

Bubo (ຜີໝາກມ່ວງ) ການໄຄ່ອັກເສບຂອງຕ່ອມນ້ຳ ເຫຼືອງຢູ່ບໍລິເວນບ່ອນພັບກົກຂາ. ມັນແມ່ນການຕິດເຊື້ອກາມະໂລກຊະນິດໜຶ່ງ.

Buttocks (ກັນ) ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຄົນໃຊ້ນັ່ງ.

C (ຊີ)

Cancer (ພະຍາດມະເຮັງ) ເນື້ອງອກທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈົນໃນທີ່ສຸດກໍເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍ.

Carbohydrates (ທາດແປ້ງ) ອາຫານປະເພດເຂົ້າ, ແປ້ງ ແລະ ນ້ຳຕານຊຶ່ງເປັນອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະລັງງານ.

Cassava (Manioc, Yuca) (ມັນຕົ້ນ) ຫົວມັນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເກີດຢູ່ໃນປະເທດເຂດຮ້ອນ.

Cast (ແປ້ງໂອບ, ເຜືອກ) ຜ່າພັນທີ່ມີແປ້ງຕິດໃຊ້ຫໍ່ຫຸ້ມ ຫຼື ພັນປ່ອນທີ່ມີກະດູກຫັກບໍ່ໃຫ້ມັນເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຈົນກວ່າຈະເຊົາດີແລ້ວຈຶ່ງຕັດອອກ.

Cataract (ແກ່ນຕາຂຶ້ນ) ບັນທຸກ່າງວຽກກັບຕາຊຶ່ງແກ້ວຕາຂຶ້ນມົວເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບເບິ່ງບໍ່ເຫັນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຕາດຳເປັນສີຂີ້ເຖົາ ຫຼື ຂາວເມື່ອເຍືອງໄຟເບິ່ງ.

Catheter (ທໍ່ສວນຍ່ຽວ) ທໍ່ຢາງໃຊ້ສຳລັບແຍ່ເຂົ້າຮູຢ່ຽວເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳຍ່ຽວອອກມາຈາກພິກຍ່ຽວໄດ້.

Cavities (ຮູແຂ້ວແມງ) ຮູ ຫຼື ໂກນນ້ອຍໆຢູ່ແຂ້ວບ່ອນທີ່ເຊື້ອແບກທີເລີຍເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ ແລະ ທຳລາຍແຂ້ວ.

Centigrade (C.) (ເຊັນຕີເກຼດ) ຫົວໜ່ວຍວັກແທກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນ (ແທກອຸນຫະພູມ) ຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບດີທຳມະດາມີອຸນຫະພູມ 37 ອົງສາ. ນ້ຳຈະກ້າມຢູ່ 0 ອົງສາ ແລະ ພົດຢູ່ 100 ອົງສາ.


Cerebro-Vascular Accident, CVA (ອຸບັດເຫດຂອງເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງ) ເບິ່ງເສັ້ນເລືອດແຕກໃນສະໝອງ (Stroke)

Cervix (ປາກມົດລູກ) ບ່ອນເປີດ ຫຼື ປາກຂອງຜູ້ມົດລູກຢູ່ທາງໃນຊື່ກັບອະໄວຍະວະເພດຍິງ.

Chancre (ບາດແຜຈາກກາມະໂລກ) ບາດແຜທີ່ເຈັບ ຫຼື ບາດແຜເປັນຂຸມໃນອະໄວຍະວະເພດ, ນິ້ວມື ຫຼື ຮີມສົບທີ່ແມ່ນອາການທຳອິດຂອງໂລກຊີພິລິສ(ກາມະໂລກ)

Chigger (ໄຮ) ສັດນ້ອຍໆ ທີ່ຄານໄປລັກສະນະຄືແມງມຸມ ຫຼື ເຫັບມັກໃຊ້ຫົວໝັນເຂົ້າໃນຜິວໜັງເພື່ອດູດເລືອດ.

Child Health Chart (ບັດກວດສຸຂະພາບຂອງເດັກ) ແຕ່ລະເດືອນແມ່ນຈະໄດ້ສ້າງນ້ຳໜັກຂອງເດັກເພື່ອເບິ່ງວ່າເດັກມີນ້ຳໜັກຂຶ້ນຕາມປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່.



Childbirth fever (ເດັກມີອາການໄຂ້ພາຍຫລັງເກີດ) ມີເອີ້ນວ່າພາວະຕິດເຊື້ອເປັນໄຂ້ລະຫວ່າງການເກີດລູກ ແລະ ຫຼັງເກີດລູກ, ມົດລູກຕິດເຊື້ອ, ຕິດເຊື້ອຫຼັງຈາກເກີດລູກ ຫຼື ໄຂ້ທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຫຼັງເກີດລູກ.

Chronic (ຊຳເຮື້ອ) ກົງກັນຂ້າມກັບພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນກະທັນຫັນ. ພະຍາດຊຳເຮື້ອແມ່ນພະຍາດທີ່ນານເຊົາ.

Circulation (ການໝູນວຽນຂອງເລືອດ) ການໝູນວຽນຂອງເລືອດທີ່ຜ່ານອອກໄປຕາມເສັ້ນເລືອດແດງກັບຄືນມາທາງເສັ້ນເລືອດດຳດ້ວຍການບົບຂອງຫົວໃຈ.

Cleft (ສົບແຫວ່ງ) ບ່ອນແຕກ ຫຼື ແຫວ່ງຈາກກັນ. ແອນອຍທີ່ເກີດມາເປັນສົບແຫວ່ງ ແມ່ນບ່ອນຫວ່າງທີ່ຜິດປົກກະຕິຢູ່ເທິງສົບ ຫຼື ເພດານປາກ.

Climacteric (ໝົດປະຈຳເດືອນ) ເບິ່ງ Menopause ໄລຍະທີ່ແມ່ຍິງໝົດການເປັນປະຈຳເດືອນ.

Colic (ເຈັບທ້ອງຢ່າງແຮງ) ການເຈັບຢ່າງແຮງທີ່ເກີດມາຈາກໂສບິດ ຫຼື ເປັນບິດ.

Colostrum (ນ້ຳນົມເທລີໂອງ) ນ້ຳນົມແມ່ທີ່ອອກມາທຳອິດພາຍຫຼັງຈາກເກີດລູກໃໝ່. ມັນເບິ່ງຄືນ້ຳໂສງແຕ່ມັນ ກ່ອດົມສົມບູນໄປດ້ວຍໄຢຕີນ ແລະ ທາດຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ານທານການຕິດເຊື້ອພະຍາດ.

Coma (ອາການໜັກເຖິງຂັ້ນສະຫຼົບ) ສະພາບທີ່ໝົດຄວາມສະຕິຂອງຄົນເຈັບໜັກບໍ່ຮູ້ເມື່ອຄົງມັນມີສາເຫດມາຈາກ ພະຍາດຕ່າງໆ, ກິນຂອງເປື້ອ ແລະ ມັນມັກຈົບລົງດ້ວຍການເສຍຊີວິດເລື້ອຍໆ.

Community (ຂຸມຊົນ) ປະຊາຊົນເປັນກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນບ້ານ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນດຽວກັນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ໃນການດຳລົງ ຊີວິດ. ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ບັນຫາຮ່ວມກັນ.

*Complications (ອາການສົນ) ແມ່ນອາການທີ່ສອງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ເຈັບປ່ວຍຢູ່. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບແມ່ນພະຍາດແຊກຊ້ອນທີ່ເກີດມາຈາກພະຍາດໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນມາກ່ອນ

Compost (ຝຸ່ນບົມ, ບຸ້ຍໝັກ) ສ່ວນປະສົມຂອງຈາກພືດ ແລະ ສັດ ໃຊ້ເປັນບຸ້ຍກໍໄດ້. ເພື່ອງ, ໃບໄມ້ແຫ້ງ, ຜັກເທົາ, ອາຈົມຂອງສັດ ແລະ ຊາກສັດທັງໝົດມີເປັນສ່ວນປະກອບຂອງຝຸ່ນບົມທີ່ດີ.

Compress (ຜ້າພັນບາດ) ຜ້າບາງສີຂາວສະອາດໃຊ້ພັນ ຫຼື ເຊັດບາດຕາມຮ່າງກາຍ. ອາດຈະເອົາຈຸມໃສ່ນ້ຳຮ້ອນ ຫຼື ນ້ຳເຢັນກ່ອນນຳມາໃຊ້ກໍໄດ້.

Conjunctiva (ເປືອກຕາ) ເຍື່ອບາງໆທີ່ປົກຫຸ້ມຕາຂາວ ແລະ ສ່ວນໃນຂອງໜວຍຕາ.

Consciousness (ມີສະຕິ) ເບິ່ງໝົດສະຕິ (Loss of consciousness)

Constipation (ທ້ອງຜຸກ) ອາການຖ່າຍຍາກດົນໆຖ່າຍເທື່ອໜຶ່ງເນື່ອງມາຈາກອາຈົມແຫ້ງ ແລະ ແຂ້ນ.

Consumption (ວັນນະໂລກ) ຊື່ເກົ່າຂອງວັນນະໂລກ

Contact (ສຳພັດ) ການແຕະຕ້ອງ ຫຼື ສຳພັດ. ພະຍາດຕິດແປດສາມາດແຕ່ຂະຫຍາຍໄດ້ຈາກການສຳພັດແຕະຕ້ອງກັບຄົນເຈັບ.

Contagious disease (ພະຍາດຕິດແປດ) ພະຍາດທີ່ສາມາດແຜ່ລາມຈາກຄົນໜຶ່ງຫາຄົນອື່ນໄດ້ງ່າຍ.

Contaminate (ການຕິດເຊື້ອ) ເຮັດເປື້ອນເບີ, ບາດແຜຕິກຊີຝຸ່ນ ຫຼື ຕິດເຊື້ອພະຍາດດ້ວຍການສຳພັດ. ເຂັມສັກຢາທີ່ບໍ່ຕຳແໜ່ນເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຕິດເຊື້ອໄດ້ເຖິງວ່າເບິ່ງຄືວ່າສະອາດຕື່ຢູ່ກໍຕາມ.

Contraceptive (ການຄຸມກຳເນີດ) ການເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີລູກທຸກໆວິທີ.

Contractions (ການໃຊ້ຢາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມົດລູກບັນ, ການປັນ) ກຳນຸນທົດຍຶດ. ການທົດຍຶດ (ຫຼື ປັນ) ຂອງມົດລູກຊ່ວຍໃຫ້ແອນອຍອອກມາຈາກມົດລູກໃນເວລາເກີດລູກ.

*Contraindication (ຂໍ້ຫ້າມ) ສະພາບການ ຫຼື ເງື່ອນໄຂໃດໜຶ່ງຂອງຄົນເຈັບທີ່ຖືກຫ້າມໃຊ້ຢາຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ (ເຊັ່ນ: ມີຢາຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາໃຊ້.)

Convulsions (ການຊັກ) ການຊັກທີ່ຕົນເອງຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້. ການຊັກດິນຂຶ້ນ ໃນທັນທີທັນໃດຂອງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼື ໝົດຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນເຈັບເປັນເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ ຫຼື ພະຍາດບ້າໝູ.

Cornea (ແກ້ວຕາ) ແຜ່ນບາງໆໂສງ ຊຶ່ງປົກຫຸ້ມມ່ານຕາ ແລະ ຕາດຳ.

Corns (ຕາປາ) ສ່ວນໜຶ່ງຂອງໜັງບ່ອນທີ່ເກີບຮຸກຮ້າຍເຮັດໃຫ້ໜ້າໜຽວໜາຂຶ້ນ ແລະ ເຈັບ ຫຼື ເກີດຍ້ອນມື້ວຕີນຮຸກຮູກກັນເອງ.

Cramps (ການປວດ-ຈັງ) ຄວາມເຈັບທີ່ເກີດຈາກກ້ອນຊີ້ນປັນເຂົ້າ ຫຼື ມາຍອອກຢ່າງແຮງ.

*Cretinism (ພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຕ່ອມໄທລອຍທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ພິການ) ໃຫ້ເບິ່ງ Hypothyroidism ເພີ່ມເຕີມ.

Cupping (ການປິ່ນປົວແບບພື້ນເມືອງ) ການປິ່ນປົວແບບພື້ນເມືອງທີ່ໃຊ້ຂວດແກ້ວລົມໄຟເພື່ອຖອນພິດ.

Cyst (ກ້ອນເປົ້ານ້ຳ) ການຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດມາຈາກການມີຖົງນ້ຳຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍຢ່າງຜິດປົກກະຕິ.

D (ດີ)

Dandruff (ຂີ້ຫົວ, ລັງແຄ) ໄຂມັນສີຂາວ ຫຼື ສີພັນທີ່ຕິດຢູ່ຕາມຜົມ, ເນື່ອງຈາກຕ່ອມທີ່ຢູ່ໜັງຫົວມີໄຂມັນຫຼາຍ, ລັງແຄ.

Decongestant (ຢາແກ້ຕັນດັງ) ຢາທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຕັນດັງ ຫຼື ຂໍ້ມູກຍ້ອຍ.

Defects (ພິການ, ບໍ່ສົມບູນ) ການເກີດມາບໍ່ສົມປະກອບແມ່ນບັນຫາທີ່ເກີດມາພ້ອມກັບແອນອຍເກີດໃໝ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ດ້ານມັນສະໝອງ. ເຊັ່ນ: ປາກແຫວ່ງ, ຕີນງໍ ຫຼື ນິ້ວຕີນບໍ່ຄົບ 10 ນິ້ວ.

Deficiency (ການຂາດເຂີນ) ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ; ການຂາດສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນ: ພະຍາດຂາດວິຕາມິນ.

Deformed (ຜິດຮູບຮ່າງ) ຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິ, ຮູບຮ່າງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

Dehydration (ອາການຂາດນ້ຳໃນຮ່າງກາຍ) ສະພາບການທີ່ຮ່າງກາຍເສຍນ້ຳຫຼາຍກວ່າໄດ້ຮັບນ້ຳເຂົ້າໄປ. ການຂາດນ້ຳສຳລັບແອນອຍແລ້ວແມ່ນອັນຕະລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດ.

Delirium (ປ່ວງ) ສະພາບສັບສົນປັນປ່ວນທາງສະໝອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບມີການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ສະແດງສິ່ງທີ່ບໍ່ຄົນເຈັບມີການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ສະແດງສິ່ງທີ່ບໍ່ຄົນເຈັບມີການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ໄຂ້ຂຶ້ນສູງ ຫຼື ເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ.

*Dermal (ກ່ຽວກັບຜິວໜັງ).

Dermatitis (ຜິວໜັງອັກເສບ) ພະຍາດຕິດເຊື້ອຕ່າງໆທີ່ເກີດກັບຜິວໜັງ.

Diaper rash (ເປັນເຫຼີນ), ເປັນແຜ່ນແດງໆເກີດຕາມຫວ່າງຂາແອນ້ອຍຍ້ອນຄວາມບໍ່ສະອາດຈາກການນອນແຊ່ຢູ່ຢູ່ຜ້າອ້ອມ ຫຼື ຢູ່ຕຸງງ.

Diarrhea (ພະຍາດຖອກທ້ອງ) ຖອກທ້ອງເປັນນ້ຳຫຼາຍເທື່ອຕິດຕໍ່ກັນ.

Diet (ການຫຼຸດນ້ຳໜັກ) ຂະນິດ ແລະ ປະລິມານຂອງອາຫານທີ່ກຳນົດໃຫ້ຄົນກິນ ຫຼື ຫ້າມກິນ.

Discharge (ນ້ຳໜອງ) ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຮ່າງກາຍທີ່ໄຫຼອອກມາເປັນຂອງແຫຼວ, ເປັນນ້ຳເມັອກ ຫຼື ນ້ຳໜອງ.

Dislocation (ກະດູກເຄື່ອນ) ກະດູກທີ່ຫຼຸດອອກຈາກບ່ອນທີ່ມັນຕໍ່ກັນ.

Douche (ການລ້າງ) ວິທີລ້າງຊ່ອງຄອດດ້ວຍການສີດນ້ຳເຂົ້າໄປຂ້າງໃນ.

Drowning (ການຕຸຍຕົກນ້ຳ) ເວລາທີ່ຢຸດເຊົາຫາຍໃຈເກີດຈາກການຈົມຢູ່ພື້ນນ້ຳ.

Dysentery (ທ້ອງບິດ) ພະຍາດຖອກທ້ອງທີ່ມີມຶກ ແລະ ເລືອດ. ມັນມັກເກີດມາຈາກການຕິດເຊື້ອແບກທີ່ເລັຍ ຫຼື ອາມິບາ.

E (ອີ)

Eclampsia (ອຸກການຊັກ) ການຊັກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທັນທີທັນໃດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ເວລາເກີດລູກ. ເກີດມາຈາກຄັນເປັນພິດ.

Embryo (ລູກອ່ອນ) ລູກອ່ອນທີ່ຍັງນ້ອຍຢູ່ໃນແມ່ຍິງຖືພາຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ.

Emergency (ສຸກເສີນ) ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃນທັນທີທັນໃດ.

Emetic (ຢາທີ່ເຮັດໃຫ້ຮາກ) ຢາ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ເຮັດໃຫ້ຮາກ. ໃຊ້ໃນເວລາກິນຂອງເບື້ອ ຫຼື ກິນຢາເບື້ອເຂົ້າໄປ.

Enema (ການລ້າງທ້ອງ) ເອົານ້ຳທີ່ປະສົມກັບຢາແລ້ວສວນເຂົ້າໄປໃນຮູຖາຍເພື່ອໃຫ້ຖ່າຍອອກເປັນການລ້າງທ້ອງ.

Epidemic (ການລະບາດ) ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຫຼາຍໆຄົນໃນໝູ່ບ້ານໜຶ່ງ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນໜຶ່ງພ້ອມໆກັນ.

Evaluation (ການຕີລາຄາ) ການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຊອກຫາຄຸນຄ່າຂອງອັນໃດອັນໜຶ່ງ ຫຼື ການຄາດຄະເນເຖິງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບວ່າມີໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເບິ່ງໄດ້ຈາກການປຽບທຽບພາຫະນະ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆພາຍຫຼັງ ຫຼື ກ່ອນແຜ່ນການໃດໜຶ່ງຈະຖືກປະຕິບັດ.

Evil eyes ເຄາະຮ້າຍຈາກຖືກພະລັງເວດມິນຂອງແມ່ມົດ.

Exhaustion (ການອິດເມື່ອຍ) ຄວາມອິດເມື່ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຄວາມອ່ອນເພັງຫຼາຍທີ່ສຸດ.

*Expectorant (ຢາແກ້ຂີ້ກະເທີ) ຢາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນໄອເພື່ອໃຫ້ຂີ້ກະເທີອອກມາຈາກຫຼອດລົມ, ຢາເຮັດໃຫ້ໄອ, ຢາເຮັດໃຫ້ໄອຂົວະ.

Expiration date (ມື້ໝົດກຳນົດໃຊ້ຢາ, ວັນໝົດກຳນົດ, ເວລາຢາໝົດຄຸນນະພາບ) ເດືອນ ແລະ ປີທີ່ຂຽນໄວ້ເທິງກັບຢາເພື່ອບອກເວລາເສຍຄຸນຂອງຢາ. ເມື່ອຮອດມື້ໝົດກຳນົດໃຊ້ຢານີ້ແລ້ວໃຫ້ເອົາຢານັ້ນຖິ້ມ.

F (ເອຟ)

Fahrenheit (F) (ຟາເລັນໄຮ) ການວັກແທກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນ. ອຸນຫະພູມຂອງຄົນດີ (ບໍ່ເຈັບບໍ່ໄຂ້) ແມ່ນ 98,6 F ນຳກຳມຢູ່ 32 F ແລະ ພືດຢູ່ 212 F.

Family planning (ການວາງແຜນຄອບຄົວ) ການໃຊ້ວິທີການໃດໜຶ່ງ ເພື່ອວາງແຜນຄອບຄົວໃຫ້ໄດ້ລູກຕາມຈຳນວນ ແລະ ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ຕົນຕ້ອງການ.

Farsightedness (ສາຍຕາຍາວ) ສາມາດເບິ່ງເຫັນສິ່ງຂອງໃນໄລຍະໄກດີກວ່າສິ່ງຂອງຢູ່ໃກ້ໆ.

Feces (ອາຈົມ) ຂີ້

Feces-to-mouth (ໄຂ້ແມ່ທ້ອງເຂົ້າປາກ) ໄຂ້ຂອງແມ່ທ້ອງເຂົ້າປາກໂດຍການຕິດເຂົ້າໄປກັບອາຫານ, ກັບນ້ຳ ຫຼື ຍ່ອນຕິດມືແລ້ວກິນເຂົ້າໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ໄຕ.

Fetoscope (ເຄື່ອງຟັງສຽງເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງ) ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ສຳລັບຟັງສຽງຂອງເດັກນ້ອຍໃນມັດລູກ.

Fetus (Fœtus) (ຕົວອ່ອນ) ເດັກນ້ອຍທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນມັດລູກ.

Fever (ໄຂ້) ຮ່າງກາຍມີອຸນຫະພູມຮ້ອນກວ່າປົກກະຕິ.

First aid (ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການປະຖົມພະຍາບານ) ການປິ່ນປົວຄົນເຈັບໃນກໍລະນີສຸກເສີນ

Flu (ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່) ໄຂ້ຫວັດທີ່ມີອຸນຫະພູມຮ້ອນ, ປວດຕາມຂໍ້ ແລະ ບາງເທື່ອມີອາການຖອກທ້ອງສົມທົບນຳ.

Flukes (ພະຍາດໄປໄມ້ໃນຕັບ) ແມ່ທ້ອງຂະນິດໜຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕັບມັນທຳລາຍຕັບ ຫຼື ອະໄວຍະວະສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດຕ່າງໆ.

Foetus (ຕົວອ່ອນ) ເບິ່ງ Fetus

Folic acid (ໂຟລິກ ອາຊິດ: ວິຕາມິນຂະນິດໜຶ່ງທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິຕາມິນລວມໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດເລືອດຈາງ) ທາດບຳລຸງຂະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນຜັກສີຂຽວ.

Follicles (ຮູຂຸມ)

Fontanel (ຂະມ່ອມ) ບ່ອນຫຼຸບ ແລະ ເຕັ້ນຢູ່ຈອມທົວຂອງແອນ້ອຍເກີດໃໝ່.

Fracture (ກະດູກຫັກ) ກະດູກຫັກ ຫຼື ແຕກ.


Fright (ອາການຕົກສະຫ້າມ, ຍ້ານ) ຄວາມຢ້ານຢ່າງແຮງ ແລະ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ.

G (ຈີ)

Gallbladder (ຖົງນໍ້າບີ) ຖົງຊີ້ນນ້ອຍໆຕິດຢູ່ກັບຕັບ. ຖົງບີບັນຈຸນ້ຳບີທີ່ເປັນນ້ຳສຳລັບຍ່ອຍອາຫານປະເພດໄຂມັນ.

Gauze (ຜ້າພັນບາດ) ຜ້າອ່ອນໆບາງໆໃຊ້ໃນການພັນບາດ, ຜ້າປອດເຊື້ອ.

Generic name (ຊື່ວິທະຍາສາດ) ຊື່ຂອງຢາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຕາມຊື່ທາງວິທະຍາສາດ ຫຼື ຊື່ທາງການຢາທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຊື່ການຄ້າທີ່ຂາງບໍລິສັດຕ່າງໆແຕ່ງຂຶ້ນ.



Genitals (ອະໄວຍະວະເພດ) ອະໄວຍະວະຂອງລະບົບສືບພັນໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນອະໄວຍະວະເພດ.

Germs (ເຊື້ອພະຍາດ) ເຊື້ອພະຍາດນ້ອຍໆທີ່ອາດຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍຄົນ ແລະ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຕິດເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດ. ຈຸລະຊີບ.

Giardia (ໂຕວ່າວ) ເຊື້ອກາຝາກໂປຼໂຕຊົວທີ່ມີໃນລູກໄສ້ຂອງຄົນ ແລະ ສັດເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຖອກທ້ອງທີ່ມີອາຈົມເປັນຝອດສີເຫຼືອງ.

Glucose (ກູຢູໂກ) ນໍ້າຕານຂະນິດໜຶ່ງທີ່ຮ່າງກາຍຄົນຍ່ອຍ ແລະ ຊົມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ໄວ. ມີຢູ່ໃນໝາກໄມ້ສຸກ, ນໍ້າເຜັງ ແລະ ເປັນຝຸ່ນສີຂາວເອົາໄປເຮັດເປັນນໍ້າດື່ມແກ້ການຂາດນໍ້າໃນຮ່າງກາຍ.

Goiter (ຄໍເອີມ) ເປັນຖົງໃຫຍ່ຢູ່ຄໍໃນໃຕ້ຄາງ. ເນື່ອງມາຈາກຕ້ອມໄທລອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ມີສາເຫດມາຈາກຮ່າງກາຍຂາດທາດໄອໂອດິນ.

Grain (gr) (ແກນ) ຫົວໜ່ວຍໃນການສັ່ງນໍ້າໜັກຊະນິດໜຶ່ງ: 1 ແກນ ເທົ່າກັບ 65 ມກ.

Gram (gm) (ແກມ ຫຼື ກຼາມ) ຫົວໜ່ວຍໃນການຊຸ່ງນໍ້າໜັກລະບົບຫົວ 10. ປະມານ 28 ກຼາມຕໍ່ 1 ອອນ. 1000 ກຼາມເທົ່າກັບ 1 ກິໂລກຼາມ.

Groin (ຕັນຂາ) ພາກສ່ວນທາງໜ້າຂອງແອບແອຂາ. ບໍລິເວນອະໄວຍະວະສືບພັນ.

Gut (ໃສ້) ລໍາໃສ້

Gut thread or gut suture material (ໄໝຫຍິບຜິວໜັງ) ໄໝຫຍິບ ຫຼື ດ້າຍພິເສດໃຊ້ສໍາລັບຫຍິບປາດ. ມັນຈະເປື້ອຍຫາຍໄປເອງເມື່ອບາດເຊົາດີແລ້ວບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາອອກ.

H (ເຮັດ)

Hare lip (ສົບແຫວ່ງ) ຮິບສົບຂ້າງເທິງເປັນແຫວ່ງແຕ່ປາກຂຶ້ນຮອດຕີນດັງ (ຄືກັບສົບກະຕ່າຍ). ມີແອນໂອຍບາງຄົນເປັນສົບແຫວ່ງມາແຕ່ກໍາເນີດ.

Health worker (ອສບ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ) ບຸກຄົນທີ່ມີຊ່ວຍເຮັດວຽກໃຫ້ບ້ານຂອງຕົນໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມີສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ.

Heartburn (ແສບໝາກໂຫກ) ຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັບຖືກໄຟໄໝ້ຢູ່ໃນເອິກ ຫຼື ສ່ວນເທິງຂອງກະເພາະອາຫານ.

Hemorrhage (ເລືອດໄຫລ) ເລືອດໄຫລຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ.

Herb (ຢາພື້ນເມືອງ) ຫຍ້າທີ່ໃຊ້ເຮັດເປັນຢາພື້ນເມືອງບາງຢ່າງ.

Hereditary (ເປັນກໍາມະພັນ) ສືບຕໍ່ຈາກພໍ່ແມ່ໄປສູ່ລູກ

Hernia (rupture) (ໄສ້ເລື້ອນ) ການຈືກ ຫຼື ຂາດຂອງກ້າມຂຶ້ນທີ່ຫຸ້ມທ້ອງເຮັດໃຫ້ເປັນໄສ້ເລື້ອນ.

Hex (ເວດມົນ, ຄາຖາ) ຄໍາສາບທີ່ແມ່ມິດເສກໃສ່ຄົນ

History (medical history) (ປະຫວັດຄົນເຈັບ) ສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດສືບຮູ້ໄດ້ນໍາຄົນເຈັບດ້ວຍການສອບຖາມກ່ຽວກັບພະຍາດ. ການເປັນມາຂອງມັນ. ເວລາໃດມັນດີຂຶ້ນເວລາໃດມັນເຈັບໜັກລົງ. ແມ່ນຫຍັງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ມີໃຜໃນເຮືອນເຈົ້າເຄີຍເປັນມາກ່ອນບໍ່? ອື່ນໆ?

Hives (ມຸ່ນມ່ານ) ແຜ່ນໜັງເກີດແດງແຂງ

ແລະ ໜາຂຶ້ນມີອາການຄັນຢ່າຮຸນແຮງ, ມັກ ເປັນຂຶ້ນມາບາດດຽວແລ້ວອາດເຊົາໝົດກ່ຽງໄປເລີຍ ຫຼື ຍ້າຍບ່ອນໄປເປັນຢູ່ບ່ອນອື່ນກໍໄດ້. ແມ່ນອາການແພ້ຊະນິດໜຶ່ງ.

Hormones (ຮໍໂມນ) ຮ່າງກາຍສ້າງຮໍໂມນຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງມັນ. ຕົວຢ່າງ: ແອດສະໂຕຼເຈນ ແລະ ໂປຼແຊດສະເຕໂລນແມ່ນຮໍໂມນທີ່ຄວບຄຸມການເປັນປະຈໍາເດືອນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການມີລູກ.

Hygiene (ອະນາໄມ) ບົດບາດ ຫຼື ການກະທໍາຂອງການຮັກສາຄວາມສະອາດສ່ວນບຸກຄົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະອະນາໄມດີ.

Hypertension (ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ) ຄວາມດັນຂອງເສັ້ນເລືອດແຮງ.

*Hypochondria (ຄວາມກະວົນກະວາຍ) ຄວາມກັງວົນຈົນເກີນໄປກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ.

Hypothyroidism (ຕ້ອມໄທລອຍເຮັດວຽກຫຼຸດລົງ) ໃນສະພາບການທີ່ເດັກເກີດມາມີຄວາມຮູ້ສຶກຊໍ້າ ແລະ ຈະເປັນຫຼຸຫວັກ ມີແມ່ນຜົນມາຈາກອາຫານການກິນຂອງແມ່ທີ່ກໍາລັງຖືພາຂາດເກືອໄອໂອດິນ.

Hysteria (1) ຄວາມໝາຍທໍາມະດາໝາຍເຖິງສະພາບອາການຂອງໂລກປະສາດຢ່າງແຮງ, ຍ້ານ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງອາລົມຢ່າງຮຸນແຮງ. (2) ໃນຄວາມໝາຍທາງການແພດແມ່ນອາການທີ່ເກີດມາຈາກຄວາມຢ້ານ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອຖືໃນບາງສິ່ງບາງຢ່າງໆງົມງວາຍ.

I (ໄອ)

Immunization (vaccinations) (ການສັກຢາກັນພະຍາດ) ການສັກຢາບາງຢ່າງເພື່ອສ້າງພູມຕ້ານທານໃຫ້ຄົນສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະຍາດຄໍຕິບ; ໄອໄກ່, ບາດທະຍັກ, ໄປລີໂອ, ວັນນະໂລກ, ແລະ ໝາກແດງ.

Infection (ການຕິດເຊື້ອ) ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອແບກທີ່ເລັ້ຍ ຫຼື ເຊື້ອພະຍາດອື່ນໆ ການຕິດເຊື້ອອາດເປັນຢູ່ໃນບາງພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ການຕິດເຊື້ອຢູ່ນິວມີ ຫຼື ອາດເປັນຢູ່ໝົດຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ພະຍາດໝາກແດງ.

Infectious disease (ພະຍາດຊຶມເຊື້ອ) ພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນເຊື້ອແບກທີ່ເລັ້ຍ, ໄວລັສ ຫຼື ອື່ນໆທີ່ເກີດໃນປະເທດເຂດຮ້ອນ.

Inflammation (ການອັກເສບ) ບໍລິເວນທີ່ເປັນຈະແດງ, ຮ້ອນ ແລະ ເຈັບ.

Insecticide (ຢາຂ້າແມງໄມ້) ຢາເບື້ອທີ່ໃຊ້ຂ້າແມງໄມ້, ດີ-ດີ-ທີ ແລະ ຢາລິນດານແມ່ນຢາໃຊ້ສໍາລັບຂ້າແມງໄມ້.

*Insomnia (ອາການນອນບໍ່ຫຼັບ) ສະພາບຂອງຄົນນອນບໍ່ຫຼັບເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະຫິວນອນ ແລະ ຢາກນອນຫຼາຍປານໃດກໍຕາມ.

Insulin (ທາດລົດນໍ້າຕານ) ທາດ(Insulin) ທີ່ມ້າມເປັນຜູ້ຜະລິດມາເພື່ອຄວບຄຸມປະລິມານຂອງນໍ້າຕານໃນເລືອດ. ບາງເທື່ອຕ້ອງໄດ້ສັກທາດລົດນໍ້າຕານນີ້ໃຫ້ຄົນທີ່ເປັນເປົ້າຫວານ. ພະຍາດເປົ້າຫວານ.

Intestinal parasites (ກາຝາກລໍາໄສ້, ແມ່ທ້ອງ) ແມ່ທ້ອງ ແລະ ສັດນ້ອຍໆຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນລໍາໄສ້ຂອງຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດຕ່າງໆ.

Intestines (ລຳໄສ້) ໄສ້ ຫຼື ທີ່ສົ່ງອາຫານທີ່ຍ່ອຍ ແລ້ວເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຖ່າຍເທສິ່ງເສດເຫຼືອ(ອາຈົມ) ອອກທາງຮູທະວານ.

Intramuscular (IM) injection ການສັກຢາເຂົ້າກ້າມຊີ້ນເຊັ່ນ: ທີ່ແຂນ ຫຼື ສະໂພກ. ແຕກຕ່າງຈາກວິທີສັກຢາເຂົ້າເສັ້ນ (IV) ທີ່ແທງເຂົ້າເສັ້ນເລືອດໂດຍກົງ.

Intussusception (ໄສ້ສູບໄສ້) ພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງລຳໄສ້ທີ່ສູບເຂົ້າກັນ, ສ່ວນຫຼາຍມັກພາໃຫ້ເກີດເປັນໄສ້ຕັນກະທັນຫັນ.

Iris (ຕ້າກັງຕາ) ສ່ວນທີ່ເປັນສີເຂັ້ມຂອງໜ່ວຍຕາຢູ່ອ້ອມຕາດຳ.

Jaundice (ອາການເຫຼືອງ) ອາການຜິວໜັງເປັນສີເຫຼືອງ, ຕາເຫຼືອງຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງເນື່ອງມາຈາກຖົງນໍ້າບີ ແລະ ຕັບ.

K (ເຄ)

*Keratomalacia (ພະຍາດຕາແຫ້ງ) ອາການຕາຟາງຈົນ ໃນທີ່ສຸດກໍເປັນຕາບອດ. ເນື່ອງມາຈາກການຂາດວິຕາມິນເອ.

Kidneys (ໝາກໄຂ່ຫຼັງ) ອະໄວຍະວະໃຫຍ່ມີຮູບຮ່າງຄື ໃນໝາກຖົ່ວ, ໄຂ່ຫຼັງນີ້ໜ້າທີ່ກັ່ນຕອງຂອງເສັ້ຍອອກຈາກເລືອດ, ເຮັດໃຫ້ເປັນນ້ຳຢູ່ວ.

Kidneys stones (ຫີນໄຂ່ຫຼັງ) ເປັນຄືກ້ອນຫີນນ້ອຍຢູ່ໃນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ເຄື່ອນລົງມາຕາມທໍ່ຢູ່ວ. ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບແອວ, ເຈັບຂ້າງ, ເຈັບບໍລິເວນທໍ່ຢູ່ວ ແລະ ທ້ອງນ້ອຍແຮງ. ຫີ້ວໃນພິກຢູ່ວອາດອຸດຕັນທໍ່ຢູ່ວເຮັດໃຫ້ຢູ່ວບໍ່ອອກ ແລະ ເຈັບປ່ວດຢ່າງຮຸນແຮງ.

Kilogram (kg.) (ກິໂລກຼາມ) ເທົ່າກັບ 1000 ກຼາມ. 1 ກິໂລກຼາມຫຼາຍກວ່າ 2 ປອນເລັກໜ້ອຍ.

Kwashiorkor (wet malnutrition) (ພະຍາດຂາດອາຫານຊະນິດບວມ) ພະຍາດຂາດອາຫານຢ່າງແຮງທີ່ມີສາຍເຫດມາຈາກການກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີທາດ ໄຢຼຕີນພຽງພໍ. ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນພະຍາດຂາດອາຫານຊະນິດບວມນີ້ມີຕີນມື ແລະ ໜ້າໂຄ່ບວມ ແລະ ເປັນບາດໜັງລອກ.

L (ແລ)

Labor (ອາການບັນທ້ອງ, ການເຈັບທ້ອງອອກລູກ) ການບົບຮັດຂອງມິດລູກ ຊຶ່ງເປັນສັນຍານບອກວ່າເດັກນ້ອຍພວມຈະເກີດອອກມາແລ້ວ.

Larva (Larvae)(ຕົວອ່ອນ, ໂຕຕັດວຽງ) ລູກຂອງແມງໄມ້ ຫຼື ແມ່ກຳຝາກຫຼາຍໆ ຊະນິດທີ່ຫາກໍແຕກອອກຈາກໄຂ່. ເມື່ອມັນໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກໍຈະປ່ຽນຮູບຮ່າງໃໝ່.

Latrine (ວິດ) ວິດທີ່ປູກໄວ້ຕ່າງຫາກຢູ່ຫ່າງຈາກເຮືອນ ໂດຍຊຸດເປັນຊຸມໄວ້ທາງໃນເພື່ອຖ່າຍໄສ່ຊຸມວິດ.

Laxative (ຢາຖ່າຍ) ຢາທີ່ໃຊ້ສຳລັບແກ້ທ້ອງຜູກທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຈົມແຫຼວ ແລະ ຖ່າຍງ່າຍຖ່າຍເລື້ອຍໆ.

Ligaments (ເອິນ) ເສັ້ນເອິນທີ່ຈັບຢູ່ຕາມຂໍ້ຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະທຸກພາກສ່ວນຄົງທີ່.

*Lingual (ກ່ຽວກັບລິ້ນ) ທີ່ພົວພັນ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິ້ນ.

Liter (l)(ລິດ)(ລ.) ຫົວໜ່ວຍໃນການວັດແທກບໍລິມາດ. ນໍ້າ 1 ລິດມີມວນສານຢູ່ 1 ກກ. 1 ລິດເກືອບເທົ່າກັບ 1 ກກ.

Liver (ຕັບ) ອະໄວຍະວະໃຫຍ່ສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງກະດູກຂ້າງໆຂວາທີ່ຊ່ວຍໃນການກັ່ນຕອງ ເລືອດໃຫ້ສະອາດ ແລະ ຂັບຖ່າຍທາດເບືອອອກຈາກເລືອດ.

Loss of consciousness (ໝົດສະຕິ, ການເສຍສະຕິ) ສະພາບຄົນເຈັບເບິ່ງຄືວ່າ ພວມຫຼັບຢູ່ ແລະ ບໍ່ສາມາດປູກໃຫ້ຕົນໄດ້, ຂາດຄວາມຮູ້ສຶກ, ສະຫຼົບ.

*Lubricant (ສານຫຼໍ່ລິ້ນ) ນຳ້ມັນ ຫຼື ຄືມໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜ້າພຽງໃດໜຶ່ງເກີດຄວາມມັນ.

Lymph nodes (ຕ່ອມນ້ຳຢາງເຫຼືອງ, ກະດັນ) ເປັນຕ່ອມນ້ອຍໆທີ່ຢູ່ກ້ອງຜິວໜັງຂອງສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັນແນວໜ້າໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ. ມັນຈະມີອາການເຈັບປວດ ແລະ ໄຄ່ໃນເວລາຕິດເຊື້ອພະຍາດ. ສຳລັບວັນນະໂລກ ແລະ ມະເຮັງມັນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະໄຄ່ແຕ່ບໍ່ເຈັບ.

Lyophilized (ຢາຝຸ່ນ) ວິທີປຸງຢາສັກໃຫ້ແຫ້ງເປັນຝຸ່ນເພື່ອສະດວກໃນການເກັບມ້ຽນໄວ້ໃຊ້ດົນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຕູ້ເຢັນໄວ້.

M (ເອັມ)

Malnutrition (ການຂາດອາຫານ) ບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການກິນອາຫານບໍ່ພຽງພໍຊຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

Marasmus (dry malnutrition) (ພະຍາດຂາດອາຫານ) ສະພາບທີ່ເກີດມາຈາກການກິນອາຫານບໍ່ພຽງພໍ. ອິດທິວ. ຄົນເຈັບຈະຈອຍຫຼາຍ ແລະ ນ້ຳໜັກນ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ມັກມີທ້ອງໃຫຍ່ສົມທົບນຳ.

Mask of pregnancy (ໜ້າເຂົ້າຝ້າໃນແມ່ຍິງຖືພາ) ແມ່ຍິງຖືພາຈະມີສີເຂັ້ມຢູ່ຕາມບໍລິເວນໜ້າ, ໜ້າເອິກ ຫຼື ບໍລິເວນທ້ອງຊຶ່ງອາການເຫຼົ່ານີ້ເປັນຂອງທຳມະຊາດ.

Mastitis (breast abscess) (ເຕົ້ານົມອັກເສບ) ພະຍາດຕິດເຊື້ອຢູ່ເຕົ້ານົມ, ສ່ວນຫຼາຍມັກເປັນເວລາອາທິດທຳອິດ ຫຼື ເດືອນທຳອິດຂອງການລົງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່. ມີອາການເຕົ້ານົມໂຄ່ (ເບັງ), ແດງ ແລະ ອອກຮ້ອນ.

Membrane (ເຈັ້ງໜັມ) ເປັນແຜ່ນບາງໆໜຽວໆທີ່ຫຸ້ມຂໍ້ບາກພາກສ່ວນຂອງທີ່ມີຊີວິດທັງຄົນ, ສັດ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້.

Menopause (climacteric) (ໝົດປະຈຳເດືອນ) ເວລາທີ່ແມ່ຍິງເຊົາມີປະຈຳເດືອນຕາມທຳມະດາແລ້ວແມ່ນລະຫວ່າງອາຍຸ 40 ຫາ 50 ປີ.

Menstrual period menstruation (ການເປັນປະຈຳເດືອນ ຫຼື ການເປັນລະດູ) ການລົງເລືອດຂອງແມ່ຍິງໃນແຕ່ລະເດືອນ. ການເປັນລະດູ.

Mental (ທາງສະໜອງ) ກ່ຽວກັບ ຫຼື ພົວພັນກັບຄວາມຮູ້ສຶກ, ນິກິດທາງມັນສະໜອງ, ທາງຄວາມນິກິດທາງໃຈ.

Micro-organism (ຈຸລະຊີບ) ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ສັດນ້ອຍໆທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດເທົ່ານັ້ນ.

Microscope (ກ້ອງຈຸລະທັດ) ເຄື່ອງມືທີ່ມີແກ້ວຂະຫຍາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນຮູບຂອງວັດຖຸສິ່ງຂອງນ້ອຍໆຂະຫຍາຍໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ.

Microscopic (ທີ່ເປັນຂອງນ້ອຍສຸດ) ເປັນຂອງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດເທົ່ານັ້ນ.

Milligram (mg)(ມິນລິກຼາມ)(ມລກ.) ໜຶ່ງສ່ວນພັນ (1/1000) ຂອງກຼາມ. ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ:ມລກ.

Milliliter (ml)(ມິນລິລິດ)(ມລ.) ໜຶ່ງສ່ວນພັນ (1/1000) ຂອງລິດ. ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ:ມລ.

Minerals (ແຮ່ທາດ) ແຮ່ທາດຊະນິດນຶ່ງ ຫຼື ສິ່ງຂອງອື່ນໆ ທີ່ຮ່າງກາຍຄົນຕ້ອງການເຊັ່ນ: ທາດຟຼີກ, ແຄນຊຽມ ແລະ ໄອໂອດິນ.

Miscarriage (spontaneous abortion) (ການຫຼຸດລູກ) ລູກຕາຍໃນມິດລູກ, ບາງເທື່ອອາດມີການລົງເລືອດຢ່າງແຮງ ແລະ ມີກ້ອນເລືອດອອກມານຳ. ເປັນການຫຼຸດລູກທຳມະຊາດ.

Mongolish (Down's syndrome) ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນທາງພັດທະນາການຂອງເດັກເຫັນໄດ້ຈາກລັກສະນະພາຍນອກຄືມີກະໂຫຼກທົ່ວແປ, ຕານ້ອຍ, ມີໃຫ້ຍແລະ ນິ້ວມືສັ້ນ.

Morning sickness (ອາການແພ້ທ້ອງ) ອາການປວດຮາກ ແລະ ຮາກຊິ່ງແມ່ຍິງຖືພາໂລຍະເລີ່ມຕົ້ນມັກເປັນໃນເວລາເຊົ້າ.

Mouth-to-mouth breathing (ການໃຊ້ປາກຊ່ວຍຫາຍໃຈ) ການຫາຍໃຈທຽມ. ວິທີຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບທີ່ເຂົ້າຫາຍໃຈດ້ວຍການດູດ-ເປົ່າລົມດ້ວຍປາກເຂົ້າໄປໃນປາກຄົນເຈັບເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບເລີ່ມຕົ້ນຫາຍໃຈຄືນໃໝ່.

Mucus (ມູກ, ນ້ຳເມືອກ) ທາດແຫຼວ ຫຼື ນ້ຳໜຽວໆທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ດັງ, ຮູຄໍ, ກະເພາະອາຫານ, ລຳໂສ້ ແລະ ຊອງຄອດມັນ.

N(ເອັ້ນ)

Narrow-spectrum antibiotic (ຢາຕ້ານເຊື້ອສະເພາະ) ຢາທີ່ມີປະສິດທິຜົນຕ້ານເຊື້ອແບກທີ່ເລັຍສະເພາະຊະນິດໃດຊະນິດໜຶ່ງ.

*Nasal (ກ່ຽວກັບດັງ) ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຫຼື ພົວພັນກັບດັງ.

Nausea (ປວດຮາກ) ກະເພາະອາຫານປັ່ນປ່ວນ, ປຸ້ນທ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກປວດຮາກ.

Navel (ສາຍບີ) ບ່ອນທີ່ສາຍແທ້ຕິດກັບຮ່າງກາຍຢູ່ກາງທ້ອງ. ເປັນຂຸມໜັງນ້ອຍໆຢູ່ເຄິ່ງກາງທ້ອງ.

Nerves (ເສັ້ນປະສາດ) ເສັ້ນປະສາດທີ່ອອກຈາກສະໝອງແຕ່ໄປຕາມທຸກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ນຳເອົາສັນຍານຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ.

Non-infectious disease (ພະຍາດຊຶມເຊື້ອທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່) ພະຍາດຊຶມເຊື້ອທີ່ບໍ່ແຜ່ລາມໄປຕິດຄົນອື່ນ.

Normal (ທຳມະດາ) ປົກກະຕິ ຫຼື ໂດຍທຳມະຊາດ. ສິ່ງ ຂອງທຳມະດາແມ່ນສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ມີຫຍັງຜິດໄປຈາກປົກກະຕິ.

Nutritious (ໂພຊະນາການ) ການກິນອາຫານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ. ອາຫານທີ່ຖືກຫຼັກການແມ່ນອາຫານທີ່ມີສິ່ງທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການສຳລັບການຂະຫຍາຍຕົວເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ມີແຮງເພື່ອຕ້ານທານຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດຕ່າງໆ.

O (ໂອ)

Obstruction (ການອຸດຕັນ) ສະພາບເລີ່ມຕົ້ນການອຸດຕັນຕົ້ນ. ລຳໂສ້ຕົ້ນແມ່ນການແພດສຸກເສີນຕ້ອງໄດ້ນຳສິ່ງໂຮງໝໍ ໃນທັນທີ.

Ointment (ຂີ້ເຜີ້ງ) ຢາປະເພດແຂ້ນ ຫຼື ແຫຼວຄືນຳມັນໃຊ້ສຳລັບພະຍາດຜິວໜັງ.

*Ophthalmic ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕາ.

*Oral (ຊະນິດກິນ) ເຂົ້າທາງປາກ, ຊະນິດກິນ.

Organ (ອະໄວຍະວະ) ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍທີ່ມີຄວາມສົມບູນໃນໂຕ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງໃຜມັນຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ປອດແມ່ນອະໄວຍະວະສຳລັບການຫາຍໃຈ.

Organisms (ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ) ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເຊັ່ນ: ສັດ ຫຼື ພືດ.

*Otic (ກ່ຽວກັບຫູ) ມີໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫູ.

Ounce (ອອນ) ຫົວໜ່ວຍວັດແທກນຳໜັກ 1 ອອນເທົ່າກັບ 28 ກ. ປອນໜຶ່ງມີຢູ່ 16 ອອນ.

Ovaries (ຮວຍໄຂ່) ຖືກນ້ອຍໆສ່ວນຫລາຍຢູ່ທາງຂ້າງມິດລູກຂອງແມ່ຍິງ. ມີໜ້າທີ່ຜະຫຸລິດໄຂ່, ເມື່ອໄຂ່ຖືກປະສົມກັບຕົວອະສຸຈິຂອງຜູ້ຊາຍແລ້ວກໍຈະເກີດເປັນລູກໃນທ້ອງ.

Oxytocics (ຢາກະຕຸ້ນມິດລູກ) ເປັນຢາອັນຕະລາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ມິດລູກ ແລະ ເສັ້ນເລືອດໃນມິດລູກບົບຮັດຕົວ. ມັນຖືກໃຊ້ສະເພາະຄວບຄຸມເລືອດໄຫຼຢ່າງຮຸນແຮງສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ເກີດລູກໃໝ່.

P (ພີ)

Palate (ເພດານປາກ) ສ່ວນທາງເທິງຢູ່ໃນໆຂອງປາກ.

Pancreas (ມ້າມ) ອະໄວຍະວະທີ່ຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງກະເພາະອາຫານຢູ່ຂ້າງຊ້າຍ ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ໃນການຜະຫລິດແຮງຊູຍລິນທີ່ຄວບຄຸມນຳຕານ ໃນເລືອດ.

Pannus (ເສັ້ນເລືອດຝອຍຕາ) ເສັ້ນເລືອດນ້ອຍໆທີ່ປາກົດຢູ່ສິ້ນເທິງຂອງແກ້ວຕາ, ຂອງພະຍາດຕາບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ລິດສະດວງຕາ.

Paralysis (ເປັນລ່ອຍ) ການສູນເສຍການບັງຄັບການເຄື່ອນໄຫວສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ ຫຼື ພືດຮ່າງກາຍ.

Parasites (ແມ່ກາຝາກ) ແມ່ທ້ອງ ແລະ ສັດນ້ອຍໆທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສັດ ຫຼື ອາໄສຢູ່ນຳຄົນຊຶ່ງເປັນສາເຫດເປັນພະຍາດບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ພືດ, ແມ່ກາຝາກລຳໂສ້ ແລະ ເຊື້ອອາມິບາກຳແມ່ນກາຝາກ.

*Parenteral (ຢາຊະນິດສັກ) ຢາໃຊ້ສຳລັບສັກເທົ່ານັ້ນ, ຫ້າມກິນ.

Pasteurization (ການອະເຊື້ອ) ວິທີການຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃນນຳນົມ ຫຼື ຂອງແຫຼວອື່ນໆ ໃນອຸນຫະພູມໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ຂ້າເຊື້ອນຳນົມໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ (60ອົງສາ) ເປັນເວລາ 30 ນາທີ.

Pelvis (ກະດູກຊາມ) ກະດູກຢູ່ເທິງກົກຂາ.

Peritoneum (ເຍື່ອຫຸ້ມທ້ອງ) ແຜ່ນບາງໆຢູ່ລະຫວ່າງລຳໂສ້ກັບກຳແພງຂອງຜູ້ທ້ອງ. ຖືກທີ່ຍືດລຳໂສ້ໄວ້.

Peritonitis (ເຍື່ອຫຸ້ມທ້ອງອັກເສບ) ການອັກເສບຢ່າງຮຸນແຮງໃນເຍື່ອຫຸ້ມໃນທ້ອງ. ເຮັດໃຫ້ເຈັບທ້ອງຢ່າງແຮງ, ທ້ອງແຂງຄືກະດານ ແລະ ນອນຢຽດຂາບໄດ້.

Pernicious anemia (ພະຍາດເລືອດຈາງ) ພະຍາດເລືອດຈາງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນ, ເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກການຂາດວິຕາມິນB12.

Petroleum Jelly (petrolatum, Vaseline) (ຢາບີ ໂຕລູມເຈີລີ(ວາສະລິນ)) ນຳມັນໃຊ້ໃນການເຮັດຂີ້ເຜີ້ງສຳລັບພະຍາດຜິວໜັງ.

Pharmacy (ຮ້ານຂາຍຢາ) ຮ້ານທີ່ຂາຍຢາ ແລະ ສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ.

Phlegm (ຂີ້ກະເທົ່) ນໍ້າເມືອກທີ່ເປັນໜອງທີ່ມີປະລິມານ ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິໃນປອດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຂັບອອກ ຫຼື ໄອອອກມາ.

Piles (ລິດສະດວງທະວານ) ໃຫ້ເບິ່ງຄຳວ່າ Hemorrhoids

Pimples (ສິວ) ໃຫ້ເບິ່ງຄຳວ່າ Acne.

Placenta (afterbirth) (ແທ່) ເປັນພິກຍູ່ໃນມົດລູກ ແລະ ມີສາຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຮ່າງກາຍລູກ ແລະ ແມ່. ຕາມ ທຳມະດາແລ້ວແທ່ມັກຈະອອກມາພາຍຫຼັງແອນ້ອຍເກີດໄດ້ 15 ນາທີ ຫາ ເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ.

Placenta previa (ແທ່ຈັບຕໍ່າ) ສະພາບທີ່ແທ່ຈັບຢູ່ໃນມົດ ລູກຕ່ຳຫຼາຍ ໄພດອັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຕົ້ນປາກມົດລູກ. ການສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະລາຍໃນການເລືອດໄຫຼ. ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ມີ ເລືອດອອກກ່ອນການເກີດອາດຈະແມ່ນອາການຂອງແທ່ຈັບ ຕໍ່າສະນັ້ນຄວນໄປໂຮງໝໍທັນທີ.

Plantain ແມ່ນກ້ວຍຊະນິດນຶ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກ້ວຍນໍ້າຫວ້າທີ່ມີ ທາດແປ້ງ ແລະ ໄຍສັງເຄາະຫຼາຍ. ສ່ວນຫລາຍມັກກິນ ແລະ ມາປຸງແຕ່ງໃນເວລາທີ່ເປັນສີຂຽວ (ດິບ).

Pollen (ລະອອງເກສອນດອກໄມ້) ຝຸ່ນມຸ່ງນູມີໃນດອກໄມ້. ຄົນທີ່ມີອາການແພ້ຕໍ່ເກສອນມັກຈະເປັນພະຍາ າດແພ້ຝຸ່ນ ໃນລະດູທີ່ດອກໄມ້ອອກດອກ ແລະ ມີເກສອນປົນຢູ່ໃນອາກາດຫຼາຍ.

Postpartum (ຫຼັງຄອດ) ພາຍຫຼັງການອອກລູກແລ້ວ.

Postpartum hemorrhaging (ອາການເລືອດໄຫຼພາຍຫຼັງເກີດລູກ) ອາການເລືອດໄຫຼຢ່າງ ແຮງຂອງແມ່ທີ່ເກີດລູກໃໝ່.

Power of suggestion or power of belief (ອຳນາດຂອງຄວາມເຊື່ອ) ຜົນສະທົບຂອງຄວາມເຊື່ອຖືຢ່າ ງໜັກແໜ້ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຄົນເຈັບມີຄວາມຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນຍ້ອນ ເຂົ້າມີຄວາມເຊື່ອຖືໃນວິທີການປິ່ນປົວແບບໜຶ່ງເຖິງແມ່ນວ່າ ວິທີການປິ່ນປົວນີ້ຈະບໍ່ໃຫ້ຜົນທາງການແພດກໍຕາມ.

Precaution (ຂໍ້ຄວນລະວັງ) ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄຳແນະ ນຳເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ ຫຼື ເພື່ອກຽມພ້ອມສຳລັບ ກໍລະນີສຸກເສີນໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ.

Pregnancy (ການຖືພາ) ໄລຍະເວລາທີ່ແມ່ຍິງມີລູກ (ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ 9 ເດືອນ).

Premature baby (ແອນ້ອຍເກີດກ່ອນກຳນົດ) ແອ ນ້ອຍທີ່ເກີດມາກ່ອນຄົບກຳນົດເວລາຖືພາຄື 7 ເດືອນ ແລະ ມີນ້ຳໜັກໜ້ອຍກວ່າ 2 ກິໂລກຼາມ.

Presentation of an arm (ການເກີດເອົາແຂນອອກກ່ອນ) ແອນ້ອຍເກີດບໍ່ຖືກທຳ ໂດຍເອົາມືອອກກ່ອນ. ມັນແມ່ນເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ໄປຫາທ່ານໝໍໃນທັນທີ.

Prevention (ການປ້ອງກັນ) ການກະທຳເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດເກີດຂຶ້ນ.

Prolapse (ການຢ່ອນ) ການເຕືອຍລົງ ຫຼື ສ່ວນໃດສ່ວນ ໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍຢ່ອນລົງຈາກທ່າຢູ່ປົກກະຕິຂອງມັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ມົດລູກຢ່ອນ, ໄສ້ສຸດຢ່ອນ.

Prophylactic (ການປ້ອງກັນພະຍາດ) ມີຄວາມໝາຍດຽວກັບຄຳສັບ Preventive (ການປ້ອງກັນ) ແຕ່ບາງເທື່ອກໍໝາຍວ່າການຄຸມກຳເນີດດ້ວຍການໃຊ້ຖົງຢາ ງອະນາໄມ.

Prostate gland (ຕ່ອມລູກໝາກ) ຕ່ອມທີ່ປະກອບດ້ວຍ ກ້າມຊີ້ນຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງທ້ອງຜູ້ຊາຍ, ຄົນເຮົາເມື່ອອາຍຸສູງ ຂຶ້ນຕ່ອມນີ້ຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນນຳ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຍ່ຽວຍາກ.

Protective foods (ອາຫານປະເພດປ້ອງກັນຮ່າງກາຍ) ອາຫານປະເພດທີ່ມີວິຕາມິນ ແລະ ທາດແຮງຫຼາຍມັນຊ່ວຍ ໃນການເສີມສ້າງຮ່າງກາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນມີຄວາມຕ້ານ ທານຕໍ່ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ.

Proteins (ໂປຼຕີນ) ອາຫານທີ່ຮ່າງກາຍສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ມີ ຄວາມຈຳເປັນສຳລັບເສີມສ້າງຮ່າງກາຍ ແລະ ເທື່ອແຮງ.

Pterygium (ຊີ້ນປົ່ງຢູ່ຕາ) ອາການທີ່ໜຶ່ງຕາຄ່ອຍໜາຂຶ້ນໄປ ຫາແກ້ວຕາ, ຍ້ອນເກີດການອັກເສບ.

Pulse (ກຳມະຈອນ) ຈຳນວນເທື່ອເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈໃນໜຶ່ງ ນາທີ.

Pupil (ຕາດຳ) ວົງຕາດຳເປິດອອກຢ່າງກວ້າງມ່ານຕາ. ໃນແສງແຈ້ງສະຫວ່າງມັນຈະນ້ອຍເຂົ້າ ແລະ ມັນຈະໃຫຍ່ອອກໃນຄວາມມືດ.

Purge (ຢາຖ່າຍຊະນິດແຮງ) ຢາຖ່າຍທີ່ມີປະສິດຖິຜົນແຮງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຖອກທ້ອງ.

R (ອາຣ)

Rate (ອັດຕາ) ຈຳນວນເທື່ອເຊິ່ງສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ໃນ ໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ.

Rebound pain (ອາການເຈັບເວລາຂັ້ມ) ອາການເຈັບ ປວດຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ທ້ອງເມື່ອຖືກຂັ້ມດ້ວຍມືຫລັງຈາ ກຸປ່ອຍມືຊ້າໆແລ້ວອາການເຈັບກໍຈະຫລຸດຜ່ອນລົງ. ຊຶ່ງອາການນີ້ແມ່ນ ອາການໜຶ່ງຂອງການເຈັບທ້ອງກະທັນ ຫັນ.

Rectum (ໄສ້ສຸດ) ສິ້ນສຸດຂອງໄສ້ໃຫຍ່ມາສຸດຢູ່ຮູຖ່າຍ.

Reflex (ການໂຕ້ຕອບ) ປະຕິກິລິຍາຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ຄົນບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມ (ຕັ້ງໃຈ) ເຮັດ ຫຼື ບັນຊາໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ.

Rehydration Drink (ເຄື່ອງດື່ມເສີມນ້ຳໃນຮ່າງກາຍ) ເຄື່ອງດື່ມແກ້ການຂາດນ້ຳທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເອົາເອງ ໄດ້ໂດຍປະສົມນ້ຳສຸກກັບນ້ຳຕານ, ເກືອ ແລະ ໂຊດາ ໄບຄາບໍເນດ.

Resistance (ຄວາມຕ້ານທານ) ຄວາມສາມາດໃນຕົວ ຂອງອັນໃດອັນໜຶ່ງເພື່ອຕ້ານທານອັນອື່ນທີ່ຈະມາທຳລາຍ ຫຼື ຂົ່ມຂຶ້ນ. ເຊື່ອແບກທີ່ເລີຍຫຼາຍຊະນິດເກີດຄວາມຕ້ານທານ (ລົງ) ຕໍ່ປະສິດຖິຜົນຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອບາງຊະນິດ.

Resource (ບໍ່ເກີດ) ສິ່ງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ມີຄວາມເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ ຫຼື ນຳມາເຮັດເປັນ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄົນ, ດິນ, ສັດ ເງິນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບໍ່ເກີດທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນການ ບັບປຸງທາງດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ.


Resource (ບໍ່ເກີດ) ສິ່ງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ມີຄວາມເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ ຫຼື ນຳມາເຮັດເປັນ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄົນ, ດິນ, ສັດ ເງິນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບໍ່ເກີດທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນການ ບັບປຸງທາງດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

Respiration (ການຫາຍໃຈ) ລະບົບການຫາຍໃຈປະກອບດ້ວຍຫຼອດລົມ, ປອດ ແລະ ອະໄວຍະວະອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ໃນການຫາຍໃຈ.

Respiration rate (ອັດຕາການຫາຍໃຈ) ຈຳນວນເທື່ອຫາຍໃຈຂອງຄົນໃນ 1 ນາທີ.

Retardation (ການຊັກຊ້າ) ການຊັກຊ້າທີ່ຜິດປົກກະ ຕິຂອງຄວາມຄິດ, ການກະທຳ ຫຼື ຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ.

Rhinitis (ອັກເສບຜິ້ງດັງ) ການອອກຮ້ອນໃນຜິ້ງຮູດັງ ຊຶ່ງ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດມາຈາກການແພ້, ອາການແພ້ຝຸ່ນ.



Risk (ອັນຕະລາຍ) ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າອາດມີຄວາມຜິດ, ຄວາມສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເຈັບເປັນເກີດຂຶ້ນ.

Rotation of crops (ການປູກພືດພູນວຽນ) ການປູກພືດຊະນິດຕ່າງໆພູນວຽນກັນ ໃນເນື້ອທີ່ດຽວກັນ ຊຶ່ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ດິນດີມີຜົນຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

Rupture (ການຈຶກຂາດ) ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບຄຳສັບ Hernia.

S (ເອສ)

Sanitation (ອະນາໄມ) ການຮັກສາຄວາມສະອາດໃນຂອບເຂດກວ້າງແນໃສ່ການປ້ອງກັນພະຍາດ, ມີແຜນການທາງດ້ານສະຂະພິບານ ແລະ ຮັກສາສະຖານທີ່ສາທາລະນະໃຫ້ປອດໄພຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ.

Scrotum (ຖົງອັນທະ) ຖົງໜັງຢູ່ຫ່ວງຂາຜູ້ຊາຍທີ່ທັມໄຂ່ທຳ.

Sedative (ຢາລະງັບ) ແມ່ນຢາທີ່ເຮັດໃຫ້ຢາກນອນ ຫຼື ນອນຫລັບ.

Seizure (ຊັກ) ແມ່ນອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນກະທັນຫັນເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຄອບຄຸມຕົວເອງໄດ້ ຫຼື ບາງຄັ້ງອາດຈະໝົດສະຕິ.

Septicemia (ຊິມເຊັອເລືອດ) ການຊິມເຊັອຂອງເລືອດ. ບາງເທື່ອເຮົາເອີ້ນວ່າເລືອດເປັນພິດ.

Sexually transmitted infection (STI) (ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ) ແມ່ນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ ຫຼື ແຜ່ລາມໂດຍການຮ່ວມເພດ.

Shock (ຊິອກ ຫຼື ສະຫຼົບ) ສະພາບອັນຕະລາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນໝົດສະຕິ, ຕົນໂຕເຢັນ, ກຳມະຈອນເຕັ້ນຄ່ອຍ ແລະ ໄວ, ມັນມີສາເຫດມາຈາກການເສຍນ້ຳໃນຮ່າງກາຍ, ເສຍເລືອດຫຼາຍ, ບາດເຈັບຮຸນແຮງ, ຖືກໄພໄພ ຫຼື ຈາກພະຍາດຮ້າຍແຮງອື່ນໆ.

Side effects (ຜົນຂ້າງຄຽງ, ກຳມະຜົນສຳຮອງ) ຜົນກະທົບທາງບໍ່ດີທີ່ເກີດມາຈາກການໃຊ້ຢາຊະໜິດໃດໜຶ່ງ.

Signs (ອາການ) ອາການສະແດງຂອງຄົນເຈັບ ຫຼື ອາການທີ່ທ່ານໝັກວດພົບໃນຄົນເຈັບ ຫຼື ເປັນສັນຍານບອກໃຫ້ທ່ານໝັກຮູ້ວ່າຄົນເຈັບເປັນພະຍາດຫຍັງ? ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ຄຳວ່າ "ສັນຍານ ແລະ ອາການ (sign and symptom) ໃຊ້ຄຳດຽວແທນຄື: ໃນພາສາລາວໃຊ້ຄຳວ່າ "ອາການ" ໃນພາສາອັງກິດໃຊ້ຄຳວ່າ "Sign"

Sinus trouble (Sinusitis) (ອັກເສບຜິ້ງດັງ) ການອັກເສບຜິ້ງດັງ(ຜິ້ງອາກາດ)ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຈັບປວດຢູ່ບໍລິເວນເທິງ ແລະ ລຸ່ມເປົ່າຕາ.

Soft drinks (ນ້ຳອັດລົມ) ເຄື່ອງດື່ມທີ່ອັດອາຍຄາບໂເນດ ເຊັ່ນ: ແປບຊີ, ໂຄລາ, ແລະ ອື່ນໆ ...

Soft spot (ຂະມ່ອມ) ຄຳສັບ Fontanel ມີຄວາມໝາຍດຽວກັບຄຳສັບນີ້(ຂະມ່ອມ).

Spasm (ການບິບຮັດ) ກ້ອນຊຶ້ນຫົດຕົວໃນທັນທີໂດຍທີ່ຄົນເຈັບບໍ່ສາມາດບໍ່ຄຳຄົນໄດ້. ລຳໄສ້ບິບຮັດເຮັດໃຫ້ເກີດທ້ອງບິດ ຫຼື ໄລ່ບິດ. ຫຼອດລົມບິບຮັດເຮັດໃຫ້ເປັນຫິດ. ຄາງ ແລະ ກ້ອນຊຶ້ນອື່ນຮັດ ເຮັດໃຫ້ຄາງແຂງເຊັ່ນ: ໃນພະຍາດບາດທະຍົກ.

Spastic (ການສັ່ນ) ກ້ອນຊຶ້ນບິບຕົວຢ່າງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ເປັນຊຳເຮື້ອເກີດມາຈາກສະໝອງຖືກກະທົບກະເທືອນ. ຂາຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ເຈັບມັກຈະໄຄວ່ກັນຄືຂາມິດຕັດ.

Spleen (ປັ່ງ) ອະໄວຍະວະຢູ່ໃນທ້ອງຢູ່ລຸ່ມກະດູກຂ້າງຊ້າຍ ມີໜ້າທີ່ການຊ່ວຍສ້າງ ແລະ ກັນຕ້ອງເລືອດ.

Spontaneous abortion (ການຫຼຸລູກ) ການຫຼຸລູກມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບຄຳສັບ Miscarriage.

Sprain (strain) (ອາການເຄັດ) ອາການເຄັດຕາມຂໍ້ທີ່ເກີດຈາກເສັ້ນເອ້ນບິດ ຫຼື ເສັ້ນເອ້ນພິກ.

Sputum (ຂີ້ກະເທົ່) ນ້ຳເມືອກປົນໜອງທີ່ນຳເມືອກທີ່ຂັບອອກມາຈາກປອດ ໂດຍຜ່າງທາງຫຼອດລົມ.

Starches (ທາດແປ້ງ) ອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງງານເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ພວກແປ້ງ, ເຂົ້າສາລີ ແລະ ມັນຕ່າງໆ.

Sterile (ການອະເຊື້ອ) ຫຼື (ການເຮັດໝັ້ນ) (1) ສະອາດຢ່າງສົມບູນ ແລະ ປາສະຈາກເຊື້ອໂລກ. ສິ່ງຂອງປອດເຊື້ອແມ່ນສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ຜ່ານການຕົ້ມ ຫຼື ໜັງມາແລ້ວ (2) ການເຮັດໝັ້ນຍິງ ຫຼື ໝັ້ນຊາຍຖາວອນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີລູກ.

Sterilization (1) ການອະເຊື້ອເຄື່ອງມືໂດຍການຕົ້ມ ຫຼື ໜັງ. (2) ວິທີການເຮັດໝັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຜູ້ຍິງບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້.

Stethoscope (ເຄື່ອງຟັງ) ເຄື່ອງມືໃນການຟັງສຽງພາຍໃນຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຟັງສຽງເຕັມຂອງຫົວໃຈ.

Stomach (ກະເພາະອາຫານ) ອະໄວຍະວະອັນໜຶ່ງເປັນຖົງຢູ່ໃນທ້ອງເປັນບ່ອນຢ່ອຍອາຫານ. ໃນຄວາມເວົ້າທົ່ວໄປ ຄຳວ່າກະເພາະມັກຈະໝາຍເຖິງທ້ອງເລື້ອຍໆ.

Stools (ອາຈົມ) ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບ Feces (ຂີ້)

Stroke (apoplexy, cerebro-vascular accident) (ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນສະໝອງ) (ອຸບັດເຫດກຽວກັບເສັ້ນ ເລືອດໃນສະໝອງ) ໝົດສະຕິເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ການ ເຄື່ອນໄຫວໃນທັນທີທີ່ເກີດມາຈາກເສັ້ນເລືອດໃນ ສະໝອງຖືກຕັນ ຫຼື ແຕກ. ໃຫ້ເບິ່ງການເປັນລົມເມື່ອຖືກແດດ ຫຼື ໂລກສາລະບາດ (ໜ້າ 81).

Sty (ຕາຕອນ) ໜັງຕາໂຄ່ແດງ ສ່ວນຫຼາຍເປັນຢູ່ທົ່ວຕາເກີດມາຈາກການຕິດເຊື້ອ.

Sucrose (ນ້ຳຕານ) ນ້ຳຕານທົ່ວໆໄປທີ່ໄດ້ຈາກນ້ຳອ້ອຍ ຫຼື ຫົວມັນຫວານ. ຮ່າງກາຍດູດຊຶມໄດ້ຍາກ ແລະ ສັບສົນກວ່າກູຍໂກ.

Sugars (ນ້ຳຕານທຳມະດາ) ນ້ຳຕານທຳມະດາທີ່ໃຊ້ກິນປະຈຳວັນເຊັ່ນ: ນ້ຳເຜິ້ງ, ນ້ຳຕານຊາຍ ຫຼື ໝາກໄມ້ສຸກທີ່ໃຫ້ພະລັງງານ.

Suppository (ຢາຍັດ) ຢາເປັນກ້ອນໃຊ້ສຳລັບຍັດເຂົ້າໄປໃນຮູທອວນ ຫຼື ຊ່ອງຄອວ.


*Suppressant (ຢາລະງັບ) ຢາທີ່ໃຊ້ລະງັບ ຫຼື ຢຸດເຊົາແນວໃນແນວໜຶ່ງເຊັ່ນ: ຢາລະງັບການໄອ.

Suspension (ຝຸ່ນປະສົມນ້ຳ) ເປັນຝຸ່ນປະສົມຢູ່ໃນນ້ຳ.

Suture (ຮອຍຫຍິບ) ຮອຍທີ່ເກີດຈາກການຫຍິບປາດແຜ.

Symptoms (ອາການ) ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ສະພາບຂອງຄົນເຈັບບອກເລົ່າກັບການເຈັບເປັນຂອງເຂົ້າສູ່ທ່ານໝັ້ງ. ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ຄຳວ່າອາການ ໝາຍຄວາມເຖິງສັນຍານນຳ.

T(ຫີ) Tablespoon (ປ່ວງແກງ) ປ່ວງສຳລັບຜອງເທົ່າກັບ 3 ປ່ວງຊາ ຫຼື 15 ມລ.



Taboo (ຂໍ້ຫ້າມ) ສິ່ງຂອງທີ່ຖືກຫ້າມເຂົ້າໄກ້ ຫຼື ຫ້າມກ່ຽວຂ້ອງອັນມີສາເຫດມາຈາກຄວາມເຊື່ອຖືມາແຕ່ດົນນານ.

Teaspoon (ບ່ວງຊາ) ບ່ວງສຳລັບຜອງເທົ່າກັບ 5 ມລ. 3 ບ່ວງຊາເທົ່າກັບ 1 ບວງແກງ.

Temperature (ອຸນຫະພູມ) ລະດັບຄວາມຮ້ອນຂອງຮ່າງກາຍຄົນ.

Tendons (ເອັນ) ເສັ້ນເອັນທີ່ຈ່ອງກ້າມຊີ້ນຕິດກັບກະດູກ.

*Thalassemia (ພະຍາດເລືອດ) ພະຍາດເລືອດທີ່ເປັນເຊື້ອສາຍຊະນິດໜຶ່ງມັນເປັນໃນບາງປະເທດເທົ່ານັ້ນ. ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 2 ປີ ຈະມີຕັບ ແລະ ປ້າງໄຫຍ.

Thermometer (ບາຫຼອດ) ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນຮ່າງກາຍຄົນ. ເຄື່ອງແທກອຸນຫະພູມ.

Tick (ໝັດ) ແມງໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງເວລາມັນກັດ ມັນຈະໝັ້ນທົວເຂົ້າໄປໃຕ້ຜິວໜັງແລ້ວດູດກິນເລືອດ.

Topical ສຳລັບຜິວໜັງ. ຢາສະເພາະ ຖືກຈັດຢູ່ໃນຢາສຳລັບພະຍາດຜິວໜັງ

Toxemia (ຄັນເປັນພິດ) ໃຫ້ເບິ່ງຄຳສັບ

Pre-eclampsia.

Toxic ທີ່ເປັນພິດ.

Traditions (ຮີດຄອງປະເພນີ) ການກະທຳ, ຄວາມເຊື່ອຖື ຫຼື ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ປະຕິບັດສືບຕໍ່ກັນມາແຕ່ດົນນານ.

Transmit (ຜ່ານ) ຜ່ານໄປ ຫຼື ຖ່າຍທອດຈາກຄົນໜຶ່ງໄປຫາຄົນອື່ນ.

Tropical (ເຂດຮ້ອນ) ເຂດທີ່ມີອາກາດຮ້ອນຂອງໂລກ.

Tumor (ເນື້ອງອກ) ກ້ອນເນື້ອ ທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນຜູ້ດູດປົກກະຕິແຕ່ທາກບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການຕິດເຊື້ອພະຍາດ. ເນື້ອງອກບາງຢ່າງສາມາດກາຍເປັນມະເຮັງ.

U (ຢູ)

Ulcer (ບາດ ແຜ) ໜັງ ຫຼື ແພຫຸ້ມເກີດຈິກຂາດ; ບາດແຜຊຳເຮື້ອທີ່ເປັນຮູເຊັ່ນ: ຢູ່ຕາມຜິວໜັງ, ຕາມໜັງຕາ, ກະເພາະອາຫານ ຫຼື ລຳໄສ້

Umbilical cord (ສາຍແທ້) ສາຍແທ້ທີ່ຕິດຕໍ່ຈາກສາຍບີຂອງແອນ້ອຍໄປຫາພິກແທທີ່ຢູ່ໃນມັດລູກ.

Umbilical hernia (ສາຍບີສວດ) ສາຍບີບັງສວດໃຫຍ່ອອກມາ. ສາເຫດມາຈາກລຳໄສ້ບາງພາກສ່ວນລອດອອກຈາກຖົງທີ່ບຸກທີ່ອະໄວຍະວະ ໃນຜັງທ້ອງ.

Umbilicus (ສາຍບີ) ເບິ່ງຄຳສັບ Navel (ສາຍບີ)

Unconsciousness (ອາການໝົດສະຕິ, ພາວະໝົດຄວາມຮູ້ສຶກ) ເບິ່ງ Loss of consciousness ໝົດສະຕິ; ສະຫຼົບ.

Under-fives program (ແຜນການລ້ຽງດູລູກນ້ອຍ) ແຜນການທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແມ່ລູກອອນທັງຫຼາຍຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງລູກນ້ອຍ, ພາລູກໄປກວດສຸຂະພາບເປັນປົກກະຕິ ແລະ ບັນທຶກການເຕີບ ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງລູກຜູ້ທີ່ມີອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 5 ປີ.

Urethra (ທໍ່ຍ່ຽວ) ທໍ່ທີ່ຕໍ່ຈາກພິກຍ່ຽວຍາວມາຈົນສຸດບ່ອນຍ່ຽວອອກ.

Urinary tract (ທາງເດີນນ້ຳຍ່ຽວ, ລະບົບຖ່າຍເທ) ແມ່

ນລະບົບຖ່າຍເທທີ່ມີບົດບາດໜ້າທີ່ຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ມີນ້ຳຍ່ຽວອອກ.

Urine (ນ້ຳຍ່ຽວ) ນ້ຳເສຍທີ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍ. ນ້ຳຍ່ຽວ.

Uterus (ມັດລູກ) ມັດລູກ ຫຼື Womb

V (ວີ)

Vaccinations (ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ) ໃຫ້ເບິ່ງຄຳວ່າ Immunization

Vagina (ຊ່ອງຄອດ) ທີ່ ຫຼື ຮູນັບຕັ້ງແຕ່ຮູຂອງອະໄວຍະວະເພດຍິງເຂົ້າໄປຫາມັດລູກ.

Vaginal (ກ່ຽວກັບຊ່ອງຄອດ) ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ພົວພັນກັບຊ່ອງຄອດ.

Varicose veins (ເສັ້ນເລືອດຂອດ) ເສັ້ນເລືອດດຳໂປ່ງພອງຢ່າງຜິດປົກກະຕິ. ເປັນຂອດກະປຸດກະປັດຢູ່ໃຕ້ຜິວໜັງສ່ວນຫຼາຍເປັນຢູ່ຂາຂອງຜູ້ເຖົ້າ, ແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ແມ່ຍິງທີ່ມີລູກຫຼາຍຄົນ.

Vaseline (ວາສະລິນ) ເບິ່ງ Petroleum jelly (ຢາບີໂຕຼລຽມເຈລີ)

Venereal disease (ກາມະໂລກ) ພະຍາດທີ່ແຜ່ລູກມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການຮ່ວມເພດ ຫຼື ປະຈຸບັນນີ້ເອີ້ນວ່າ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ (Sexual transmitted infection ຫຼື STI).

Vessels (ທໍ່, ຫຼອດ, ເສັ້ນ) ທີ່ ຫຼື ເສັ້ນເສັ້ນເລືອດແດງ ແລະ ເສັ້ນເລືອດດຳທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນການສົ່ງເລືອດໄປລ້ຽງຕາມຮ່າງກາຍ.

Virus (ເຊື້ອໄວລັສ) ເຊື້ອທີ່ນ້ອຍກວ່າເຊື້ອແບກທີ່ເລັຍທີ່ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດລະບາດ ຫຼື ພະຍາດຕິດຕໍ່ຕ່າງໆ.

Vitamins (ວິຕາມິນ) ອາຫານປະເພດເສີມຮ່າງກາຍທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ.

Vomiting (ການຮາກ) ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນກະເພາະອາຫານອອກມາທາງປາກ.

W(ດັບເບີນຍູ)

Welts (ແຜ່ນຄັນ) ແຜ່ນແດງຄັນຕາມຮ່າງກາຍ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດມາຈາກການແພ້ຝຸ່ນໃນອາກາດ ຫຼື ແພ້ລົມ.

Womb (ມັດລູກ) ຖືກຢູ່ໃນທ້ອງນ້ອຍຂອງແມ່ຍິງບ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ແອນ້ອຍເກີດຂຶ້ນ. ຄືກັບຄຳສັບ Uterus. ຖືກຢູ່ໃນມັດລູກຂອງແມ່ຍິງທີ່ເປັນບ່ອນສ້າງແອນ້ອຍໃຫ້ເກີດອອກມາ.

X (ເອັກ)

Xerosis or xerophthalmia (ໂລກຕາແຫ້ງ) ເກີດຄວາມແຫ້ງແຫ້ວຜິດປົກກະຕິຢູ່ໃນຕາທີ່ເກີດມາຈາກການຂາດວິຕາມິນເອ.

