

အစာမျက်နှာ ၆

လိပ်နှုန်းရာကူးစက်ပောင်းဖျားနှင့် ဆွဲဗားလိပ်ဆောင် ကူးစက်ပောင်းဖျား



လိပ်နှုန်းရာကူးစက်ပောင်းဖျား (ခေါ်) Sexually Transmitted Diseases (STDs) ဆိုသည်မှာလူတစ်ဦးထံမှအခြားတစ်ဦးထံသို့လိပ်ဆက်ဆံစဉ်တွင်ကူးစက်သောရောဂါများဖြစ်သည်။ မည်သည့်လိပ်ဆက်ဆံပုံမျိုးမဆို STD ဖြစ်နိုင်သည်။

တစ်ခါတစ်ရုံ STDs ပြစ်ပွားနေသောယောက်ဗျားလိပ်အကို (သို့) မိန်းမလိပ်အကိုကိုတစ်ခြားတစ်ယောက်၏လိပ်အကိုနှင့်ပွတ်မိရုံဖြင့်ရောဂါကူးစက်နိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသိုးမှုပိုမိုက်ရှင်သွေးငယ်သို့ကလေးမဓမ္မးဖွားမီ (သို့) မွေးဖွားနေချိန်တွင် STDs ကူးစက်စေနိုင်သည်။

STDs အားစော်းစွာဖျောက်ဆုံးသည်အတိမကုသပါကအောက်ပါအခြေအနေများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

- ယောက်ဗျားရောမိန်းမပါမြှုပ်နှံး။
- သားလျောသားပျက်ခြင်း၊ ကလေးအသေမွေးခြင်း။
- ရင်သွေးငယ်အား စောလွန်းစွာ မွေးဖွားခြင်း၊ သေးငယ်လွန်းခြင်း (သို့) မျက်စိကွုယ်နေခြင်း။
- မွေးကင်းစကလေးပွဲအဆုတ်ရောင်ခြင်း။
- သားပြုပြန်သန္တတည်ခြင်း။ (သားအိမ်အပြင်ဖက်သန္တတည်ခြင်း။)
- ပြင်းထန်သောကူးစက်ရောဂါ (သို့) AIDS ကြောင့်အသက်ဆုံးရုံးခြင်း။

➤ လိပ်ဆက်ဆံပောက်နှင့်ဦးစလုံးဖြစ်ပွားသော STDs အားစော်းစွာပြည့်စုံစွာကုသခြင်ဪဖြင့်ပြင်းထန်သောပြဿနာများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။

- ဝင်းပိုက်အောက်ပိုင်းနာတာရည်နာကျင်ခြင်း။
- သားအီမဲဒေါင်းကင်ဆာဖြစ်ခြင်း။

STDs များကအမျိုးသမီးများအတွက်စိုးရိမ်ဖွယ် ပြသနာများဖြစ်ခြင်း။

ယောက္ခား၊ မိန့်မမရွေး STDs ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ယောက္ခားများထံမှမိန်းမများထံသို့ကူးစက်နိုင်မှုသည် မိန်းမများထံမှယောက္ခားများထံသို့ကူးစက်နိုင်မှုထက်လွယ်ကူသည်။ အမျိုးသားများ၏ရောဂါရိုးပါရိုသည့်သုတ်ရည်သည်မိန်းမအဂါးအတွင်းကျန်ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီး၏သားများသည်မှုများအားဖြစ်နှင့် သားအီမဲတို့၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှပို၍များစေသည်။ STDs များသည်အမျိုးသမီးများ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိခြင်းကြောင့်ယောက္ခားများလောက်ရောဂါလက္ခဏာတွေ့ရှိရန်မလွယ်ကူပါ။

အဘယ်ကြောင့်အမျိုးသမီးများစွာတွင် STDs ဖြစ်နေခြင်း။

အမျိုးသမီးများသည် STD မဖြစ်အောက်ကာကွယ်ရန်ခက်ခဲ့လေ့ရှိသည်။ များသောအားဖြစ်ရင်းတို့၏အမျိုးသားအဖော်ကတောင်းဆုံးပါကလိုင်ဆက်ဆံကြရသည်။ ငါးတို့သည်ထိုအမျိုးသားမှာအခြားအမျိုးသမီးနှင့် လိုင်ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းရှုမရှိ (သို့) STD ရှုမရှိမသိနိုင်ပါ။

အမျိုးသမီးသည်မိမိ၏အဖော်အားကွန်းသုံးရန်ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတတ်ပါ။

သင်သည်အောက်ပါလက္ခဏာတစ်ခု (သို့) လက္ခဏာများရှိနေပါက STD ရှိနေနိုင်သည်။

- မွေးလမ်းကြောင်းမှုသာမန်မဟုတ်သောအရည်များဆင်းခြင်း။
- ဝင်းပိုက်အောက်ပိုင်းနာနေခြင်း။
- မိန်းမအဂါးသားနာ (သို့) အဖုအပိန့် (သို့) အနာဖြစ်ခြင်း။



STD ဖြစ်ရန်အန္တ ရာယ်ရှိနိုင်သူအမျိုးသမီးများ။

မည်သည့်လက္ခဏာမှုမပေါ်နေသော်လည်း STD ဖြစ်နိုင်ရန်အန္တ ရာယ်ရှိသူများမှာ—

- မိမိအဖော်STD ရောဂါလက္ခဏာပေါ်နေခြင်း။ ထိုသူတံ့မှရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်နေနိုင်သည်။
- မိမိအဖော်တစ်ဦးမကရှိနေခြင်း။ အဖော်များလေသူတို့ထံမှ ရောဂါလက္ခဏာရန်အခွင့်များလေဖြစ်သည်။ တစ်ယောက်မဟုတ်တစ်ယောက်ထံမှရောဂါလက္ခဏာရန်နိုင်သည်။
- မိမိအဖော်အခြားအဖော်များရှိသည်ဟုသံသယဖြစ်ခြင်း။ ဥပမာ— မိမိအဖော်သည်အိမ်နှင့်ဝေးသောနေရာတွင်နေခြင်းကြောင့် ငင်း၍ STD ကူးစက်ရန်အခွင့်များသကဲ့သို့မိမိဆိုသို့တစ်ဆင့်ပြန်၍ကူးစက်ရန်လည်းအခွင့်များလာသည်။



STD ရှိနေပါကဆောင်ရွက်ရန်

သင့်ထံ STD ရှိနေပါက (သို့) ရှိနေသည်ဟုထင်ပါက—

- ဆေးကုသူမှုစောစီးစွာခံယူပါ။
- အလွန်နာမကျန်းဖြစ်သည်အတိမစောင့်ပါနှင့်။
- သင်ဆေးကုနေချိန်တွင်အဖော်အားတစ်ချိန်တည်းပင်ဆေးကုစေပါ။
- ရောဂါလက္ခဏာများစွဲပျောက်သွားသော်လည်း ဆေးကိုကုန်ဆုံးသည်အတိသောက်ပါ။
- အန္တ ရာယ်နည်းလိုင်ဆက်ဆံမှုကိုကျင့်သုံးပါ။ မိမိကိုယ်ကိုမကာကွယ်ပါက STD နောက်တစ်မျိုး (သို့) HIV/ AIDS အချိန်မရနိုင်သည်။
- Syphilis ရောဂါဒိမရှိဆေးစစ်မှုခံယူပါ။ STD တစ်မျိုး ဖြစ်နေပါက အခြား STD တစ်မျိုးသည်လက္ခဏာမပြောဖြစ်နေတတ်သည်။ HIV ရှိမရှိဆေးစစ်ရန်စုံစုံသော်လည်းကောင်းမှသူအလိုလိုသန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ပါသည်။

မွေးလမ်းကြောင်းမှသာ့မဟုတ်သောအဖြူခွင်း

မွေးလမ်းကြောင်းမှအဖြူများအနည်းငယ်ဆင်းခြင်း၊ အနည်းငယ်စိတ်းနေခြင်းတို့သည်သာမန် ဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းဖြင့်မွေးလမ်းကြောင်းမှသူအလိုလိုသန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ပါသည်။

အဖြူဆင်းရာ၌ ပမာဏ၊ အနဲ့ (သို့) အရောင်များပြောင်းလာပါက ရောဂါကူးစက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဆင်းလာသောအဖြူကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရောဂါအမျိုးအစားကိုသိနိုင်ရန်ခက်ခဲသည်။

ဖြစ်နိုင်ပါကမည်သည့်ရောဂါကူးစက်နေကြောင်းကိုဆေးစစ်ကြည့်သင့်သည်။ အခြားရောဂါဖြစ်သောကင်ဆာရောဂါကြောင့်လည်းအဖြူဆင်းနိုင်သည်။

မှတ်သားရန်-

သုတေသနလိပ်ငွေအက်ပိုင်းနာပြီးနွေးလမ်းကြောင်းမှအဖြူများဆင်းလာပါကဆီးစို့ ဗိုးဝင်ခြင်းကြော့ဖြစ်နိုင်သည်။

သာမန်မဟုတ်သောအဖြူဆင်းခြင်း၏အကြောင်းရင်းများ

သာမန်မဟုတ်သောအဖြူများဆင်းစေသောကူးစက်ရောဂါအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အောက်ပါတွင်ရောဂါအမည်များနှင့် ဖြစ်လေ့ရှိသောရောဂါလက္ခဏာများ ဖော်ပြထားသည်။

(၁) မှုက်ခရု (အဖြူဆင်းခြင်း) (Candida, Thrush, Yeast)

အဖြူဆင်းခြင်းသည်လိုင်ဆက်ဆံရာမှုကူးစက်သောရောဂါမဟုတ်ပါ။ နောက်ဆက်တွေပြဿနာများမဖြစ်တတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ ပဋိဌာန်ဆေးများ စားချိန် (သို့) ဆီးချို့၊ သွေးချို့ (သို့) AIDS ရောဂါများရှိနေပါကအဖြူဆင်းလေ့ရှိသည်။

လက္ခဏာများ:

- နှီးမလိုင် (သို့မဟုတ်) ဖိန်ချုပ်နှင့် တူသောအဖြူရောင်အရည်၊ အခဲများ ဆင်းခြင်း။
- မွေးလမ်းကြောင်းအတွင်းနှင့်အပြင်းနှင့်ပြီးတစ်ခါတစ်ရုံသွေးထွက်ခြင်း။
- မွေးလမ်းကြောင်းအတွင်း (သို့) အပြင်ယားယံလာခြင်း။
- ဆီးသွားပါကဗူလောင်သလိုခံစားရခြင်း။
- မို့ (သို့) ပေါင်မုန်းဖုတ်ထားသောအနဲ့ရှိခြင်း။
- လိုင်ဆက်ဆံစဉ်နာကျင်ခြင်း။

(၂) Bacterial Vaginosis (မွေးလမ်းကြောင်းတွင် ဘက်တီးရိုးယားပိုးရှိနေခြင်း)

Bacterial Vaginosis သည်လိုအနေဖြင့်ရာကူးစက်ရောဂါမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေပါကကလေးစောလွန်းစွာမွေးဖားစေနိုင်သည်။

လက္ခဏာများ

- ခါတိုင်းထက်အဖြူပို့ဆင်းခြင်း။
- ငါးအနဲ့ကဲ့သို့အနဲ့ဆိုးထွက်ခြင်း (အထူးသဖြင့် လိုင်ဆက်ဆံပြီးချိန်)
- အနည်းငယ်ယားယံ့ခြင်း။

(၃) Trichomonas (ထရစ်ကိုမိုးနတ်ပိုးဝင်ခြင်း)

Trichomonas သည်အနဲ့ရာယ်များသောကူးစက်ရောဂါမဟုတ်သော်လည်းယားယံ့ခြင်းကသုတေသနမသက်မသာဖြစ်စေသည်။ အမျိုးသားများ၌ လက္ခဏာ ပေါ်လေ့မရှိသော်လည်းမိမိအိုးအကိုးအကိုးရောဂါသယ်ဆောင်နှင့်ပြီး လိုင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်အခြားသူတစ်ဦးသို့ရောဂါကူးစက်စေနိုင်သည်။

လက္ခဏာများ

- မီးခိုးရောင် (သို့) အဝါရောင်အဖြူပါသောအဖြူဆင်းခြင်း။
- ဆိုးဝါးသောအနဲ့ရှိသည့်အဖြူများဆင်းခြင်း။
- လိုင်အကိုးနှင့် မွေးလမ်းကြောင်းနဲ့ပြီးယားခြင်း။
- ချီးသွားပါကနာကျင်၊ ပူလောင်ခြင်း။

(၄) ရှိနိရောဂါ (Gonorrhea, Gono, VD နဲ့ Chlamydia) ပိုးဝင်ခြင်း

Gonorrhea နှင့် Chlamydia နှစ်မျိုးစလုံးသည် ရှိနိမွှုပ်ရောဂါများဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်စော်းစွာကုသပါကပျောက်ကင်းလွယ်ပါသည်။ မကုသပါကပြင်းထန်စွာရောဂါပိုးဝင်ပြီးယောကျော်များမှန်စီးစလုံးသွေ့ပြုခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။

အမျိုးသားများ၌ရောဂါရှိသူနှင့် လိုင်ဆက်ဆံပြီး ၂ရက်မှ ၅ရက်ကျော်လျှင်ရောဂါလက္ခဏာကိုစတင်တွေ့ရှိရသည်။ သို့ရာတွင်မည်သည့်လက္ခဏာ

➤Gonorrhea နဲ့ Chlamydiaတို့သည်ရောဂါလက္ခဏာတူသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါကနှစ်မျိုးလုံးတစ်ပြိုင်နက်ဆေးကုသုတေသနသည်။

မှမပေါ်ဘဲရောဂါရိသောအမျိုးသားများလည်းရှိတတ်သည်။

အမျိုးသီးများဖွံ့ဖြိုးရောဂါလက္ခဏာသည်သီတင်းပတ်ပေါင်းများစွာ (သို့) လပေါင်းများစွာကြောမှုပေါ်တတ်သည်။ သင့်မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာမှ မပေါ်သောလည်း Gonorrhea နှင့် Chlamydia အားအခြားသူများသို့ ကူးစက်စေနိုင်သည်။

မိန်းမများတွင်ဖြစ်တတ်သောရောဂါလက္ခဏာများ

- မွေးလမ်းကြောင်း (သို့) စအိမ် အဝါရောင် (သို့) အစိမ်းရောင်အရည် များဆင်းခြင်း။
- ဆီးသွားရာတွင်နာကျင်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ ဆီးမကြာခကာသွားခြင်း။
- အဖျားတက်ခြင်း။
- ပိုက်အောက်ပိုင်းနာခြင်း။
- လိပ်ဆက်ဆံခိုန်တွင်နာခြင်း (သို့) သွေးထွက်ခြင်း။
- မည်သည့်လက္ခဏာမှုမပေါ်ခြင်း။

ယောကျားများတွင်ဖြစ်တတ်သောရောဂါလက္ခဏာများ

- ယောကျားလိုင်အကိုမှုလောင်းကျခြင်း။
- ဆီးသွားစဉ်နာကျင်ခြင်း၊ ပူစပ်ခြင်း။
- ရေးစွေးများနာခြင်း (သို့) ရောင်ခြင်း။
- မည်သည့်လက္ခဏာမှုမပေါ်ခြင်း။

လိုင်အကိုများယားယံခြင်း

- အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လိုင်အကိုများယားယံနိုင်သည်။
- မိန်းမကိုယ် ယားယံခြင်းမှာ မှုက်ခရု (Yeast) (သို့) trichomonas ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
 - လိုင်အကိုပေါ်ရှုအမွှေးများ (သို့) လိုင်အကိုအနီးယားယံခြင်းမှာပဲနာ(သို့) သန်းများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပဲနာနှင့်သန်းများအားအရပ်သုံးဆေးများ (သို့) ဆေးဆိုင်များမှာဆေးဖြင့်ကုသနိုင်သည်။ အမွှေးရိတ်ပြီးတမာ ရွှေက်နှင့်နန်းကိုကြိတ်ပြီးတစ်ညွှေးအုပ်ထားခြင်းဖြင့်ကုသနိုင်သည်။
 - အချို့ယားနာများသည်ရေမွှေးပါသောဆပ်ပြာများ၊ အမွှေးအကြိုင်များ ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရုံမိန်းမကိုယ်အားအရွက်များ၊ ဆေး

ဖက်ဝင်အပင်များဖြင့် ဆေးကြာခြင်းကြာင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ရှိုးရိုး
ရေဖြင့်ဆေးကြည့်ခြင်းဖြင့်ပျောက်မပျောက်စမ်းကြည့်ပါ။

ကုသခြင်း

အကယ်၍သင်သည်သာမန်မဟုတ်သောအဖြူဆင်းခြင်းရှိပြီး STD မရှိ

ဟု ထင်ပါကအောက်ပါဆေးဝါးများဖြင့်ကုသနိုင်သည်။

STD ဖြစ်နိုင်ရန်စိုးရို့များသောအဖြူဆင်းခြင်းအတွက်ဆေးဝါးများ

ဤဆေးများသည် Yeast, Trichomonas နှင့် Bacterial vaginosis ကိုပျောက်ကင်းစေသည်။ ဆေးဘူး
(၁) နှင့် ဆေးဘူး (၂) မှ ဆေးတစ်မျိုးစီသုံးပါ။

ဆေးအမျိုးအစား	ဆေးပမာဏ	သုံးစွဲနည်းနည်းအကြိမ်
ဆေးဘူး (၁) (ကုစ်မျိုးရွေးသုံးပါ) Clotrimazole inserts (ထည့်ဆေး) သို့မဟုတ် Gentian Violet (ဆေးပြာလိမ်းဆေး)	၅၀၀ မီလီဂရမ် ၁%အရည်	ဆေးကိုမွေးလမ်းကြောင်းထဲသို့တစ်ရက်ထည့် ထားပါ။ သန်ရှင်းသောဂုံများဖြင့်ဆေးဆွဲတ်၍မွေးလမ်း ကြောင်းထဲသို့ ၃၉၈ ဆက်တိုက်ထည့်ပါ။ နံနက် တိုင်း ၃၄၆ ကိုဖယ်ရှားပါ။
ဆေးဘူး (၂)တွဲသုံးပါ။ metronidazole သောက်ဆေး သတိပြုရန် metronidazol သောက်နေချိန်တွင်အရက် လုံးဝမသောက်ပါနေ့။	၄၀၀ မီလီဂရမ်	တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်ကို ၇ ရက် သောက်ပါ။ (သင့် အဖော်လည်း ဤနည်းတူဆေးသောက်ရမည်။)

STD ဖြစ်ရန်စီးရိမ်စရာရှိသောအဖြူဆင်းခြင်းအတွက်ဆေးဝါးများ

(ဤဆေးသည် Gonorrhea, Chlamydiaနှင့် Trichomonasတို့အားပျောက်ကင်းစေသည်။)
 ဤဆေးများကို လက်မှတ်ရဆေးဝန်ထမ်း၏ ညွှန်ကြေားချက်အတိုင်းသောက်ပါ။

ဆေးအမည်	ဆေးပမာဏ	သုံးစွဲနည်းနှင့် အကြောင်း
Gonorrhea အတွက်		
Norfloxacin (သို့မဟုတ်) Ciprofloxacin	၈၀၀ မီလီဂရမ် ၅၀၀ မီလီဂရမ်	တစ်ကြိမ်သာ သောက်ရန် တစ်ကြိမ်သာ သောက်ရန်
ဤဆေးများကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ မိခင်နှင့်တိုက်ကျွေးချိန် (သို့မဟုတ်) အသက် ၁၆ နှစ်အောက်တွင် လုံးဝ မသောက်ရပါ။		
Chlamydiaအတွက်		
Tetracycline (သို့မဟုတ်)	၅၀၀ မီလီဂရမ်	တစ်နှုန်း ၄ကြိမ် ဂရက်သောက်ပါ။ (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နှင့် မိခင်နှင့်တိုက်ချိန်တွင် မသောက်ရပါ။)
Erythromycin (သို့မဟုတ်)	၅၀၀ မီလီဂရမ်	တစ်နှုန်း ၄ကြိမ်ဂရက်သောက်ပါ။
Amoxicillin	၅၀၀ မီလီဂရမ်	တစ်နှုန်း ၃ကြိမ် ဂရက်သောက်ပါ။

လိုင်အောက်များ၏ကြော်နှုန်း(အဖု)များရှိခြင်း။

ကြွတ်နှုန်းများသည် Human Papilloma Virus ပိုး (HPV) ကြောင့်ဖြစ်သည်။ လိုင်အောက်များ၏ကြော်နှုန်းများမသိတဲ့ရှိနေတတ်သည်။ အထူးသဖြံ့မွေးလမ်းကြောင်းအတွင်း (သို့) ယောက်ဥုံးလိုင်တံတိပ်အတွင်းဘက်တွင်ရှိနေပါကမသိနိုင်ပါ။ ငြင်းတို့သည်ကုသမ္မမရှိဘဲပျောက်ကင်းတတ်သော်လည်းအလွန်ကြာတတ်သည်။

လကွာဏာများ

- ယားခြင်း။
- မျက်နှာပြင်ကြမ်း၍သေးငယ်ပြီးနာကျင်ခြင်းမရှိသောဖြူညီရောင်အဖုများရှိခြင်း။



- အမျိုးသီးများတွင်ငါးအဖုများသည်မိန်းမကိုယ်ရှိခေါက်ရာများ၊ မွေးလမ်းကြောင်းအတွင်းနှင့် စအိုအနီးတရိုက်တွင်ပေါက်တတ်သည်။



- ယောကျိုးများတွင်လိုင်တံပါး
ဗျားစွေအိုတံပါး(သို့) စအိုအနီး

တွင်ပေါက်တတ်သည်။



အရေးကြီးသောအချက်

ကြီးချိပြားပြီးစိစွဲတော်ကာကြောက်နှင့်ဘယ်အနာသည် *Syphilis* ရောက်လက္ခဏာဖြစ်တတ်သည်။ ငင်းရောက်အတွက်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ အောက်ပါကုသမှုကိုထိရောက်အတွက်အသုံးမပြုပါနှင့်။

ကုသမှု

၁။ ကြောက်နှင့်စုစိုက်ပတ်လည်အရေပြားကိုကာကွယ်ရန်ရေနံgel (သို့) အခြားအဆီရဲတိပါသော Ointment ဆေးကိုလိမ်းပေးပါ။

၂။ သေးထိသောတွေတ်ရွောင်း (သို့) သွားကြားထိုးတံဖြိုး Trichloroacetic အက်စစ် (TCA) အနည်းယယ်ကိုကြောက်နှင့်များဖြူလာသည်အထိသတိထား၍ တို့ပေးပါ။

(သို့မဟုတ်)

Podophyllin ၂၀% ဆေးကိုင်းနည်းအတိုးကြောက်နှင့်ပိုလာသည်အထိုးပေးပါ။

Podophyllin အားထည့်ပြီးဖြန့်အကြောတွင်ဆေးကြာပစ်ရမည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တွင် Podophyllin ကိုမသုံးပါနှင့်။ ဆေးကုသမှုထိရောက်ခြင်းရှုပါက ကြောက်နှင့်များအနာဖြစ်လာလိမ့်မည်။ အနာကိုသန်ရှင်းခြောက်သွေ့စွာထားပါ။ ပျောက်ကင်းသည်အထိလိုင်ဆက်ဆံမှုမပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားပါ။ တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ်အတွင်းအနာကျက်လာလိမ့်မည်။ အနာပိုးမဝင်အောင်သတိထားပါ။ မည်သည့်နည်းကိုသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ ကြောက်နှင့်များအားလုံးပျောက်ကင်းသွားရန်ကုသမှုအကြိမ်ကြိမ်လိုအပ်သည်။ တစ်ပတ်အကြောတွင်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်၍ကုသနိုင်သည်။ ကြောက်နှင့်နေရာဟောင်းရှိအနာပေါ်တွင်အက်စစ်မထိမိအောင်သတိထားပါ။ အကယ်၍အနာရင်းနေပါကနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးမကုသမီကြာကြာစောင့်လိုက်ပါ။

➤ သင့်နှင့်လိုင်ဆက်ဆံပော်ကြောက်နှင့်များပျောက်ကင်းသွားသည်အထိလိုင်ဆက်ဆံရာတွင်အကာအကွယ်(ကွန်းများ) သုံးသင့်သည်။

➤ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ကြောက်နှင့်များလျှင်မြန်စွာကြီးလာတတ်သည်။ ကြောက်နှင့်များစွာရှိနေပါက ကလေးမွေးဖွားရာတွင်ပြဿနာရှိနိုင်သည်။ ကျွန်းမာရေးလုပ်သားနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။

အရေးကြီးသောအချက်-

လိပ်အကိုဒ် ကြွက်နှုံးများရှိခြင်းသည်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ရန်ပို၍
အခွင့်များလာစေသည်။ အကယ်၍လိပ်အကိုဒ်နှုံးများရှိခဲ့ပါက Pap smear စစ်ဆေးခြင်းကို ၁ နှစ် (၃၇၅) ၂ နှစ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။

လိပ်အကိုဒ်အနာများ (လိပ်အကိုဒ်ခွွာက်များ)


လိပ်အကိုဒ်ပေါ်အနာများဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းများ

လိပ်အကိုဒ်အနာများ၊ အနာခွွာက်များကိုလိပ်ဆက်ဆံရာမှုကူးစက်ရရှိ
သည်။ Syphilis နှင့် chancroid ကြော့ဖြစ်သောလိပ်အကိုဒ်အနာများသည်ဆင်တူ
ဖြစ်တတ်ပြီးရင်းတို့ကြောင့် AIDS ပိုးခန္ဓာကိုယ်တွင်သို့လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်
လာနိုင်သည်။

ဆစ်ဖလစ် Syphilis

➤ လိပ်အကိုဒ်အနာဖြစ်ပြီးတစ်
ခုမှုမကုသခဲ့ဘူးပါက Syphilis
ရှိမရှိသွေးစစ်ဆေးကြည့်ပါ။

လကွာဏာများ:



- ပထမဆုံးဖြစ်တတ်သောလကွာဏာများသေးငယ်
၍ နာကျင်မှုမရှိသော ဝက်ခြံဖူ (သို့) အာရည်
ကြည့်ဖူ (သို့) ပြားချိန့်သောကြွက်နှင့် တူသော
အနာဖြစ်သည်။ ထိုအနာသည်ရက်အနည်းငယ်
(သို့) သီတင်းပတ်အနည်းငယ်တွင်အလိုလိုပျောက်
သွားလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင်ထိုရောဂါသည် ခန္ဓာ
ကိုယ်အနှံ့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်သည်။
- သီတင်းပတ်ပေါင်း၊ လပေါင်းများစွာကြာသော

အခါသင်သည် -

- လည်ချောင်းနာလာခြင်း။
- အဖျားဝင်လာခြင်း။
- လက်ဖဝါးနှင့် ခြေဖဝါးများတွင်အနိဖဗုများပေါက်လာခြင်း။
- ပါးစပ်တွင်အနာပေါက်ခြင်း (သို့) အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း။

များဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။
 ဤအချိန်တွင်သင်သည်အခြားသူအားကူးစက်စေနိုင်သည်။
 ဤလက္ခဏာများအားလုံးလည်းအလိုက့်ပျောက်သွားသော်လည်း
 ရောဂါမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်။
 အေးဝါးကုသမှုမရှိပါကန့်လုံးရောဂါ၊ အကြောသောရောဂါ၊ စိတ်ရောဂါနှင့်
 အသက်ဆုံးရှုံးမှုအထိဖြစ်ပွားနိုင်သည်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် Syphilis


ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှုရင်သွေးငယ်သို့ Syphilis ရောဂါကူးစက်သွားစေ
 နိုင်ပြီးစေားစွာမွှေးဖြင့်၊ ခန္ဓာကိုယ်ချို့ယွင်းသောကလေးမွှေးခြင်းနှင့် အသေ
 မွှေးခြင်းတို့ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ မွှေးရာပါ Syphilis ရောဂါရှိသောကလေးသည်
 ကျန်းမာရေးပြဿနာများစွာရှိတတ်သည်။ အကယ်၍ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့်
 သူ့အဖော်တို့သွေးစစ်ပြီး Syphilis ပို့ရှိသည်ဟုသိရှိပါက benzathine penicillin
 2.4 သန်းယူနစ်ကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သုံးပတ်ဆက်တိုက်ဆေးထိုး၍ကုသသင့်
 သည်။

► သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေ
 ပါက Syphilis အတွက်
 သွေးစစ်ကြည့်ပါ။

ဘင်တွက်ခြင်း (Chancroid)

Chancroid ရောဂါသည်ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော STD ဖြစ်
 သည်။ စေားစွာအေးဝါးဖြင့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သည်။

လက္ခဏာများ



- နာကျင်၍ သွေးတွက်လွှယ်သော၊
 ပျော့သော အနာတစ်လုံး (သို့) တစ်လုံးမက
 လိုင်အကို (သို့) စားရှိတွင်ပေါ်ကြတတ်သည်။
- ပေါ်ခြီးတွင်နာကျင်သောအကြိုတ်များပါ
 လာတတ်သည်။
- အဖျားအနည်းငယ်ရှိတတ်သည်။

လိုင်အဂါအနာများ ကုသရန် ဆေးများ

ဤဆေးများသည် *Syphilis* နှင့် *Chancroid* နစ်မျိုးလုံးပျောက်စေသည်။
ဆေးဝန်ထမ်း၏ ဉာဏ်ကြားချက်အတိုင်းသုံးစွဲပါ။

ဆေးအမျိုးအစား	ဆေးပမာဏ	သုံးစွဲနည်းနှင့် အကြိမ်
Benzathine Penicillin နှင့် Erythromycin	၂.၄ သနီး ယူနစ် ၅၀၀ မီလီဂရမ်	အသားဆေးတစ်ကြိမ်ထိုးရန် တစ်နေ့ ၄ ကြိမ် ဂရာက်ရန်

အရေးကြီးမှတ်ချက်

- အကယ်၍ ဂုဏ်ကြားပြီးမပျောက်စေသေးပါက Erythromycin ကို ဂုဏ် ထပ်သောက်ပါ။
- အကယ်၍ သင်သည် penicillin ဆေး မတည့်ပါက erythromycin ကို သာ ၅၀၀ မီလီဂရမ် အား တစ်နေ့ သုံးကြိမ် ၁၅ ရက်သောက်ပါ။

လိုင်အဂါအနာများအားသန်ရှင်းစွာထားရမည်။ နေ့စဉ်ဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးကြားပြီးခြောက်သွေ့အောင်သေချာစွာသုတ်ရမည်။ သုတ်သည့်အဝတ်ကို မည်သူ နှင့်မျှရောမသုံးပါနေ့၌။

အရေးကြီးမှတ်ချက်

လိုင်ဆက်ဆံ့ဘာတွင် AIDS ပိုးသည်အနာများနှုတဆင့်လွယ်ကူစွာ ကူးစက်နိုင်သည်။ HIV/AIDS အားပြန်ပွားခြင်းမှကာကွယ်ရန် သင် (သို့မဟုတ်) သင့်အဖော်အနာပေါက်နေပါကလိုင်ဆက်ဆံ့ခြင်းမပြုပါနေ့၌။


လိုင်အဂါရေယှုန်

လိုင်အဂါရေယှုန်များသည်လိုင်မှုတဆင့်ကူးစက်တတ်သော Virus ပိုးကြားပြစ်သည်။ စင်းတို့သည်လိုင်အဂါနှင့်ပါးစပ်တွေ့ပြစ်တတ်သည်။ လပေါင်းများစွာ(သို့) နှစ်ပေါင်းများစွာအနာများဖြစ်လိုက်ပျောက်လိုက်ရှိတတ်သည်။ ရေယှုန်အပျောက်ကုသရန်ဆေးမရှိသော်လည်းသက်သာရန်ကုသမှုပေးနိုင်သည်။

ပါးစပ်နှင့်ဖြစ်သောရေယှုန်အားလုံးသည်လိုင်ဆက်ဆံ့မှုကြားမှု မဟုတ်ပါ။ ကလေးထောက်များနှင့် လူကြီးများ အအေးမိလှုပ် (သို့) အများရှိလှုပ် ပါးစပ်များနှင့်ရေယှုန်ပေါက်နိုင်သည်။

➤AIDSရှိသူများသည် တစ်ကိုယ်လုံးရေယှုန်ပေါက်နိုင်ပြီး ပျောက်ကင်းရန်လည်း ကြာတတ်သည်။

လက္ခဏာများ



- လိုင်အကို(သို့) ပေါင်ပေါ်နှုန်းရေပြားဆွဲကျင်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း(သို့) နာကျင်ခြင်း။
- လိုင်အကိုနှုန်းသေးငယ်သောအရည်ကြည်ဖြူးအနာပေါက်ခြင်း။
- ရေယုန်ပထမဗျားဆုံးအကြိမ်ပေါက်ပါက ၃ ပတ် (သို့) ထို့ထက်ပိုကြာတတ်သည်။ အားလုံး တက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲခြင်း ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ပေါင်တွင်းရှုံးအကြိတ်များရောင်လာခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သည်။
- နောက်တစ်ကြိမ်ပေါက်သောရေယုန်မှာမပြင်းထန်လှပါ။

ကုသူမှူ

နေထိုင်ရသက်သာစေရန်အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။

- နာသည်ဟုခံစားရလျှင်ရခြင်းအနာပေါ်သို့ရော့အုပ်ပါ။
- အဝတ်အားလက်ဘက်ပြောက်ထည့်ထားသော အရည်ထဲစိမ်းအနာပေါ်အုပ်ပေးပါ။
- သန်းရှင်းသောရေအေးထည့်ထားသည့်အတွက်ထိုင်ပါ။
- ရေကို ဆိုဒီမှုန်(သို့) ကော်မှန်နှင့်ရောနယ်ပြီးအနာပေါ်အုပ်ပါ။
- အကယ်၍အနာလက္ခဏာများတစ်ကြိမ်ပြီးတစ်ကြိမ်ပြန်ပေါ်နေပါက Acyclovir ဆေးကိုသုံးကြည်ပါ။ ဤဆေးသည်ရေယုန်အားမပောက်ကင်းစေနိုင်သော်လည်းအနာသက်သာစေပြီးရောဂါလက္ခဏာများအားလျှပ်မြန်စွာပောက်ကင်းစေနိုင်သည်။



အရေးကြီးသောမှတ်ချက်

- အနာကိုပြီးပါကလက်ကိုဆပ်ပြားဖြင့်သေချာစွာဆေးကြောပါ။
- သင့်မျက်စိန်းသင့်ကလေး၏မျက်စိတို့ကိုလက်နှင့်မထိပါနော်။ မျက်စိတွင်ပေါက်သောရေယုန်သည်အလွန်စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။
- ရေယုန်ပေါက်နေစဉ်လိုင်မဆက်ဆပါနော်။ ရေယုန်ကိုသင့်အဖော်အားလွယ်ကူစွာကူးစက်စေနိုင်သည်။



ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ရေယှဉ်ပေါက်ခြင်း

ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ရေယှဉ်ပေါက်ပြီးများစဉ်အနာဂတ်နေသော အမျိုးသမီးများသည်ရောဂါအားကလေးထံသို့ကူးစက်စေနိုင်သည်။ ကလေးအတွက် အလွန်ပင်အန္တရာယ်ရှုံးစေနိုင်သည်။ ဆေးရှုံးသာကလေးမွေးရန်ကြိုးစားပါ။ ကလေးအားခွဲမွေးပေးခြင်း (သို့) မွေးဖွားလာပြီးပါကအတူးဆေးများပေးနိုင် လိမ့်မည်။

AIDS (ခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါ)

AIDS ဆိုသည်မှာ HIV Virus ကြော်ဖြစ်သောလိုင်မှုဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါဖြစ်သည်။ HIV ရောဂါပိုးရှုံးသူ၏သွေး၊ မိန်းမကိုယ်မှုအရည် (သို့) ယောကျိုးသုတေရည်များမှအခြားသုတစ်စီးသို့ကူးစက်သွားနိုင်သည်။

လိုင်ဆက်ဆံစဉ်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက် HIV ပို့ရရှိရန်လွယ်ကူသည်။

လုံးဝကျွန်းမာသည်ဟုထင်ရသောသုတစ်စီးထံမှ HIV ပို့ရရှိနိုင်သည်။

HIV အတွက်ကုသရန်ဆေးမရှိပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါက HIV/AIDS ရှိနိုင်သည် ဟုထင်ရသောသုနှစ်လိုင်ဆက်ဆံမှုမပြုလုပ်ပါနေ့။ မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန် latex လိုင်စွဲ (ကွန်စုံး) ကိုထိုင်ဆက်ဆံတိုင်းအသုံးပြုပါ။

B ပို့အသည်းရောင်အသားဝါခြင်း

B ပို့အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါသည်အသည်းအားထိခိုက်စေသောအလွန်အန္တရာယ်များသည်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်သည်။ B ပို့ Virus ရှိသူ၏သွေး၊ တံတွေး၊ မိန်းမကိုယ်မှုအရည် (သို့) ယောကျိုးသုတေရည်မှအခြားသူ တစ်စီးထံရောဂါကူးစက်သွားနိုင်သည်။ တစ်စီးမှ တစ်စီးသို့လွယ်ကူစွာ (အတူးသာဖြော်လိုင်ဆက်ဆံစွဲ) ကူးစက်နိုင်သည်။



လက္ခဏာများ

- အဖျားရှိခြင်း။
- ခံတွင်းပျက်ခြင်း။ပို့အန်ခြင်း။
- မောပန်းရှိအားနည်းခြင်း။

➤ လိုင်မှုဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများရှိနေပါက AIDS ရောဂါရရှိနိုင်ရန်ပို့လွယ်ကူသည်။ HIV ပို့သည်အနာများနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မှုတွက်သွားရောဂါသည်။

➤ အကယ်၍သင်၏အဖော်သည်အထက်ပါလက္ခဏာအချို့ရှိခဲ့ပါကလုံးဝပေါ်က်ကင်းသည်အထိသွားနှင့် လိုင်မှုဆက်ဆံပါနေ့။ B ပို့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှင့်ရန်ကျွန်းမာရေးလုပ်သားထံမေးမြန်းပါ။

- မျက်စိနှင့် (သို့) အသားရောင်ပါလာခြင်း။
- ဝမ်းပိုက်နာခြင်း။
- ဆီးအရောင်ရှုံးပြီးဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း။
- မည်သည့်လက္ခဏာမှုမရှိခြင်း။

ကုသမူ

ကုသရန်ဒေးမရှိပါ။ ဆေးသောက်ပါကအသည်းအားပို၍ထိနိုက်လိမ့်မည်။ လူအများစုသည် B ပိုးအသည်းရောင်အသားပါရောဂါမျပ်နှံကောင်းလာနိုင်ကြသည်။ လူအနည်းစုတွင်နာတာရည်အသည်းရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အနားယူနိုင်သမျှအနားယူပြီးအစာကြလွယ်သောအစာများကိုစားသုံးပါ။

အနည်းဆုံး ၆ လခန့်အရက်မသောက်ပါနှင့်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် အသည်းရောင်အသားပါရောဂါ

အကယ်၍ကိုယ်ဝန်ရှုံးနှင့်အတက်ပါလက္ခဏာများရှိပါကကျိုးမာရေးလုပ်သားနှင့်တွေ့ဆုံးပါ။ သင်၏ရင်သွေးအားရောဂါမကူးစက်စေရန်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်သည်။


STDs များ၏ဆိုးကျိုးများ (ဆင့်ပွားရောဂါများ)

(၁) ဆီးခုံရောင်ခြင်းရောဂါ (Pelvic Inflammatory Disease PID)

ဆီးခုံရောင်ခြင်းရောဂါ (PID) ဆိုးသည်မှာအမျိုးသမီးမျိုးအတိုက်အောက်ပိုင်းရှိမျိုးဆက်ပွားအားလုံးမျိုးဝင်ခြင်းကိုခေါ်သည်။ ဆီးခုံးဝင်ခြင်းဟုခေါ်လေ့ရှိသည်။ PID သည် အထူးသဖြင့် Gonorrhea (သို့) Chlamydia စသော STD များပောက်ကင်းသွားခြင်းမျိုးသောအခါဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ကလေးဧည့်ခြေခြင်း (သို့) သားပျက်ခြင်း (သို့) သားဖျက်ခြင်း၏အနာက်ဆက်တွဲလည်းဖြစ်နိုင်သည်။

PID ဖြစ်စေသော်လည်မျှလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်သားအိမ်ခေါင်းထို့နောက်သားအိမ်၊ သားဉာဏ်များနှင့်သားဉာဏ်များသို့တဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်၍ကူးစက်နိုင်သည်။

အကယ်၍အချိန်ပီမက္ခဏာပါကနာတာရည်နာခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာနာမကျိုးဖြစ်ခြင်း (သို့) အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းအထိဖြစ်နိုင်သည်။ ပြန်များ၌ရောဂါပိုး



PID ရောဂါကာကွယ်ရန်
STD များအားသေချာစွာ
ကပါ။

- ဆေးအားလုံးသောက်ပါ။
- အဖော်အားလည်းဆေးကုသမှုခံယူစေပါ။
- သင့်နှင့်သင်၏အဖော်ကဆေးကုသပြီး ရောဂါလကွကာများလုံးဝမရှိတော့သည် အထိလိုင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုပါနော်။



ဝင်ပါကအကိုရာများဖြစ်ကျန်ခြားမြဲခြင်း (သို့) သားအိမ်အပြင်ဘက်၌သန္တတည်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

လက္ခဏာများ:

(အောက်ပါတို့အနက်တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်မကဖြစ်တတ်သည်)

- ပိုက်အောက်ဘက်နာခြင်း။
- အဖျားကြီးခြင်း။
- နေမကောင်းဖြစ်ပြီးအလွန်အားနည်းခြင်း။
- မိန့်မကိုယ်မှုအထိမိုး(သို့) အဝါရောင်အနံ့ဆိုးသောအရည်များဆင်းခြင်း။
- လိုင်ဆက်ဆံတို့နာခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း။



ကုသမှု

အောက်ပါဆေးတို့ကိုချက်ခြင်းသောက်ပါ။ အကယ်၍အောက်ပါလက္ခဏာတစ်ခုခြားဖြစ်ခဲ့ပါက-

- ဆေးသောက်ပြီး ၂ ရက် ၂ ည (၄ရနာရီ) နေသော်လည်းမသက်သာလျှင်
- အလွန်နေမကောင်းဖြစ်ပြီး အဖျားကြီးလျှင် (သို့) အော့အန်လျှင်
- လောလောလတ်လတ်ကိုယ်ဝန်ပျက်ထားလျှင် (သို့) မီးဖွားထားလျှင်ကျန်းမာရေးဌာန (သို့) ဆေးရုံသို့ချက်ခြင်းသွားပါ။ ပိုမိုထိရောက်သောအကြောဆေးများလိုအပ်လိမ့်မည်။

ဆီးခုံရောင်ခြင်းရောဂါ PID အတွက်ဆေးများ:

(ဤရောဂါသည်များသောအားဖြစ်ပိုးမျိုးစုံကြော့ရုံဖြစ်တတ်သောကြောင့်
 ရောဂါပျောက်ကင်းရန် ဆေး ၃ မျိုးကို သုံးရမည်။)

ဆေးအမျိုးအစား:	ဆေးပမာဏ	သုံးစွဲနည်းနှင့် အကြိမ်
norfloxacin နှင့်	၈၀၀ မီလီဂရမ်	တစ်ကြိမ်သာသောက်ရန်။ (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်၊ မိခင်နှင့်တိုက်စဉ်နှင့် အသက်ဗြှုံးဖြန့်အောက်တွင်မသောက်ရ။)
doxycycline နှင့်	၁၀၀ မီလီဂရမ်	တစ်နေ့ ၂ကြိမ် ၁ဝရက်သောက်ရန်။ (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်၊ မိခင်နှင့်တိုက်စဉ်မသောက်ရ။)
metronidazole	၄၀၀ မီလီဂရမ်	တစ်နေ့ ၃ ကြိမ် ၇ရက်သောက်ရန်။


(၂) မိန်းမကိုယ်ရောင်ခြင်း (Bartholin အကျိတ်ပိုးဝင်ခြင်း)

မိန်းမကိုယ်တွင် Bartholin အကျိတ်ဟုခေါ်သောသေးယ်သောအရေးပြားအောက်အိတ် အိတ်ရှိသည်။ င်းတို့သည်မိန်းမကိုယ်စိန်အောင်အရည်ထုတ်ပေးသည်။ တစ်ခါတစ်ရုပိုးဝင်သွားသဖြင့်အကျိတ်တစ်ဖက် (သို့) ၂ ဖက်စလုံးရောင်လာနိုင်သည်။

➤ STDs များအားစောစီးစွာကုံးများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ PID အပြင် STD များသည်အောက်ပါပြဿနာများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။

လက္ခဏာများ

- မိန်းမကိုယ်တွင်များသောအားဖြင့် တစ်ဖက်တည်းရောင်ခြင်း။
- မူခြင်း၊ နာခြင်း၊ အရောင်ပို့ရင့်လာခြင်း။
- တစ်ခါတစ်ရုရောင်နေသော်လည်းနာကျင်မှုမရှိခြင်း။



STD ကြောင့်အမြဲဖြစ်သော်လည်းများသောအားဖြင့် gonorrhea (သို့) chlamydia ဖြစ်လျှင်အကျိတ်ရောင်တတ်သည်။



ကုသူမှူ

၁။ သန့်ရှင်းသောရေစွေးပူပူထဲတွင်အဝတ်စကိုနှစ်ချိုင်းအားရောင်သောနေရာပေါ်တွင်အုပ်ပါ။ အပူမလောင်ပါစေနှင့်၊ ရောင်နေသောအနာပေါက်သွားပြီး

ပြည်ထွက်လာသည်အထိ (သို့) အရောင်ကျသည်အထိပြုလုပ်ပါ။

၂။ သင်နှင့်သင်၏ အဖော်နှစ်ဦးလုံး gonorrhea နှင့် chlamydia အတွက် ဆေးကုရမည်။

၃။ အကယ်၍ဆက်နာနေပြီးရောင်နေပါကကျမ်းကျင်သောကျန်းမာရေးလုပ်သားအားပြုသပါ။ အနာခွဲပြီးပြည်ထုတ်ပစ်ရန်လိုလိမ့်မည်။

(၃) မွေးကင်းစကလေးများ၌ဖြစ်သောပြဿနာများ

Gonorrhea (သို့) chlamydia ရှိသောအမျိုးသမီးများသည်ကလေးစွေးဖွားစဉ်မိမိတို့၏ရင်သွေးငယ်များအားရောဂါကူးစက်စေနိုင်သည်။

- Gonorrhea ကူးစက်၍မွေးကင်းစကလေးများအားအဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည်။
- Chlamydia သည်လည်းမွေးကင်းစကလေးများအားအဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သည်။



နေထိုင်ရသက်သာရန်ပြုလုပ်ခြင်း

STD ပျောက်ကင်းရန်သင်သည်ယဉ်ကြားထားသည့်ဆေးများကိုသုံးစွဲရမည်။
နေထိုင်ရသက်သာရန်အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။

- ၁။ သန့်ရှင်း၍ရေနွေးထည့်ထားသည့်လော်ထဲ
တွင် ဘု မိနစ်မျှ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်ထိုင်ပေးပါ။
သက်သာသည်အထိပြုလုပ်ပါ။ အကယ်၍
မှုက်ဆရိတ်ပါကသုံးများရည် (သို့) ရှာလကာ
ရည် (သို့) ဒီနချဉ် (သို့) နိချဉ်ကိုထိုင်လုံ
ထဲသုံးထပ်၍ထည့်နိုင်သည်။



- ၂။ မသက်သာမချင်းလိုင်ဆက်ဆံမှုကိုရှောင်ပါ။



- ၃။ ချဉ်ထည်အောက်ခံအဝတ်များကိုဝတ်ပါ။ ငါး
တို့သည်လိုင်အကိုပ်ဝန်းကျင်းမြှုပ်လေရရှိစေ၍
အနာကျက်စေနိုင်သည်။

- ၄။ အောက်ခံအဝတ်များကို တစ်နေ့တစ်ခါလျှော်၍
ပိုးသေစေရန်နေ့ပူထွေ်အမြှောက်ခံပါ။

- ၅။ လိုင်အကိုအနာများရှိနေပြီးဆီးသွားစဉ်နာကျင်ပါကလိုင်အကိုပေါ်သုံး
သန့်ရှင်းသောရေလောင်းရင်းဆီးသွားပါ (သို့) ရေအေးထည့်ထားသော
ဇူးထဲတွင်ထိုင်၍ဆီးသွားပါ။

- ၆။ အနာပျောက်ဆေးကိုအသုံးပြုပါ။

ဆေးမတိုးတော့ခြင်းနှင့် STD ဆေးများ

STD နှင့် အခြားရောဂါများအတွက်ပဋိဌာန်ဆေးများအသုံးပြုရာတွင်
ဆေးအားလုံးကိုသောက်သုံးရန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ထိရောက်သော
ဆေးကိုလုံးလောက်စွာမသောက်သုံးပါက (သို့) ဆေးညွှန်းမကုန်မြှုပ်ဆေးရပ်
လိုက်ပါကရောဂါပိုးများကိုအကုန်အစင်မသတ်နိုင်ပါ။ စွမ်းအားကြီးသုံးများ

ရှင်သနပြီးများများလာကာထိပိုးကိုသတ်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့သောဆေးမှာထိုရောဂါကို
ကုသနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါ။ ဤသည်ကို **ဆေးမတိုးတော့ခြင်း** ဟုခေါ်သည်။

နေရာများစွာတွင် Gonorrhea ကုရန် သုံးမြေဆေးများသည်ဆေးမတိုး
တော့ပါ။ သင်နေထိုးရောက်သွင်ဆေးမတိုးတော့သည် STDs များအကြောင်း
နှင့် ရောဂါ ကုသရန် အသတ္တုံးရနိုင်သောအကောင်းဆုံးဆေးများအကြောင်းကို
ကျန်းမာရေးလုပ်သားနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။

STD ကုသမှုခံယူစဉ်တွင်သတိထားရမည့်အရာများ

- သင့်အဖော်လည်းဆေးကုသမှုကိုတဗြိုင်နှင့်ယုံးပါ။
- ဆေးအားလုံးကိုသောက်ပါ။
- ရောဂါလက္ခဏာများပောက်သည်အထိသင့်နှင့် သင့်အဖော် ဆေးအား
လုံးကုန်အောင်သုံးစွဲပြီးသည်အထိလိုင်မဆက်ဆံပါနော်။
- ဆေးအားလုံးသောက်ပြီးချိန်းရောဂါမသက်သာပါကကျန်းမာရေး
လုပ်သားနှင့်တွေ့ပါ။
- လိုင်ပြန်လည်ဆက်ဆံသည့်အပါအွန် ရာယ်နည်းလိုင်ဆက်ဆံမှုကို
ကျင့်သုံးပါ။



ပြောင်းလဲမှုအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(က) STDs များကိုကာကွယ်ခြင်း



- အန္တရာယ်နည်းလိုင်ဆက်ဆံမှုကိုကျင့်သုံးပါ။
- လိုင်ဆက်ဆံတိုင်းကွန်းကိုအသုံးပြုပါ။
- အကယ်၍သင့်အဖော်မှုကွန်းအသုံးမပြုပါက
သုတေသနိုးသတ်ဆေးတစ်ခုတည်း (သို့) အမျိုးသမီး
Diaphragm နှင့်တွဲပြီးအသုံးပြုပါ။ ရင်းသည်မိမိ
အား Gonorrhea နှင့် chlamydia မှုကာကွယ်မှု
အသင့်အတင့်ပေးနိုင်သည်။

- လိုင်ဆက်ဆံပြီးတိုင်းလိုင်အကိုအပြင်ဘက်ကိုဆေးကြောပါ။
- လိုင်ဆက်ဆံပြီးတိုင်းဆီးသွားပါ။

ကွန်းသုံးပါ။


- HIV/ AIDS အပါအဝင်
ကာလသားရောဂါများမှ
ကာကွယ်ပေးသည်။
- သင်၏အဖော်၏ကျန်းမာ
ရေးကိုကာကွယ်ပေးသည်။
- မလိုလားသောကိုယ်ဝန်
ကိုတားဆီးပေးသည်။ သင်
(သို့)သင်၏အဖော်၏ကာလ
သားရောဂါလက္ခဏာ၍ပါက
လိုင်မဆက်ဆံပါနော်။

- ကိုယ်တွင်းပိုက်သွင်းဆေးခြင်း၊ ပရဆေးများ(သို့) အမှန်များဖြင့် ဆေးခြင်းဖြင့်မွေးလမ်းကြောင်းခြောက်သွေ့အောင်မလုပ်ပါနေ့။ မွေးလမ်းကြောင်း ခြောက်နေပါကလိုင်ဆက်ဆံခိုန်တွင်ပွန်းလွယ်ပြီး AIDS နှင့် အခြား STDs ပိုးများ ပို၍ကူးစက်နိုင်လိမ့်မည်။

(ခ) အသိင်းအစိုင်း၌အန္တရာယ်နည်းလိုင်ဆက်ဆံမှု အတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း

လိုင်မှုဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများသည်လူမှုအသိင်းအစိုင်းတစ်ခုလုံး အတွက်ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်သည်။ သို့အသိင်းအစိုင်းတွင် STDs မှက ကွယ်နိုင်ရန်-

- STDs ကြောင့်မှုများ မိမိ မိသားစုအန္တရာယ်များကိုအမျိုးသားရော အမျိုးသီးများအားသင်ကြားပေးပါ။
- အမျိုးသားများကွန်းအသုံးပြုကြရန်အခြားသူများနှင့် တိုင်ပင်ဆောင် ရွက်နည်းလမ်းရှာပါ။
- သို့အသိင်းအစိုင်းတွင်ကွန်းပြုရှိနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ပါ။ ပုပ်ရွှာဆိုင်များ၊ ကျန်းမာရေးလုပ်သားများနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနများမှအဆဲ့(သို့) ဖျော်သာသောကွန်းများပြုရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပါ။
- အခြားအမျိုးသားများအားကွန်းအသုံးပြုတတ်ဆောင်သင်ပေးနိုင်ရန် အမျိုးသားများကိုသင်တန်းပေးပါ။
- STDs၊ HIV နှင့် AIDS အပါအဝင်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ အကြောင်းပြောဆိုရန်ရှုံးစွဲအစဉ်ဖွဲ့စည်းပြုပေးပါ။
- သေသံကျောင်းများတွင်လိုင်မှုဆိုင်ရာပညာပေးခြင်းကိုအထောက် အကူပေးပါ။ STDs၊ HIV နှင့် AIDS အကြောင်းကိုကလေးများ အားသင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် စုံစုံလိုင်စုံပေးပါ။ အောင်ဆိုင်စုံစုံလိုင်စုံပေးခြင်းဖြင့် စုံစုံလိုင်စုံပေးပါ။ အန္တရာယ်နည်းသောလမ်းများကိုရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းမြတ်စွာ နားလည်အောင်ရှင်းပြပါ။
- မိမိတို့သူငယ်ချင်းများအား HIV နှင့် AIDS အပါအဝင် STDs များ အကြောင်းသင်ကြားပေးရန်ဆယ်ကျော်သက်များကိုအားပေးပါ။



➤ ကွန်းအကြောင်းရှင်းပြ ပြီးငါက်ပျောသီးကိုနမူနာ အဖြစ်သုံးကာကွန်းအုံးသုံး စွဲနည်းကိုလေ့ကျင့်ပေးပါ။



(က) ကျန်းမာရေးလုပ်သားများအတွက်အမှာစာ

- မိမိအသိင်းအတိုင်းတွင်အထိရောက်ဆုံး STD ကုသဆေးများကိုသိရှိရန် ရပ်စွဲကျန်းမာရေးဌာန (သို့) ဆေးရုံတွင်စုစုမြတ်ပါ။
- STD ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံးစကားပြောပါ။ ငါးပါးတို့အား STD ကို မည်သို့ ကုသရမည်၊ တစ်ခြားသူတံ့သို့မကူးစက်စေရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်။ STD နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုအသိပညာ ပေးပါ။ ငါးပါးတို့အဖော်လည်းကုသမှုခံယူနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးပါ။
- သားဆက်ခြား စီးအိန္ဒိုးများတွင် STDs, HIV နှင့် AIDS ကာကွယ်ခြင်း အကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းပညာပေးပါ။
- STD အတွက်အကျေအညီတောင်းခံသောသူများကိုကဲ့ခြင်း၊ အပြစ်တင်ခြင်းမပြုပါနေ့။
- STD (သို့) အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာရှိသူများ၏ကိစ္စကိလျို့ဝှက်စွာ ထားရှုပါ။ ဤပြဿနာများအကြောင်းကိုအခြားသူများနှင့် ဘယ်တော့မှ မဆွေးနွေးပြောဆိုပါနေ့။

