



အခန်း ၁၃ ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းနာကျင်ခြင်း



မျိုးပွားအင်္ဂါများသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းတွင် အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်အတူရှိပါသည်။



➤ နာကျင်ခြင်းသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ဘဝတွင်ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သင့်ပါ။ တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်နေပြီဟူသောလက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သင်မတ်တပ်မရပ်နိုင်၊ လမ်းမလျှောက်နိုင် (သို့) စကားမပြောနိုင်အောင်ဖြစ်သည်အထိမဆိုးရွားခင်စောင့်ရှောက်မှုကိုခံယူပါ။

အမျိုးသမီးအများစုသည်ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းတွင်တခါတရံနာကျင်လေ့ရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့နာကျင်ခြင်းမှာပုံမှန်ဖြစ်၍အောင်မြင်သောအခါသည်ဟု သင်ကြားခြင်းခံရတတ်သည်။ လူတစ်ချို့ကမတ်တပ်ရပ်၊ လမ်းလျှောက်၊ စကားပြောနိုင်သလိုနာကျင်မှုမှာမဆိုးရွားဟုထင်မြင်တတ်ပါသည်။ သို့သော်အမျိုးသမီး

တစ်ဦးသည်ထိုနာကျင်မှုအတွက်ကုသမှုကိုမခံယူဘဲစောင့်ဆိုင်းနေလျှင် နောက်ဆက်တွဲရလဒ်အဖြစ်ရောဂါပိုးဝင်းခြင်း၊ မြုံခြင်း (ကလေးမရနိုင်ခြင်း)၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းနှင့် အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဤအခန်းတွင်ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း (ချက်အောက်ပိုင်း) နာကျင်မှုပုံစံများနှင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ အချို့သောနာကျင်မှုများသည်ချက်အောက်သို့ ပြန့်နှံ့နိုင်ပြီး အခြားသောအကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အချို့ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းပြဿနာများသည်ကျောအောက်ပိုင်းကိုလည်းနာကျင်စေပါသည်။

ဝမ်းဗိုက်တွင်ရုတ်တရက်အပြင်းအထန်နာကျင်ခြင်း။

အချို့ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းနာကျင်ခြင်းသည်အရေးပေါ်ကိစ္စဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအန္တရာယ်ရှိသောလက္ခဏာများရှိလျှင်အနီးဆုံးဆေးရုံသို့သွားပါ။




အန္တရာယ်ရှိသောလက္ခဏာများ

- ဝမ်းဗိုက်တွင် ရုတ်တရက်အပြင်းအထန်နာကျင်ခြင်း
- အဖျားကြီးခြင်း
- ပျို့ခြင်းနှင့် အော့အန်ခြင်း
- ဝမ်းဗိုက်ဖေါယောင်ပြီး သစ်သားတုံးကဲ့သို့ မာလာခြင်း
- ဝမ်းဗိုက်တွင်းမှ အသံမကြားရခြင်း




ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းနာကျင်မှုအမျိုးအစားများ

ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းနာကျင်မှုမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဝမ်းဗိုက်ထဲတွင်အင်္ဂါများစွာရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းကိုသိရှိရန်ခဲယဉ်းနိုင်သည်။

နာကျင်မှုအမျိုးအစား	ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအကြောင်းရင်း	ဆောင်ရွက်ရန်
လစဉ်ရာသီသွေးပေါ်ချိန်တွင် (သို့) လကျော်ပြီးနောက်ရုတ်တရက်အပြင်းအထန်နာကျင်ခြင်း	သားဥပြွန်ထဲတွင်သန္ဓေတည်ခြင်း 	<ul style="list-style-type: none"> • အရေးပေါ်အခြေအနေ။ • ချက်ချင်းဆေးရုံသို့သွားပါ။
လစဉ်သွေးပေါ်ချိန်တွင် တောက်လျှောက်နာခြင်း။	သားအိမ်အတွင်းအလုံးရှိခြင်း။ 	<ul style="list-style-type: none"> • ရာသီသွေးပေါ်ချိန်တွင်နာကျင်ခြင်းအကြောင်းဖတ်ပါ။ • အနာပျောက်ဆေးသောက်သုံးပါ။
လစဉ်သွေးပေါ်ချိန်တွင်ဆွဲဆုပ်ထားသလိုနာကျင်ခြင်း (ကြွက်တက်ခြင်း)	<ul style="list-style-type: none"> • သားအိမ်ပုံမှန်ညစ်ခြင်း။ • အချို့သားအိမ်တွင်းထည့်သန္ဓေတားပစ္စည်း (IUD) ကြောင့်ပိုမိုနာကျင်ခြင်း။ 	ရာသီသွေးပေါ်ချိန်တွင်နာကျင်ခြင်းအကြောင်းဖတ်ပါ။
ရာသီသွေးနောက်ကျပြီးနာကျင်ခြင်း။	ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း။ 	နာကျင်မှုပြင်းထန်လာလျှင် ဆေးရုံသို့သွားပါ။



သားဖွားပြီးစ၊ သားပျက်သားလျှော့ပြီးနောက်နာကျင်ခြင်း။	<ul style="list-style-type: none"> • သားအိမ်ထဲတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သော အချင်းအစအနများသို့ပိုးဝင်ခြင်း။ (သို့) • သားဖွားစဉ် (သို့) သားလျှော့သားပျက်စဉ်သားအိမ်ထဲသို့ပိုးဝင်ခြင်း။ 	သားအိမ်ထဲပိုးဝင်ခြင်းနှင့် သားလျှော့သားပျက်ပြီးပိုးဝင်ခြင်းအကြောင်းဖတ်ပါ။
---	--	---

နာကျင်မှုအမျိုးအစား	ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအကြောင်းရင်း	ဆောင်ရွက်ရန်
<p>ဖျားပြီးနာကျင်ခြင်း (ပိုးဝင်ခြင်း)</p> <ul style="list-style-type: none"> • လိင်မှုဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်စဉ် (သို့) ဖြစ်ပြီးချိန်။ ဆီးခုံတွင်းပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်စဉ် (သို့) ဖြစ်ပြီးချိန်။ • ဖျား၊ ပျို့အန်၊ အစားအသောက်ပျက်ပြီးဝမ်းဗိုက်တခြမ်းတွင်နာကျင်ခြင်း။ 	 <ul style="list-style-type: none"> • ဆီးခုံတွင်းနောက်ထပ်ပိုးဝင်ခြင်း (သို့) ဝမ်းဗိုက်တွင်းပြည်တည်ခြင်း။ • အူအတက်ရောင်ခြင်း (သို့) အူအတွင်းပိုးဝင်ခြင်း။ • ကျောက်ကပ်ပိုးဝင်ခြင်း။ 	<ul style="list-style-type: none"> • အရေးပေါ်အခြေအနေ။ • ဆေးရုံသို့ချက်ချင်းသွားပါ။ • အရေးပေါ်အခြေအနေ။ • ဆေးရုံသို့ချက်ချင်းသွားပါ။ • ဆီးအိမ်နှင့်ကျောက်ကပ်ပိုးဝင်ခြင်းအကြောင်းဖတ်ပါ။

ဝမ်းလျှော့ပြီးနာကျင်ခြင်း။	ဘက်တီးရီးယားပိုး (သို့) ကပ်ပါးပိုး အူလမ်းကြောင်းထဲဝင်ခြင်း။	ဝမ်းလျှော့ခြင်းအကြောင်းဖတ်ပါ။
-----------------------------------	---	-------------------------------

<p>သွေးပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက် ဖြစ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ပထမ (၃) လအတွင်းအပြင်းအထန်နာကျင်ခြင်း။</p>	<p>သားဥပြွန်အတွင်းသန္ဓေတည်ခြင်း</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • အရေးပေါ်အခြေအနေ။ • ချက်ချင်းဆေးရုံသို့သွားပါ။
<p>ကိုယ်ဝန်နောက်ဆုံး ၃ လအတွင်းအပြင်းအထန်နာကျင်ခြင်း။ (သွေးဆင်းခြင်းရှိနိုင်၊ မရှိနိုင်)</p>	<p>သားအိမ်နံရံမှအချင်းကွာကျခြင်း။</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • အရေးပေါ်အခြေအနေ။ • ချက်ချင်းဆေးရုံသို့သွားပါ။
<p>ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တခါတရံ အနည်းငယ်နာကျင်ခြင်း။</p>	<p>ပုံမှန်ဖြစ်နိုင်သည်။</p>	<p>ကုသမှုမလိုအပ်ပါ။</p>

နာကျင်မှုအမျိုးအစား	ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအကြောင်းရင်း	ဆောင်ရွက်ရန်
<ul style="list-style-type: none"> ဆီးမကြာခဏသွားပြီးနာကျင်ခြင်း။ ဆီးထဲတွင်သွေးပါပြီးနာကျင်ခြင်း။ 	<ul style="list-style-type: none"> ဆီးအိမ် (သို့) ကျောက်ကပ်ထဲပိုးဝင်ခြင်း။ ကျောက်ကပ်တွင်ကျောက်တည်ခြင်း။ 	<p>ဆီးအိမ်နှင့်ကျောက်ကပ်ပိုးဝင်ခြင်းအကြောင်းဖတ်ပါ။</p> <p>ကျောက်ကပ်နှင့်ဆီးအိမ်တွင်ကျောက်တည်ခြင်းအကြောင်းဖတ်ပါ။</p>
<p>တစ်ခါတစ်ရံဖျားပြီး မွေးလမ်းကြောင်းမှအရည်ဆင်းခြင်း (သို့) သွေးအနည်းငယ်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူနာကျင်ခြင်း။</p>	 <p>လိင်မှုဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများ (STD) (သို့) ကိုယ်ဝန်ပျက်ပြီး (သို့) ကလေးမွေးပြီးဆီးခုံတွင်းပိုးဝင်ခြင်း။</p>	<p>ဆီးခုံတွင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ သားအိမ်ထဲပိုးဝင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ပျက်ပြီးပိုးဝင်ခြင်းအကြောင်းဖတ်ပါ။</p>
<p>လိင်ဆက်ဆံစဉ်နာကျင်ခြင်း။</p>	<ul style="list-style-type: none"> ဆီးခုံတွင်းရောင်ယမ်းခြင်း (PID) (သို့) ဆီးခုံတွင်းပိုးဝင်ရာမှအမာရွတ်ဖြစ်ခြင်း။ သားဥအိမ်တွင်အလုံးတည်ခြင်း။ (Ovarian cyst) သားအိမ်တွင်းအလုံးတည်ခြင်း။ မလိုလားသောလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်ခြင်း။ 	<p>PID အကြောင်းဖတ်ပါ။</p>
<p>လှုပ်ရှား၊ လမ်းလျှောက် (သို့) အလေးမစဉ်တွင်နာကျင်ခြင်း။</p>	<ul style="list-style-type: none"> ဆီးခုံတွင်းပိုးဝင်ခဲ့ခြင်း။ အထက်ဖေါ် ပြုပြင်အကြောင်းရင်းတစ်ခုခု 	<p>လိုအပ်လျှင်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသုံးပါ။</p>

နာကျင်မှုအမျိုးအစား	ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအကြောင်းရင်း	ဆောင်ရွက်ရန်
<p>လစဉ်ရာသီစက်ဝန်းအလယ်ပိုင်းတွင်နာရီပေါင်းအနည်းငယ်လောက်သာနာကျင်ခြင်း။</p>	<p>သားဥအိမ်မှသားဥကိုထုတ်လွှတ်သောအခါအနည်းငယ်သွေးပါသဖြင့်ဝမ်းဗိုက်တွင်နာကျင်မှုရှိနိုင်သည်။</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • လိုအပ်လျှင်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတိုက်ပါ။ • မိမိခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းသိရှိနားလည်ခြင်းသင်ခန်းစာကိုဖတ်ပါ။
<p>သားအိမ်တွင်းထည့်သွင်းသောပစ္စည်းတစ်ခုခုသွင်းပြီး ၃ပတ်အတွင်းနာကျင်ခြင်း။</p>	<p>သားအိမ်တွင်းထည့်သွင်းသောပစ္စည်း (IUD) ထည့်ပြီးခါစတွင်ပိုဝင်အလွယ်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • ကျန်းမာရေးလုပ်သားထံချက်ချင်းပြသပါ။
<p>အခြားလက္ခဏာများမရှိဘဲနာကျင်ခြင်း။</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ဆီးခုံတွင်းအင်္ဂါများသို့ပိုဝင်ခြင်းကြောင့်ဝမ်းဗိုက် (သို့) ခါးအောက်ပိုင်းတွင်လပေါင်းများစွာ (သို့) နှစ်ချီအောင်တောက်လျှောက်(သို့)နာလိုက်ပျောက်လိုက်နာကျင်ခြင်း။ • ဘက်တီးရီးယားပိုး (သို့) ကပ်ပါးပိုးများအူလမ်းကြောင်းသို့ဝင်ရောက်ခြင်း။ • သားအိမ် (သို့) သားဥအိမ်တွင်အလုံးဖြစ်ခြင်း။ 	<ul style="list-style-type: none"> • ဆီးခုံတွင်းစမ်းသပ်ရန်သင်ယူလေ့ကျင့်ထားသောကျန်းမာရေးလုပ်သားထံပြသပါ။ • ကျန်းမာရေးလုပ်သားထံပြသပါ။ • ဆီးခုံတွင်းစမ်းသပ်ရန်သင်ယူလေ့ကျင့်ထားသောကျန်းမာရေးလုပ်သားထံပြသပါ။

ဝမ်းဗိုက်တွင်းနာကျင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများ

အကယ်၍သင်၏နာကျင်မှုသည် ဖော်ပြခဲ့သောနာကျင်မှုအမျိုးအစားများနှင့် မကိုက်ညီသော်၊ ဤမေးခွန်းများကအထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။

(က) ဘယ်လိုနာကျင်မှုမျိုးလဲ။

- ပြင်းထန်စွာနာကျင်ပြီးပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်သွားလိုက်ဖြစ်သော နာကျင်မှုမျိုးသည်ကျောက်ကပ်တွင်ကျောက်တည်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- ပြင်းထန်စွာဆွဲဆုပ်ထားသလိုနာကျင်မှုမျိုးသည်အူလမ်းကြောင်းတွင် ပြဿနာရှိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- တစ်နေရာထဲတွင်စူးရှပြီးပြင်းထန်သောနာကျင်မှုမျိုးသည်အူအတက်ရောင်ခြင်း (သို့) သားအိမ်အပြင်ဘက်သန္ဓေတည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။



(ခ) ဘယ်လောက်ကြာအောင်နာကျင်သလဲ။

- ရုတ်တရက်ပြင်းထန်ပြီးသက်သာမလာသောနာကျင်မှုသည်စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သားဥပြုန်ထဲတွင်သန္ဓေတည်ခြင်း၊ အူအတက်ရောင်ခြင်း (သို့) အခြားအူလမ်းကြောင်းပြဿနာများ၊ သားဥအိမ်တွင် ပြဿနာရှိခြင်း (သို့) ဆီးခုံတွင်းရှိအင်္ဂါများရောင်ခြင်း၊ (pelvic inflammatory disease, PID) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- ပြင်းထန်စွာနာကျင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရက်ပေါင်းများစွာ၊ ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာနာကျင်ခြင်းမျိုးသည်အရင်ပိုးဝင်ထားသောဒါဏ်ရာ၊ အနာရှုတ်များ (သို့) အစာမကြေဖြစ်ခြင်း (သို့) အာရုံကြောများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

➤ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းနာကျင်နေသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ယနေ့လမ်းလျှောက်နိုင်သော်လည်းမနက်ဖြန်တွင်သေဆုံးသွားနိုင်ပါသည်။ မသေချာလျှင်အကူအညီကိုစောလျှင်စွာတောင်းခံပါ။