

فصل 29

درین فصل:

448.....	انواع ختنه زنان.....
448.....	مشکلات صحی دز اثر ختنه زنان.....
449.....	چه کاری برای مشکلات صحی باید انجام داد.....
449.....	خونریزی شدید و شاک.....
449.....	انتنان.....
450.....	مشکلات ادرار.....
451.....	مشکلات خونریزی ماهوار.....
451.....	مشکلات روابط جنسی و صحت جنسی.....
452.....	مشکلات ولادت.....
453.....	عدم اقتدار ادرار و مواد غاییله.....
453.....	عقمات.....
454.....	مشکلات صحت روانی.....
454.....	کار برای ایجاد تغییر.....
445.....	ختنه زنان ، حقوق بشر و قانون.....

این فصل توسط زنانی نوشته شده است که در جوامعی زندگی و کار مینمایند که در آنجا ختنه زنان انجام میشود.

ختنه زنان



» بعض این عمل قطع نمودن
گفته می‌شود.

» در بعضی جوامع زنان را قبل
از ازدواج به خاطر زن شدن
ومادر شدن خته می‌نمایند و در
بعضی دیگر بخاطر تملک زنان را
ختنه مینمایند.

در طول تاریخ عادات و رسوم مضر به صحت زنان مورد اجرا قرار داده شده اند تا زنان بیشتر جذاب جلوه نموده و برای ازدواج مناسب بنظر آیند. مثلاً در بعضی جوامع اروپایی زنانی را مقیول می‌گفتند که کمر بسیار باریک داشتند. بناءً در سنین نوجوانی دختران کمر بند سختی بنام "کرست" (شکم بند زنان) به قدر محکم به دور کمر خود بسته می‌کردند که بعض سبب شکستگی قبرغه‌ها شده و باعث ایجاد مشکل در تنفس کردن و خوردن مواد غذایی می‌گردید. انجام هر کاری برای آنها مشکل می‌بود بجز آهسته قدم زدن و آرام نشستن.

و در بعضی نواحی چین، زنانی که پاهای کوچک داشتند به موقف بلند میرسیدند بناً استخوان پاهای بعضی دختران را می‌شکستند و دوباره توسط یک پارچه تکه آنرا بسته مینمودند. در بزرگی و سنین بالاتر این دختران به استثنای قدم زدن کاری را انجام داده نمی‌توانستند.

اکنون این رسم و رواج‌ها از بین رفته اند اما عادات دیگری هنوز وجود دارد. خته زنان از جمله این عادات می‌باشد. خته زنان در اکثریت جوامع افریقایی، بعضی مناطق شرق میانه به مقدار کمتر در جنوب شرق آسیا انجام می‌شود. درین عملیه بخشی از ناحیه تناسلی دختر یا زن را قطع می‌نمایند. خته زنان به دلایل مختلف انجام می‌گیرد که اکثر آنها اساس فرهنگی و عنعنوی دارد. اینکار معمولاً یکی از مراسم بزرگ جامعه را تشکیل میدهد. خته زنان تأثیری بالی دوست داشتن و اخلاق آنها ندارد اما وظایف نارمل عضویت را متاثر ساخته و نیز روابط جنسی اورا باشوه را مختل می‌سازد. بر علاوه خته سبب مشکلات صحی فراوان شده و بعضی از این مشکلات دائمی بوده و حتی سبب مرگ می‌گردد.

سه نوع ختنه زنان وجود دارد:

1. بظر (Clitoris) به صورت قسمی یا مکمل دور کرده میشود.
2. بظر (Clitoris) یکجا با چین خورده گی های کوچک-حد ناحیه تناسلی خارجی دور کرده میشود.
3. درین نوع ختنه ناحیه تناسلی خارجی را قطع کرده ودهانه مهبلی دوخته میشود. و مجراه کوچکی برای تخلیه ادرار و عادات ماهوار گذاشته میشود این عمل را بنام بستن ناحیه تناسلی یا Infibulation نیز یاد میکنند.

این نوع ختنه خطرناکترین نوع آن بوده وسبب مشکلات صحی وخیم میشود. اما تمام انواع ختنه زنان سبب خونریزی ، انتان ومرگ شده میتوانند.

روش ختنه نمودن در مناطق مختلف، مختلف می باشد. اما همیشه بخشی از مراسمی است که در شروع جوانی دختران انجام میشود.

مشکلات ذیل شاید عاجلا یا در حیان یک هفته بعدی به وجود بیایند:



- خونریزی محجم وشديد
 - انتان
 - شاک از سبب درد شديد، خونریزی یا انتان
 - مشکلات در تخلیه ادرار
- تمام این مشکلات بسیار خطرناک اند عاجلا به داکتر مراجعه شود.

اختلالات ذیل به صورت مؤخر واقع می شوند اما به صورت دائمی باقی مانده می توانند:

- مشکلات عادت ماهوار
- مشکلات در مقربت جنسی
- مشکلات قبل و بعد از ولادت
- عدم اقتدار ادرار وموا غایطه عقامت
- درد مزمن
- مشکلات صحت روانی

انواع ختنه زنان

مشکلات صحی از سبب ختنه زنان



شای

چه کاری را برای مشکلات صحی باید انجام داد



۲۵۴

شای



انتقال



۲۳۷

مایعات از طریق مقعد




۵۱۰

پاک نمودن و تعقیم

^۴ علایم انتان در هر زمان در جیریان دو هفته، اول بعد از خت ممکن مشاهده شوند.



Sepsis (موجودیت)
انتان در خون)



انتقال

خونریزی شدید و شاک:
خونریزی شدید از سبب جرحه عمیق سریعاً به وجود آمده می‌تواند. که بسیار خطرناک می‌باشد. اگر یک دختر مقدار زیاد خون را ضایع کند به شاک رفته و شاید تلف گردد.

علایم هوشدار دهنده شاک موجودیت یک یا چند تاز از علایم:



- احساً تشنگی شدید.
- جلد زنگ پریده، سرد و مرطوب
- نبض ضعیف و سریع (بیشتر از 110 ضربه در دقیقه)
- تنفس سریع (بیشتر از 30 تنفس در یک دقیقه)
- ضیاع شعور

چه باید کرد:

• عاجلاً کمک بخواهید. شاک واقعه عاجل طبی می‌باشد.

• بالاینایه خوندهنده عاجلاً فشار وارد کنید. به این منظور از یک تکه پاک که خون را زیاد جذب نکند استفاده کرده می‌توانید. در جریان انتقال اورا به پشت بخوابانید.

• به او کمک کنید تا حد امکان مایعات زیاد بنوشد.

• اگر مریض ضیاع شعور داشته باشد و شفاخانه دور واقع شده باشد تطبیق مایعات را از طریق مقعد شروع کنید.

انتان:

• اگر ختنه به وسیله سامان ولوازم ناپاک صورت بگیرد سبب انتان جرحه تیتانوس، هیپاتیت وایدز / HIV شده می‌تواند.

علایم کلینیکی:

- علایم انتان جرحه: تب، پندیدگی ناحیه تناسلی، آمدن چرک یا بوی بد از جرحه و درد شدید.
- علایم تیتانوس: قفل شدن دهن، شکن گردن، شکن عضلات بدن، مشکلات بلع و اختلالات.
- علایم شاک (به بالا مراجعه شود)
- علایم مکروبی شدن خون (Sepsis): تب و دیگر علایم انتانی، اختلال شعور و شاک.

جهت شناخت علایم مرض ایدز / HIV و یا هیپاتیت (التهاب جگر) فصل ایدز صفحه 283 و فصل امراض مقاربتی و دیگر انتانات تناسلی صفحه 266 دیده شود.

با اهمیت: اگر در یک دختر علایم شاک، تیتانوس و یا مکروبی شدن خون مشاهده شد، مریض را عاحلاً به شفاخانه انتقال بدهید.



- در موجودیت انتان چه باید کرد؟
- یاک انتی بیوتیک مانند Erythromycin یا Amoxicillin به مریض بدھید.
- مراقب علایم اخطار دهنده شاک، مکروبی شدن خون و تیتانوس باشید. اگر خانم واکسین تیتانوس نشده باشد ، دفعتا یکدوره آنرا برایش تطبیق نمایید.
- جهت کنترول درد از دواهای طبی یا گیاهی استفاده نمایید.
- ناحیه تناسلی را بساز پاک نگهدارید.
- ناحیه تناسلی را توسط آب جوش داده که سرد شده باشد و مقدار کمی نمک داشته باشد. ، بشویید.


مشکلات بولی:

چون ختنه اغلبا سبب تولید درد شدید در جریان ادرار کردن میشود ، بعضی دختران کوشش مینمایند که ادرار خود را گرفته و نگذارند که تخالیه گردد. این کار سبب انتان و تخریبات طرق بولی ، مثانه و کلیه شده می تواند ، بر علاوه ادرار نکردن برای مت طویل سبب تشكیل سنگ مثانه شده می تواند.

چه باید کرد؟

- در جریان ادرار کردن بآب پاک را بالای ناحیه تناسلی بریزید. این عملیه تیزابیت ادرار را کم ساخته و درد کاهش می یابد. نوشیدن مقادیر زیاد مایعات نیز موثر می باشد.
- یاک مقدار آب را در ظرفی بریزید صدای جریان آب بعضا در شروع کردن ادرار کمک می نماید.
- یاک بنداز مرطوب شده توسط آب گرم را بالای ناحیه تناسلی بگذارید. این عمل درد را کاهش میدهد.
- مراقب علایم انتان مثانه و کلیه ها باشید.

اگر یک دختر برای یک روز یا شب ادرار را تخالیه نکرده باشد. و قسمت پایینی شکم بالای مثانه کش شده و پر حس شود این یک حالت عاجل طبی می باشد. عاجلا اورا نزد داکتر مجبوب که توانایی تطبیق نمودن کتیتر مثانه و تخالیه ادرار را داشته باشد انتقال بدھید. دادن مایعات را توقف بدھید زیرا سبب ازدیاد فشار در مثانه می گردد.



اموکسی سلین. ۴۷۸
اریترومایسین. ۴۸۹



انتان مثانه و کلیه:



طرز تطبیق کتیتر مثانه



انتقال:

مشکلات خونریزی ماهوار:

اگر سوراخ مهبلی باقیمانده بعد از ختنه نوع بسته کردن یا Infubilation بسیار کوچک باشد و یا از سبب ندبات داخلی بند شده باشد ، مسیر جریان خونریزی ماهوار قطع میگردد. این حالت مشکلات ذیل را بیار می آورد:

- درد شدید در جریان خونریزی ماهوار.
- خونریزی طولی که مدت 10 الی 15 روز دوام می کند.
- توقف خونریزی ماهانه زیرا دهانه مهبل مسدود شده و خون خارج شده نمی تواند.
- حبس خون یا تجمع خون که سبب مرض التهابی لگن خاصره (PID) و تشکل ندبه (Scar) در رحم و لوله های رحمی می گردد. این حالا باعث عقامت میگردد.

چه باید کرد؟

- یک پارچه تکه را در آب گرم غوطه داده بعده بالای قسمت پایینی شکم بگذارید. (احتیاط نمایید که جلد را نسوزانید).
- قدم زدن و تمرينات خفيف شاید موثر باشند. اگر مشکلات وخیم و شدید باشند ، باید دهانه مهبل توسعه داده شود. برای جلوگیری از تخریب اعضای تناسلی این عملیه باید توسط داکتر با تجربه اجرا گردد.



» تمام جروحات باید قبل از داشتن مقاربت جنسی ترمیم شده و یا التیام یافته باشند.

مشکلات با روابط جنسی و صحت جنسی

درصورتیکه خانم ختنه شده ، مشکلات ذکر شده فوق را نداشته باشد میتواند از رابطه‌ل جنسی لذت ببرد. اما اکثریت زنانی که ختنه شده اند (مخصوصاً به شکل Infibulation) مشکلات در روابط جنسی دارند.

در بعضی جوامع دختران را در روز ازدواج ختنه می کنند. یا دهانه مهبل دختری را که از قبل ختنه شده باشد توسعه می دهند. اگر خانم قبل از ترمیم جرحه مقاربت جنسی داشته باشد. اینکار شاید دردناک و خطرناک باشد. و نیز ترمیمی جرحه به تعویق میافتد. بر علاوه جروحات باز خطر منتن شدن به امراض مقاربتی HIV را افزایش میدهد. خانم شاید در جریان مقاربت جنسی به مشکل تحريك گردد زیرا بظر (Clitoris) برداشته شده است.

اگر در محل زیست شما ختنه شکل ژ (Infibulation) مروج باشد ، به مردان بفهمانید که دهانه مهبل باید به شکل مصوون و با ملایمت توسعه داده شود. و سعی دادن دهانه مهبلی باید یک مدت زمانی قبل از اولین مقاربت جنسی انجام شود. تا زمان کافی برای ترمیم جرحه وجود داشته باشد. این عملیه باید توسط یک کارکن صحی با استفاده از سامان و لوازم معقم انجام و مراقبت شود تا از مکروبی شدن آن جلوگیری گردد.

در رابطه به مشکلات مقاربت جنسی چه باید کرد؟

یک خانم میتواند با شوهر خود در مورد دریافت روش هایی که بیشتر تحریک گردد صحبت نموده و توضیح دهد که به او به مدت بیشتری ضرورت دارد تا تحریک گردد. او همچنان میتواند در مورد طریقه های مقاربت جنسی، صحبت نماید. مرطوبیت بیشتر یا لشم شدن مقاربت جنسی را مصوون ساخته و نیز درد را کاهش میدهد.

دریافت مواظبت های صحی اعضاي تولد و تناسل:

اگر دریچه مهبلی خانمی که به شکل (Infibulation) یا ختنه فرعونی ختنه فرعونی) خته شده، به اندازه لازم وسعت نداشته باشد، درین صورت اجرای معاینه داخلی لگن خاصره انجام نست Pap (جهت آزمایش کانسر) نزد او ناممکن می باشد (به صفحه 365 مراجعه شود). این به آن مفهوم است که او چانس کمتر برای محافظت مقابل حاملگی، سرطان و امراض مقاربته دارد.



مشکلات ولادت:

بعضی انواع ختنه ها سبب ولادت انسدادی می گردند (خارج شدن جنین را از رحم مشکل می سازد). اگر دهانه مهبلی بسیار کوچک باشد جهت خارج شدن سر طفل آنرا باید توسعه بدھیم. این عملیه را بنام (Deinfibulation) یاد می کنند. (به صفحه بعدی مراجعه شود).

اگر این عملیه توسط شخصی بی تجربه صورت گیرد سبب بروز اختلالات می گردد. ندبه ختنه نیز سبب پارگی بیشتر ناحیه تناسلی در جریان ولادت می گردد زیرا جلد ناحیه ندبه (Scar) به آسانی کش نمی شود. شاید سبب خونریزی شدید نیز گردد.

چه باید کرد؟

قبل از ولادت پلانی را ترتیب نمایید. خانم باید در سه ماه دوم حاملگی یک قابلہ با تجربه و یا یک کارکن صحی دیگر را که درین مورد معلومات داشته باشد، ملاقات کند. قابلہ در مورد اختلالات و توسع دهانه مهبلی به او معلومات خواهد داد. اگر خطر موجود باش خانم باید از قبل برنامه منظم تداوی را تهیه نماید.

» اگر میتوانید زوج های عروسی شده را تشویق نمایید. با یک دیگر صحبت نمایند، به اینتریب بحث در مورد اینکه چطور ختنه زنان روی روابط جنسی تأثیر مینماید آسانتر خواهد بود.



مقاربت جنسی مصوون

» ولادت انسدادی نزد دختران نوجوان که عضویت آنها درست نشوونما نکرده است، بیشتر معمول می باشد.

» در صورتیکه مرکز صحی دور واقع شده باشد و خانم در خانه ولادت نماید بسیار خطر ناک بوده میتواند، مخصوصا اگر خانم به شکل Infibulated یا ختنه فرعونی، خته شده باشد.


» برای بعضی دایه های محلی طرز ولادت بدون خطر در خانم های ختنه شده و کمک به مشکلات ختنه Infibulated آموزش داده شده است.

حالت عاجل طبی: در صورتیکه یک زن قبلاً بشکل برداشتن کامل قسمت خارجی آله تناسلی (Infibulated) ختنه شده باشد و در جریان ولاست طفل خارج شده نتواند ، ولاست انسدادی گفته شده که ندبه باید دور کرده شود تا ولاست صورت بگیرد. در صورت امکان این عمل توسط کاکن صحی با تجربه صورت بگیرد. اگر کارکن صحی موجود نباشد دستان خویش را همراهی آب و صابون خوب بشویید و دستکش معقم پلاستیکی یا رابری را بپوشید. باید سامان و لوازمی که توسط آن شق اجرا میگردد تعقیم و پاک گرددن (به صفحه 510 مراجعه شود). اگر مجبور شدید شقی را اجرا نمایید، عاجلاً بعد از ولاست مریض را نزد داکتری که بتواند آنرا ترمیم نماید انتقال بدھید.

جهت دور کردن ندبه و توسعه دهانه مهبل (Deinfibulation):

1 - یک یا دو انگشت خویش را تحت ندبه قرار دهید.

2 - در صورتیکه طرز تطبیق ماده بیحس کننده محلی را میدانید آن محل را بی حس بسازید.



3 - توسط قیچی نمودن نسج ندبوی سابقه را دور نمایید. تا دهانه بولی دیده بتوانید. در زمان مهبل به قدر کافی وسعت یافته و به طفل اجازه میدهد تا خارج گردد.

4 - بعد از ولاست ناحیه باید ترمیم گردد این فرصت مناسب می باشد که به زن بگویید تا دیگر خودرا (Infibulated) نه نماید. (زیرا سبب تشکل ندبه بیشتر و مسدود شدن مجرای ادرار و مجرای مهبلی می گردد). یک کار کن صحی با تجربه میتواند بدون مسدود نمودن مجرای تناسلی آنرا ترمیم نماید.

5 - جهت وقایه انتا اموکسی سیلین سه گرام یک مرتبه یا اریتروماکسین (Erythromycin) 500 ملی گرام چهار مرتبه در روز برای 7 روز تجویز نمایید.

عدم اقتدار در کنترول ادرار و مواد غایطه:

در جریان ولاست انسدادی جدارهای مهبل ، مقعد و مثانه پاره شده و سبب آمدن ادرار یا مواد غایطه از طریق مهبل میشود. اگر یک زوج مقاربت جنسی مقعدی داشته اند (زیرا دهانه مهبلی بسیار کوچک است) مقعد متوجه گردیده یا پاره شود و مواد غایطه به صورت دوام دار از مقعد خارج میگردد. زندگی با عدم اقتدار ادرار و مواد غایطه بسیار مشکل می باشد. اکثریت زنان و جوان از سبب بوی بد ادرار و عدم اقتدار آن توسط شوهران شان طلاق شده اند. در صورت موجودیت این مشکل عاجلاً کمک طبی دریافت نمایید.

عقمات:

انتنان سبب تشکل ندبه در رحم و نفیرها (لوله های رحمی) شده و این به نوبه خود سبب عقمات می گردد.

اگر فکر می نمایید که انتنان از اثر وسیله امراض مقاربتی به وجود آمده است ، فصل امراض مقاربتی و دیگر انتنانات ناحیه تناسلی را مطالعه نمایید. اگر تصور می نمایید که موجودیت نسج ندبی در رحم و لوله های رحمی سبب بسته شدن مجرای مهبلی و توقف خونریزی ماهوار شده است به یک کارکن صحی مأجوب جهت متوجه ساختن دهانه مهبلی مراجعه نمایید.



مشکلات صحت روانی

یک دختریکه ختنه شده است شاید تحت تأثیر عصبانیت ، اضطراب ، ترس و غم قرار گیرد. هنگامیکه ختنه در مقابل چشمان زنانی که او را می شناسد و به آنها اعتماد دارد صورت بگیرد ، دختر احساس می نمایدکه بعد از این بالای هیچکس اعتماد نکند اگر دختر نخواهد ختنه شود وضعیت هنوز هم وخیم تر میشود.



درد مزمن ورنج مداوم سبب مشکلات دائمی روانی مانند افسرده گی و احساس بیچاره گی و بی ارزشی شده می تواند.

مشکلات جنسی سبب ایجاد کشمکش بین زن و شوهر می گردد. خانمهای شاید احساس نمایند که قادر به خوش ساختن شوهر نمیباشند. زیرا درد مانع مقاربت جنسی و ترس میشود.

چه باید کرد؟

- خانم را تشویق نمایید تا در مورد احساسات خویش صحبت نماید.
- اگر خانم قادر به انجام کارهای روزمره نباشد – و یا گوشه گیر شده باشد صفحات 406 و 418 را مطالعه نمایید.



صحت روانی

کار برای ایجاد تغییر

بعد از مشکلات جنسی
زیادی که من و خالدم در
هنگام مقاربت و ولادت
 طفل داشتم من اجازه نمی
دهم دخترم را ختنه نمایند



- اگر مخالف ختنه زنان می باشید به روش های مختلف ذیل به دختران جامعه خود کمک نموده می توانید:
- مادر باید به دختر خویش درس ارزش دادن به خود و دوست داشتن خود را بدهد ، با وجودیکه ختنه شده باشد یا خیر.
- دختران را تشویق نمایید که به تحصیلات خویش ادامه بدهند تا روزی در مورد زندگی و آینده خود تصمیم گرفته بتوانند. هر طفل حق تحصیل و داشتن صحت خوب را دارد.
- به تبادله نظریا در مورد مشکلات صحی حاصله از ختنه زنان با مردان وزنان جامعه پردازید و با آنها یکجا برای تغییر کار کنید.
- راجع به فعالیت های انگمن زنان در اجتماع خویش معلومات حاصل کنید.

» برای ایجاد تغییر واقعی دو
جامعه مردم باید با هم کار نموده
واین عمل مضر را متوقف
سازند.

- اگر کارکن صحی میباشد و کسی از شما میخواهد تا دخترش را ختنه نمایند، راجع به اختلالات و خطر های ختنه به او معلومات بدھید.
- راجع به تداوی اختلالات ختنه زنان تعلیم بگیرید.
- با رهبران قومی و مذهبی درینمورد کار کنید.
مذهب از ختنه زنان حمایت نمی کند اما این موضوع به درستی درک نشده است. این موضوع را با رهبر مذهبی خویش مطرح کنید.
- راه های توقف مراسم ختنه زنان را در جامعه خویش جستجو کنید.
مراسم دیگری را که نشاندهنده جوان شدن یک دختر میباشد دریابید.
مثلًا عبادت یا قربانی کردن حیوان.
در اکثریت مناطق مراسمه ای این منظور وجود دارد که برای صحت دختران مضر نمیباشد.
- نقش مهمی را که دایه های محلی در تأمین صحت احتماع بازی میکنند تشخیص بدھید.



ختنه زنان ، حقوق بشر و قانون

درین فصل عمدتاً عوارض صحی ایکه از باعث ختنه زنان بمبان میاید تشریح شده است. اما اگر مشکل صحی از اثر ختنه بوجود نیاید باز هم به یک زن ختنه شده آسیب رسیده است واز حقوق بشری که تضمین کننده صحت جسمی و روانی او می باشد تخطی بعمل آمده است. اکثریت عقیده دارند که ختنه زنان تخطی از حق انتخاب شخصی دختران می باشد. زیرا اینکا اکثرا خلاف رضایت دختران در سنین طفولیت انجام میشود. بعضی گروپ ها خواستار وضع قوانین جدید جهت غیر قانونی شمردن ختنه زنان و مجازات اجر اکنندگان آن شده اند. این قوانین باید با احتیاط به وجود بیایند. تامرد مناطقیکه ختنه زنان را انجام میدهنند ، به صورت مخفیانه به آن ادامه ندهند چون این کار خطر ناکتر خواهد بود. بر علاوه دختران ختنه شده در صورتیکه مشکلی داشته باشند ، نباید از دریافت کمک طبی هراس داشته باشند.

چون اکثر دایه های محلی ختنه را انجام میدهند، به آنها عواقب وخیم اینکار را آموزش بدھید. راه های را دریابید که به وسیله آن تحفه را که به دایه در بد انجام ختنه میدهند، تعویض نمایند. و آنها را به جهت عرضه خدمات صحی دیگر تشویق و ترغیب کنند. اگر مراسم دیگری (به استثنای ختنه) جهت تجلیل از جوان شدن دختر بر پا میگردد به دایه های محلی جهت اخذ و توزیع تحاویف حق اولویت را بدھید.